

全国卫生专业技术资格考试护理学(中级) 考前必背 50 考点

®

- 1.心源性呼吸困难的原因是肺淤血。
- 2.慢性肾盂肾炎的感染菌:大肠杆菌。
- 3.继发性腹膜炎的病原菌:大肠杆菌。
- 4.肺淤血是二类瓣狭窄易形成血栓塞的原因。
- 5.风心病多发于:二类瓣狭窄。
- 6.胃癌经淋巴结途径转移。
- 7.绒毛膜癌向肺器官转移。
- 8.妊高征的特点是全身小动脉痉挛。
- 9.宫内节育环是我国育龄妇女主要的避孕方式。
- 10.同侧腋窝淋巴结是乳癌的转移方式。
- 11.飞沫传播是猩红热的传播途径。
- 12.疱疹性咽颊炎是由柯萨奇病毒引起的。
- 13.上消化道出血的主要原因:消化性溃疡。
- 14.乙型 β 溶血性链球菌是急性肾小球肾炎的感染菌。
- 15.肺动脉高压是室间隔缺损发生青紫的原因。
- 16.小儿呼吸心跳骤停的主要原因是窒息。
- 17.热衰竭是由于大量出汗导致失水、失钠, 血容量不足引起周围循环衰竭。
- 18.破伤风杆菌中毒的直接原因是外毒素。
- 19.急性乳腺炎多见于初产妇哺乳期。
- 20.原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的区别:腹腔内无原发感染病灶。
- 21.内脏性疼痛的特点:选择定位不准确。
- 22.肺心病的主要病因是 COPD。
- 23.颅内高压的体征:视乳头水肿。
- 24.急性胰腺炎是胰腺自身消化的化学性炎症。
- 25.急性胰腺炎血清淀粉酶较早出现升高。
- 26.异位妊娠:输卵管壶腹部最常见。检查—阴道后穹隆穿刺最可靠。
- 27.肝硬化=肝炎病史+门脉高压(脾大+腹水+侧支循环)+超声(肝脏缩小)
- 28.门脉高压症的三大表现:脾大、腹水、侧支循环的建立和开放。
- 29.急性胰腺炎约 50%由胆道结石、炎症或胆道蛔虫引起——胆石病最为常见。
- 30.上消化道出血最常见的病因是消化性溃疡,而消化性溃疡最常见的并发症是出血。
- 31.特发性血小板减少性紫癜——首选药物肾上腺糖皮质激素。
- 32.恶臭味:可见于支气管扩张或肺脓肿病人。
- 33.肝腥(肝臭)味:可见于肝性脑病(肝昏迷)病人。

34. 氨(尿)味:可见于尿毒症病人。
35. 烂苹果味:可见于糖尿病酮症酸中毒病人。
36. 刺激性大蒜味:可见于有机磷农药中毒病人。
37. 0.9%氯化钠溶液:清洁口腔,预防感染。口腔 pH 值为中性时适用。
38. 朵贝尔溶液(复方硼酸溶液):轻微抑菌,消除口臭。口腔 pH 值为中性时适用。

39. 0.02%呋喃西林溶液;清洁口腔。
40. 三联征:腹痛、寒战高热和黄疸
41. 五联征:腹痛、寒战高热和黄疸、休克、中枢神经系统抑制。
42. 灌肠的禁忌症:妊娠、急腹症、消化道出血、严重心血管疾病的病人。
43. 法洛四联症典型 X 线——靴型心
44. 热水坐浴的目的:减轻直肠、盆腔内的淤血;消除肛门、会阴部的充血、炎症、水肿和疼痛,使局部清洁,病人舒适,常用于会阴和肛门疾患或手术后。
45. 吸氧浓度(%) = $21+4 \times \text{氧流量(L/min)}$,吸氧时湿化瓶装 1/3~1/2 蒸馏水,急性肺水肿病人吸氧时,湿化瓶内该盛 20%~30% 酒精,可降低肺内泡沫表面张力。
46. 新生儿分类:足月儿:指胎龄满 37 周至未满 42 周(260~293d)的新生儿;早产儿:指胎龄<37 周(259d)的新生儿;过期产儿:指胎龄≥42 周(≥294d)的新生儿。
47. 左心衰竭:主要表现为肺淤血和心排量降低,最早出现的是劳力性呼吸困难,最严重的形式是急性肺水肿。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张期奔马率,两肺部湿性啰音。
48. 右心衰竭:以体循环淤血的表现为主。腹胀、食欲不振、恶心、呕吐是最常见的症状。
49. 长期医嘱:在效时间在 24 小时以上,当医生注明停止时间后医嘱失效。
50. 主动脉瓣狭窄直接引起左心室后负荷加重。主动脉瓣关闭不全引起左心室前负荷增加,二尖瓣狭窄引起左心房后负荷增加,二尖瓣关闭不全引起左心房和左心室的前负荷增加,三尖瓣关闭不全引起右心房和右心室的前负荷增加。



全国卫生专业技术资格考试护理学(中级) 考前必背 50 考题



1.患者,女性,26岁。病史不清。昏迷不醒、流涎、抽搐、瞳孔明显缩小、皮肤湿冷、呼吸困难。其最有可能的诊断是

- A.CO中毒
- B.有机磷中毒
- C.阿托品中毒
- D.中暑
- E.脑血管意外

【答案】B

2.对艾滋病患者进行护理,措施正确的是

- A.应给予低热量、低脂、清淡易消化饮食
- B.患者症状减轻后,为防止机会性感染发生也应卧床休息
- C.应进行严密隔离,严禁与外界接触
- D.对HIV无症状携带者,无需入院复查
- E.保持皮肤清洁干燥,每天清洁口腔3~4次

【答案】E

3.暴发性流行性脑脊髓膜炎休克型迅速出现大片瘀斑,血小板减少,顽固性休克时,除抗体克外,其重要对症治疗措施是

- A.止血
- B.纠正酸中毒
- C.使用抗菌药物
- D.及早应用肝素抗凝治疗
- E.20%甘露醇脱水,预防脑疝

【答案】D

4.患者,女性,35岁。因鼻塞、流清涕、咽痛并伴四肢对称性无力收治入院。确诊为吉兰~巴雷综合征,经治疗恢复。出院时,护士对其健康指导不正确的是

A.帮助患者及家属掌握本病的自我护理方法以及有关的知识

B.告知患者其肢体不能完全恢复至病前的功能

C.增强体质,避免感冒、疲劳等诱发因素

D.坚持肢体的被动和主动运动

E.加强康复锻炼和日常生活自理能力的训练

【答案】B

5.患者,女性。因心慌、血压下降而收入院。心电图检查结果显示,T波宽而低,QT间期延长,出现U波,ST段下移,该患者最有可能的诊断是

- A.低钾血症
- B.高钾血症
- C.高镁血症
- D.低镁血症
- E.高钙血症

【答案】A

6.一般不会导致呼吸性酸中毒的因素是

- A.呼吸道梗阻
- B.胸部外伤
- C.术后肺不张
- D.肺炎
- E.高热

【答案】E

7.对于ARDS患者使用呼吸机辅助呼吸时,预防感染的正确措施是

- A.仅在操作后认真洗手
- B.仅在操作前认真洗手
- C.气管插管每周更换位置
- D.气管切开处每周严格换药一次

E.定期更换或消毒呼吸机的管路及接触呼吸道的设备

【答案】E

8.蛛网膜下腔阻滞后去枕平卧的时间应为

- A.2~4 小时
- B.4~6 小时
- C.6~8 小时
- D.8~10 小时
- E.10~12 小时

【答案】C

9.不是胸外按压有效指征的是

- A.可见瞳孔由散大开始回缩
- B.可见面色由发绀转为红润
- C.可见患者有眼球活动, 睫毛反射与对光反射出现,甚至手脚开始抽动
- D.大动脉出现搏动, 收缩压在 60 mmHg 以上
- E.自主呼吸出现,可以停止人工呼吸

【答案】E

10.拔除中心静脉导管测压留置管后,不妥的措施是

- A.局部无菌敷料覆盖
- B.禁忌沙袋加压固定
- C.拔管后 24 小时内,注意观察有无穿刺处渗血和肢体肿胀等
- D.保持置管处的清洁、干燥
- E.抬高置管的肢体

【答案】B

11.患者,男性,42 岁,Ⅱ 度烧伤面积 35%,该患者属于

- A.轻度烧伤
- B.中度烧伤
- C.重度烧伤
- D.特重烧伤
- E.小面积烧伤

【答案】C

12.腹部损伤患者观察期护理不妥的是

- A.禁食

B.必要时进行胃肠减压

C.每 15~30 分钟测量一次生命体征

D.每小时查一次腹部体征

E.每半小时至一小时查一次红细胞, 血红蛋白和血细胞比容



【答案】D

13.不符合幼儿期特点的是

- A.乳牙出齐
- B.能够独立行走
- C.会用“我”指代自己
- D.能讲 2~3 个字的词组
- E.体格发育进入高峰期

【答案】E

14.妊娠合并心脏病孕妇,分娩时应做到

- A.宫口开全后,鼓励孕妇屏气用力以尽快结束分娩
- B.第二产程中应肌注吗啡
- C.胎儿娩出后,产妇腹部放置沙袋
- D.为预防分娩期心力衰竭,产前应达洋地黄饱和量
- E.急性心力衰竭时应即刻剖宫产结束分娩

【答案】C

15.预防子宫脱垂的措施不包括

- A.积极开展计划生育,避免多孕、多胎
- B.提高助产技术
- C.产褥期增加腹压活动
- D.加强营养,增强体质
- E.积极治疗慢性咳嗽、便秘

【答案】C

16.患者,女性,停经 17 周,要求终止妊娠,应采取的措施是

- A.钳刮术
- B.负压吸引术
- C.依沙吖啶引产术
- D.缩宫素静脉点滴
- E.药物流产

【答案】C

17.判断 COPD 气流受限的主要客观检

查指标是

- A.肺功能检查
- B.影像学检查
- C.动脉血气分析
- D.血常规
- E.痰细菌学检查

【答案】A

18.引起支气管扩张的最常见病因是

- A.支气管先天性发育缺陷
- B.支气管外部纤维的牵拉
- C.支气管~肺组织感染和阻塞
- D.遗传因素
- E.机体免疫功能失调

【答案】C

19.心力衰竭中最能反映左心功能的检查是

- A.中心静脉导管
- B.PICC
- C.漂浮导管
- D.有创血压监测
- E.超声心动图

【答案】C

20.肝硬化大出血诱发肝性脑病的主要机制是

- A.失血量过多导致休克
- B.失血后引起脑出血
- C.肠道积血产氨增多
- D.失血量大干扰脑代谢
- E.失血造成脑组织缺氧

【答案】C

21.对急性胰腺炎诊断的首选指标为

- A.左上腹持续性剧痛
- B.腹痛伴休克
- C.血清酶<1.98 mmol/L
- D.腹部 B 超
- E.血淀粉酶>500 U/dl

【答案】E

22.我国引起慢性肾衰竭的最常见的疾病是

- A.慢性肾盂肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.狼疮性肾炎
- D.高血压肾病
- E.糖尿病肾病

【答案】B

23.直肠癌简单而重要的检查方法是

- A.肛门视诊
- B.直肠指诊
- C.肛门镜检查
- D.乙状结肠镜检查
- E.纤维结肠镜检查

【答案】B

24.患者,男性,54岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎,其血清淀粉酶升高的规律是

- A.发病后2小时开始升高,12小时达高峰
- B.发病后6~12小时开始升高,24小时达高峰
- C.发病后24小时开始升高,48小时达高峰
- D.发病后12小时开始升高,72小时达高峰
- E.发病后48小时开始升高,72小时达高峰

【答案】B

25.正常成人颅内压的范围是

- A.20~30mmH₂O
- B.50~100mmH₂O
- C.70~200mmH₂O
- D.80~200mmH₂O
- E.100~220mmH₂O

【答案】C

26.男性生殖系统结核常见于

- A.婴幼儿
- B.20岁以下少年
- C.20~40岁人群
- D.40~60岁人群

E.60岁以上人群

【答案】C

27.维生素D缺乏性佝偻病主要病因是

- A.日光照射不足
- B.维生素D摄入不足
- C.生长发育过快
- D.肝、肾疾病
- E.糖皮质激素

【答案】A

28.子宫内膜从增生期转化为分泌期的直接原因是

- A.促性腺激素释放激素的作用
- B.促性腺激素的作用
- C.雌激素的作用
- D.孕激素的作用
- E.人绒毛膜促性腺激素的作用

【答案】D

29.关于胎产式的描述,错误的是

- A.胎产式是胎儿身体纵轴与母体身体纵轴的关系
- B.胎儿身体纵轴与母体身体纵轴平行称纵产式
- C.胎儿身体纵轴与母体身体纵轴垂直称横产式
- D.胎儿身体纵轴与母体身体纵轴交叉称斜产式
- E.在足月分娩过程中横产式可转换为纵产式

【答案】E

30.胎儿窘迫的评估指标不包括

- A.胎动
- B.孕妇血压
- C.胎心率
- D.羊水颜色
- E.胎儿头皮血气分析指标

【答案】B

31.子宫内膜异位症最常见的受累部位是

- A.卵巢

B.直肠

C.阔韧带

D.子宫直肠陷凹

E.输卵管

【答案】A

32.治疗呼吸衰竭时,为保持气道通畅不应使用的措施为

- A.给予祛痰药促进排痰
- B.给予可待因止咳
- C.给予支气管解痉药
- D.必要时做气管插管吸痰
- E.必要时做气管切开吸痰

【答案】B

33.留取痰液标本的采集方法中最为精准的是

- A.漱口后自然咳痰法
- B.导管吸痰法
- C.体位引流咳痰法
- D.经纤维支气管镜采样法
- E.环甲膜穿刺法

【答案】D

34.对急性肺水肿进行护理,给予的措施不正确的是

- A.取坐位,双腿下垂
- B.持续低流量吸氧
- C.准确记录出入量
- D.严密心电监护
- E.保持患者情绪稳定

【答案】B

35.心脏起搏器安置术后的护理措施及有关指导中不正确的是

- A.心电监护 24 小时
- B.绝对卧床 24 小时
- C.伤口压迫 4~6 小时
- D.术后第 4 天协助患者做术侧肩部活动
- E.不宜使用挎肩背包

【答案】B

36.患者,男性,23岁。诊断为重型再生

障碍性贫血 2 个月余,今日晨起突然出现头痛、头晕、视力模糊、呼吸急促。作为值班护士,你判断患者可能发生了

- A. 高血压危象
- B. 脑梗死
- C. 颅内出血
- D. 脑动脉痉挛
- E. 高血压脑病

【答案】C

37. 对于甲状腺功能减退症患者用药护理不正确的是

- A. 甲状腺制剂应首剂加倍,而后维持正常剂量
- B. 用药前后测量脉搏、体重
- C. 用药前后观察水肿情况
- D. 观察有无心悸、心律失常、胸痛、出汗等症状
- E. 长期替代治疗的患者,应每 6~12 个月检测血 TSH

【答案】A

38. 对狂犬病患者的最主要治疗措施是

- A. 支持疗法
- B. 对症治疗
- C. 病原治疗
- D. 调节免疫功能的治疗
- E. 康复治疗

【答案】B

39. 患者,女性,30 岁,行硬膜外麻醉腹腔镜胆囊切除术。术后患者出现剧烈背痛,进行性脊髓压迫症状,伴肌无力、尿潴留、括约肌功能障碍,继而出现完全性截瘫。临幊上首先应考虑为

- A. 硬膜外血肿
- B. 麻醉药中毒反应
- C. 药物过敏反应
- D. 全脊髓麻醉
- E. 麻醉平面过高

【答案】A

40. 患者,女性,27 岁,体检发现右侧乳

房外上象限有一直径 5cm 大小肿块。肿块质硬、界限不清、不光滑,尚可推动;同侧腋窝有 2 个淋巴结肿大,质硬,能推动。细针穿刺细胞学检查发现癌细胞,临床诊断为“右侧乳房癌”出院前进行健康指导,应告知患者预防复发最重要的措施是

- A. 5 年内避免妊娠
- B. 参加体育活动,增强体质
- C. 定期到医院复诊
- D. 加强营养
- E. 定期自我检查乳房

【答案】A

41. 患者,女性,75 岁。因腹痛、腹胀、停止排气排便 3 天入院,诊断为肠梗阻。X 线检查显示腹部有孤立、突出胀大的肠祥,并且不受体位的影响,该患者肠梗阻类型可能为

- A. 蛔虫性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 粘连性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 痉挛性肠梗阻

【答案】D

42. 患者,男性,58 岁。因工作变动,近 1 年过量饮酒。1 日前出现持续性腹痛,体温 37.9℃。今日入院腹部有压痛、反跳痛及肌紧张,血常规检查提示血白细胞值为 $15 \times 10^9/L$ 、中性粒细胞值为 $2.4 \times 10^9/L$ 患者可能的诊断为

- A. 胃穿孔
- B. 肝破裂
- C. 急性胰腺炎
- D. 脾破裂
- E. 肝损伤

【答案】C

43. 患者,男性,67 岁。吸烟史 30 年,左下肢血栓性脉管炎坏疽期。护士对患者进行指导不正确的是

- A. 避免长时间处于同一姿势

- B. 指导患者做勃格(Buerger)练习
- C. 禁止运动
- D. 适当休息
- E. 戒烟

【答案】B

44.患者,男性,35岁。突发上腹部疼痛,伴恶心、呕吐。查尿常规:红细胞满视野,白细胞6~13个/HP,血常规正常,考虑为左输尿管结石。目前最恰当的急救处理措施是

- A. 适当跳跃活动
- B. 嘱患者大量饮水
- C. 体外冲击波碎石
- D. 消炎、解痉、止痛
- E. 迅速行手术治疗

【答案】D

45.患者,男性,40岁。主诉:颈肩部疼痛及僵硬,向上肢放射,单侧或双侧上肢麻木、感觉过敏、无力或有放电样串痛,当咳嗽、喷嚏、颈部活动时加重。该患者所患颈椎病分型为

- A. 神经根型颈椎病
- B. 脊髓型颈椎病
- C. 椎动脉型颈椎病
- D. 交感神经型颈椎病
- E. 混合型颈椎病

【答案】A

46.关于正常分娩的临床经过,说法错误的是

- A. 第一产程,初产妇需12~16小时
- B. 第一产程,经产妇需6~8小时
- C. 第二产程,初产妇需1~2小时
- D. 第二产程,经产妇一般在1小时内

- E. 第三产程,一般不超过30分钟

【答案】A

(47~48题共用题干)

患儿,男性,3岁,体重约为14kg。急性支气管炎入院。遵医嘱给予头孢拉定。已知头孢拉定针剂(粉剂)每瓶0.5g,小儿用量每天50mg/kg,一天2次,肌注。

47.若用5ml注射用水稀释,则每毫升内含头孢拉定为

- A. 40mg
- B. 60mg
- C. 80mg
- D. 100mg
- E. 120mg

【答案】D

48.该小儿一天应用的剂量是

- A. 400mg
- B. 500mg
- C. 600mg
- D. 700mg
- E. 800mg

【答案】D

(49~50题共用备选答案)

- A. 同步直流电复律
- B. 非同步直流电复律
- C. 人工心脏起搏植入术
- D. 胸外按压
- E. 药物治疗

49.洋地黄中毒引起的室速应尽快进行

【答案】E

50.室速患者出现血流动力学改变应立即实施

【答案】E