

专业实务二

- 1、血栓闭塞性脉管炎病人的护理措施包括:①患者禁言②指导抬腿运动③保持患者干燥④测皮温, 观察疗效
- 2、望梅止渴的典故延伸至临床的情志护理是属于 暗示疗法
- 3、可能出现氧中毒的表现是干咳, 胸痛, 进行性呼吸困难。氧浓度高于 60%, 持续时间超过 24 小时, 则会发生氧中毒。
- 4、甲状腺手术后突然导致呼吸困难和窒息的最常见原因是切口内出血形成血肿
- 5、心绞痛发作时, 心电图的典型表现是 ST 段压低。大于 0.1mv 可有 T 波低平或倒置
- 6、表现为口若悬河, 滔滔不绝。一个话题未完又转入另一个话题的精神症状属于思维奔逸
- 7、是风湿性心脏病患者并发哪种心律失常时易引起栓塞 心房颤动
- 8、法洛四联症缺氧时采取的体位的主要目的是减少回心血量
- 9、预防臀红发生的措施:勤换尿布, 涂油
- 10、肌肉注射时, 护士采取可以使臀部肌肉放松的姿势是:俯卧位, 足尖相对
- 11、休克病人补液哪项指标可靠 尿量和中心静脉压
- 12、符合早产儿外观特点的是足底光滑, 纹理少
- 13、子宫脱垂 III 度是指,宫颈与子宫体完全脱出于阴道口外
- 14、化疗前需要准确测量患者体重的原因是精确计算药物剂量
- 15、引起秋冬季小儿腹泻的主要病原体是轮状病毒
- 16、肺结核化学治疗原则是早期、联合、适量、规律、全程
- 17、关于双合诊检查是盆腔检查最常用的方法, 指阴道和腹壁的联合检查, 未婚者一般不做检, 查前需排空膀胱
- 18、门脉高压时腹壁静脉曲张一般出现于其上腹部, 而后扩展到脐周和肋下, 形成海蛇头
- 19、硬脑膜外血肿典型的意识障碍, 表现为伤后昏迷-清醒-再昏迷
- 20、地中海头的心电图为潮式呼吸
- 21、腹外疝采用传统疝修补术后护理, 取平卧位膝下垫一软枕, 术后当日可进流食, 预防感染, 预防术后出血, 术后次日不可下床活动
- 22、某患者因胸腔积液进行胸腔闭式引流, 将胸腔引流管连接于 A 管
- 23、狂犬病毒主要存在于病畜的脑组织及脊髓中
- 24、胎盘娩出后持续阴道出血, 检查胎盘完整, 子宫软, 轮廓不清。首选措施为:按摩子宫同时肌内注射缩宫素
- 25、新型冠状病毒肺炎的报告时间为 2 小时, 属于乙类传染病
- 26、患儿 14 岁休克型肺炎, 经抢救病情稳定, 医嘱 10%的葡萄糖注射液 400ml+多巴胺 20mg VD, 若滴速 20 滴/分, 则告诉家长输液可维持的时间是 5 小时。输液所用时间=液体的总量×滴系数
- 27、患者张某 52 岁, 体重 60Kg, 工作时不是受伤, 烧伤面积达 50%, 为 II 度烧伤, 第一天补液总量为 6500ml。每 1%的烧伤面积每公斤体重应补充胶体液电解质液共 1.5ml, 另外加生理盐水 2000ml, 所以 $50 \times 60 \times 1.5 + 2000 = 6500\text{ml}$
- 28、患者女 40 岁, 上腹隐痛伴反酸, 嗝气三个月就诊, 查体上腹部轻度压痛。粪便潜血试验阳性, 胃镜检查提示胃溃疡合并出血对下列用药指导错误的是 西沙比利应在餐后服用 氢氧化铝可在睡前服用, 硫糖铝在餐前服用, 西米替汀在餐中服用, 多潘立酮在餐前服用
- 29、患者, 男, 25 岁, 因外伤被家人送来急诊查体面色苍白, 意识模糊, 腹部膨隆, 右上腹有一刀刺, 伤口不断流血。该患者最可能受伤的腹腔脏器是肝
- 30、某初产妇 G3P0, 一般情况良好, 胎儿足月左枕前位, 胎心 140 次/分, 规律宫缩已 17

小时。宫口开 3cm，宫缩较初期间歇时间长约 10-15 分钟一次持续 30 秒。宫缩高峰时子宫不硬，经检查无头盆不称，该产妇除宫缩乏力外，还可诊断为**潜伏期延长**。

31、二尖瓣狭窄的并发症包括**心房颤动，心力衰竭，脑动脉栓塞，急性肺水肿，感染性心内膜炎及肺部感染**。

32、女性 60 岁，剑突下持续性疼痛，6 小时寒战，高热伴黄疸，既往有类似发作史，查体神志淡漠，体温 39°，血压 10.7kP 80/60mmHg，脉搏 120 次/分，剑突下压痛，肌紧张白细胞 26x10⁹/L，肝区叩击痛，血清胰淀粉酶 240 所示单位，可能诊断为**急性梗阻性化脓性胆管炎**。

33、患者，男 72 岁，因冠心病间断发生在左心衰竭三年，半天来与家人争吵后心悸气短不能平卧，咳粉红色泡沫痰急诊入院。体检 bp90/60mmHg，R 28 次/分，坐位口唇发干，两肺满布湿罗音及哮鸣音。急诊护士应给予患者的吸氧方法是 **高流量酒精湿化吸氧**。

34、某患者不能被唤醒，眼眶有反应，瞳孔对光反射，角膜反射存在此起种情况为 **浅昏迷**

35、患者女 43 岁，患胆石症六年，两天前腹痛，寒战，高热和黄疸发作。门诊用抗生素输液治疗无效。入院来源时发现患者神志不清，血压 75/50mmHg，考虑为 **急性重症胆管炎**

36、患者女，28 岁，四个月来自觉胸闷，两个月来有低热、盗汗，近三周来劳累后自觉气促入院，查体：颈静脉怒张，心界扩大，心音低钝，心率 96 次/分，律齐无杂音，胸部 CT 示右肺上叶及右肺中叶散在斑片状，絮状阴影，肝肋下 2.5cm 肝颈静脉回流呈阳性，超声心动图示心包大量积液，目前该患者应采取 **心包穿刺抽液**

37、郑先生系统性红斑狼疮患者经住院治疗症状基本缓解，此时护士对患者的健康指导是。**远离紫外线，禁止进入紫外线消毒室，外出时带遮阳伞或者遮阳帽，禁用化妆品局部温水湿敷每日三次**

38、患者，男 62 岁，糖尿病病史十年，近一个月来出现午后低热，盗汗，乏力，消瘦，近三日出现高热，咳嗽，咳痰，痰中带血。入院痰液检查是结核分支杆菌阳性，诊断为肺结核，医院给予链霉素治疗，护士为患者进行的药物指导中告诉患者链霉素长期应用可出现的不良反应是**耳聋和肾功能损坏**，也就是**眩晕和听力障碍**

39、患儿腹泻，脱水入院，经补液，脱水基本纠正，但患儿精神萎靡，四肢无力，心音低钝，腹胀，腱反射减弱，应考虑为**低钾血症**

40、新型冠状病毒所致疾病的潜伏期将密切接触者医学观察期为 **14 天**

41、需采集静脉血，同时进行多项化验。检查时如将血液同时抽出血液注入各试管的顺序是**血培养瓶-血常规试管-查电解质的试管**

42、患者男性 70 岁患脑血栓致偏瘫，入院后发现其骶尾部有一 4×cm 大小的，呈紫红色的皮肤，触之较硬，并有一大水疱，护士对局部皮肤应采取用措施 **无菌注射器抽出水泡内液体后消毒包扎**

43、妇科门诊某已婚妇女自诉白带增多，外阴瘙痒伴灼热感一周检查阴道黏膜充血(++)有散在红色斑点。白带呈泡沫状，灰黄色，质稀薄，有腥臭味儿。在等病的预防中，应该消灭传染源，及时和发现治疗患者。注意消毒隔离，防止交叉感染。**被褥内裤要勤换，改善公共卫生设施，不能使用抗生素和雌激素**。假丝酵母菌阴道炎

44、女 30 岁，抑郁症患者半小时前服大量安眠药，为其洗胃过程中患者出现腹痛。**同时吸出血性液体，此时应立即停止洗胃**

45、患者，男 75 岁，患支气管哮喘，因受凉后出现胸闷。呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音。入院既往史上呼吸道感染后有类似发作史，对其健康教育，最重要的是**预防上呼吸道感染**

46、患儿女 2 个月，因肺炎高烧急诊入院，护士为其进行输液时两次穿刺失败。患儿父亲非常生气，甚至谩骂护士，导致此事件发生的主要因素是 **角色期望冲突**

- 47、青霉素皮试注射剂量为 **20-50U**
- 48、患儿，女一岁，诊断为化脓性脑膜炎，因频繁抽搐急诊入院。入院时全身肌肉痉挛，双手握拳，两眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，有痰鸣，头向后仰，首要护理措施是 **清除口腔分泌物，保持呼吸道通畅**
- 50、张某 35 岁，早晨在全麻下进行胃大部分切除。其血型为 AB 型，RH+，因库存血不足，患者体质较好，自体输血 250ml，需准备 4%的枸橼酸钠生理盐水 **25mL**(自体输血时，每 100ml 血液中加入 4%的枸橼酸钠溶液 10mL)
- 51、患者女，24 岁，抑郁症因口服敌百虫自尽，被送急诊，查体:躁动，瞳孔缩小，两肺布满湿罗音，**可口服阿托品，应用解磷定，卧床休息，吸氧，应用抗生素**
- 52、女士接种乙肝疫苗后出现低热，食欲缺乏。该患者出现上述症状最可能的原因是 **正常反应**
- 53、患者，男性 75 岁，有慢性支气管炎病史 20 年，两周前，受凉后出现咳嗽，咳白色粘液，伴呼吸困难，胸闷，乏力，诊断为慢性支气管炎，慢阻性肺气肿。患者可能出现的并发症是 **呼吸衰竭**。
- 54、男，46 岁，因急性脑出血入院，护士在巡查时发现患者出现一侧瞳孔散大。呼吸不规则，此时患者有可能出现的并发症是 **脑疝**
- 55、**过滤除菌**是用于手术室器官移植烧伤病人
- 56、患者女性 43，行胆总管切开取石，T 管引流术后 12 天，体温正常，无黄疸，每天引流透明黄色胆汁 50ml。患者下床时，不慎将 T 管脱出 **观察病情，暂不做处理**
- 57、患者，男 62 岁，因慢性阻塞性肺疾病入院治疗，现病情稳定准备出院 **不妥的是长期规则服用抗生素**
- 58、患者女 48 岁，慢性肾小球肾炎八年伴高血压三年，近一个月来饮食下降，精神萎靡频繁，常出现鼻衄，一天前发现大便颜色黑亮，似柏油样。门诊检查肾功能是血肌酐 790，血尿素氮 8.8，现在治疗中可代替失去功能的肾脏排泄各种毒物方法是 **透析治疗**
- 59、患者男，46 岁，因车祸头部受重伤，无自主呼吸，使用人工呼吸机后，若通气量合适，患者不应该出现的状况是 **皮肤潮红，出汗**。
- 60、肝叶切除术，术前肠道准备 术前三天应用 **酸性液灌肠**
- 61、空气栓塞，空气进入静脉，先进入右心房再进入右心室 **C③**
- 62、患者 28 岁第一胎孕足月，今晨产钳助娩一男婴，体重 3.5 千克，出生后 Apgar 评分 7 分，属于轻度缺氧，应严密观察面色呼吸，哭声，**禁止每日淋浴**
- 63、患者，男 68 岁。脑出血急诊入院医嘱一级护理给予心电监护。接诊护士在给患者女儿做入院介绍时，遭到了家属的强烈拒绝，最可能的原因是 **正在对患者进行抢救**。
- 64、甲状腺手术后六小时内应该采取去 **枕平卧，位头偏向一侧**。
- 65、肾病综合征患者。供给的热量要充足，不少于 **30-35**
- 66、某患者初产妇胎儿娩出不久，突然出现烦躁不安，呛咳，呼吸困难，发干，心率快而弱。该产妇最可能的诊断是 **羊水栓塞**
- 67、患者女，25 岁前额及眶部被车撞伤，眼睑青肿，结膜下出血，鼻部不断流、血性液体考虑是 **颅前窝骨折**。熊猫眼征，脑脊液鼻漏
- 68、患者男 48 岁，乏力两年半，间断牙龈出血。腹胀一个月四小时前吃烙饼后突然心慌出汗。并呕吐暗红色血液 200ml，来院急查血压 85-55。心率 126 肋下 3cm，既往肝炎病史十余年。对该患者应采取 **快速输液输血，补充血容量**。
- 69、患者女 70 岁，肝癌晚期肝性脑病入院。患者突然失控，情绪躁动，为保证患者的安全，**应加床挡约束带保护患者**
- 70、患者女 33，全身乏力，低热伴左上腹肿块半年。肝肋下 2cm，脾肋下 7cm，化验血红

蛋白 80g/mL, 白细胞 $140 \times 10^9/L$, 血小板 $100 \times 10^9/L$, 骨髓增生明显活跃, 以粒细胞为主, ph 染色体阳性, 首选的化疗药物是 **羟基尿口服**

71、假丝酵母菌的冲洗溶液是 **2%的碳酸氢钠**。

72、患者男 58, 饱餐后出现上腹持续性疼痛, 并向左肩, 腰背部放射。伴恶心, 呕吐。诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中与其病发生相关的是 **有胆绞痛史**

73、绒毛膜癌常见的转移部位是 **肺**, 死亡主要原因 **脑转移**

74、某产妇因第二产程延长, 经助产分娩一男婴。体重 3500 克, 胎盘娩出后阴道持续出血约 800ml。护理措施正确的是 **检查胎盘胎膜是否完整**

75、患者, 男 18 岁, 晨跑后感左侧胸闷, 腹胀, 气促, 出冷汗。查体神情面色苍白, 唇发绀。应该做 **胸部 x 线检查**

76、静脉留置针套管儿滴入不畅, 应 **检查管道抬高输液瓶位置**。

77、慢性阻塞性肺气肿病史十年, 出现昼眠夜醒, 提示 **肺性脑病**

78、患儿四岁, 急性肾炎病情加重, 呼吸困难, 不能平卧, 咳泡沫痰, 尿量减少, 患儿可能发生了 **严重循环充血**

79、患者男 32 近半年出现神经过敏, 多言好动, 易激动, 紧张, 焦虑。颈前弥漫性肿大, 疑似甲亢, 下列检查对诊断没有价值的是。 **血激酸激酶同工酶(CK-MB 连续测定可用于急性心肌梗死的诊断)**

80、肝硬化皮肤瘙痒是由于肝硬化功能受损病人 **血清胆红素增高所致**

81、甲状腺功能亢进术后最危险的并发症是 **呼吸困难和窒息**。

82、患者甲状腺功能亢进术前服用碘剂目的是 **抑制甲状腺素释放** 甲亢病人 **禁用阿托品**

83、患者男 18 岁大面积烧伤伴休克住院, 一周来 尿少, 每日尿量不足 400ml。该患者肾功能处于何种状态?急性肾衰少尿期 错误的是 **不能多吃水果和维生素**(急性肾衰少尿期应限制蛋白质的摄入和液体摄入。)

84、患者女 58 岁, 诊断为右肺中央型肺癌, 行右肺全肺切除术。患者术后的病理结果提示肿瘤对放射治疗非常敏感。最可能的病理类型是 **小细胞癌**

85、患者, 男 18 岁, 晨练时突感左侧胸痛, 气促, 查体呼吸 30 次/分, 心率 110 次/分, 神志清楚, 面色苍白, 口唇发干, 左上肺叩诊为鼓音, 呼吸音消失。胸部 x 线检查示右肺压缩 90%, 诊断为自发性气胸。胸腔闭式引流 5 天后, 护士发现水封瓶长玻璃管内的水柱波动消失, 患者咳嗽时水柱有波动出现, 提示 **肺膨胀良好**。该患者主要的护理问题是 **低效型呼吸型态**, 穿刺部位应 **锁骨中线外第 2 肋间**

86、新生儿日龄三天, 皮肤、巩膜黄染, 精神食欲尚好, 粪便呈黄色糊状。实验室检查血清胆红素 128umol/L, 血常规无异常, 小儿血型为 O 型, 其母为 B 性, 该婴儿黄染的原因可能是 **生理性黄疸**, 有利于婴儿黄疸消退的食物是 **糖水**。最佳处理措施是 **观察黄疸变化**。

87、小儿, 女六岁, 由家长带到社区保健中心接种水痘疫苗, 接种前护士应特别注意向家长询问患儿的境况的是 **发热情况**。接种后一分钟突然发生, 面色苍白, 口唇发绀, 喘息样呼吸, 四肢抽搐, 护士判断该小儿发生了 **过敏性休克**。

88、患者, 女性 57 岁, 患白血病 2 年, 在治疗缓解期, 患者突然出现头痛, 头晕, 意识模糊来院急诊, 对 ICU 的重症患者进行护理记录时 **不宜采取**的做法是 **写错可刮涂后重写**。该患者可能发生的合并症是 **中枢神经系统白血病**。

89、患者, 男, 30 岁, 因车祸受伤急诊至医院。见右股部中段明显肿胀青紫, 患处有假关节活动(异常活动), x 线检查示右股骨干中段粉碎性骨折, 其他检查未见明显异常, 入院后可行牵引术, 正确的护理是 **保持床尾(足端)抬高**。早期应首先注意观察的并发症是 **休克**。现场急救时, 急诊科护士应首先 **夹板临时固定**。

90、患者女性 50 岁, 近日低热, 食纳差, 收住院治疗, 病区护士接到通知后, 应为病人准

备的床单位是**暂空床**。患者入院后，护士评估病人，其收集资料的主要来源是**病人**。影响护士对病人进行评估的关键因素是**观察能力**。

91、初孕妇 29 岁，妊娠 38+3 周，规律腹痛 4 小时入院，单臀位，估计胎儿重 3000 克，骨盆外测量正常，最易发生的并发症是**胎膜早破，脐带脱垂**。处理原则**不妥**的是**胎方位为臀位的初产妇一律行剖宫产**。

92、水果中起通便作用的营养素是**纤维素**。