

2020护士资格考试押题卷  
专业实务

专业实务

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题写的相应字母所属的方框涂黑。

1. 自我胎动计数，哪项为异常：

- A. >3 次/h
- B. >5 次/h
- C. <10 次/12h
- D. >20 次/12h
- E. >30 次/12h

2. 不孕症妇女了解有无排卵最简单的方法是

- A. 诊断性刮宫
- B. 阴道侧壁涂片
- C. 子宫颈黏液检查
- D. 激素水平测定
- E. 基础体温测定

3. 癲症患者抽搐发作时，紧急处理常用的药物是

- A. 地西洋
- B. 氯氮平
- C. 奋乃静
- D. 百忧解
- E. 丙米嗪

4. 属于传染病预防措施的是

- A. 计划免疫
- B. 封锁疫区
- C. 环境消毒
- D. 限制集会
- E. 停工停课

5. 胎膜早破的护理，下列哪项是错误的

- A. 立即听胎心并记录破膜时间
- B. 破膜超过 12h 尚未临产遵医嘱给予抗生素
- C. 卧床休息，抬高臀部
- D. 若头先露不须观察脐带脱垂情况
- E. 注意羊水的性状和颜色

6. 新生儿的年龄是指

- A. 从出生到生后满 30d
- B. 从出生到生后满 28d

C. 从出生到生后满 2 周

D. 从孕期 28 周到生后 2 周

E. 从孕期 28 周到生后 1 周

7. 以假小叶形成为主要病理改变的疾病是

- A. 慢速肝淤血
- B. 弥漫性肝癌
- C. 急性重型肝炎
- D. 肝硬化
- E. 亚急性重型肝炎

8. 有机磷中毒时，代谢失常的神经递质是

- A. 多巴胺
- B. 乙酰胆碱
- C. 5-羟色胺
- D. 肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

9. 对肝炎病人用过的票证最好的消毒方法是

- A. 氯胺喷雾
- B. 紫外线照射
- C. 高压蒸汽灭菌
- D. 甲醛小柜熏蒸
- E. 过氧乙酸浸泡

10. 下列收集的资料哪项属于客观资料

- A. 我的头痛
- B. 咽部充血
- C. 感剖头晕
- D. 睡眠不好，多梦
- E. 感到恶心

11: 人体的热能营养素是

- A. 糖类、维生素、矿物质
- B. 糖类、脂肪、蛋白质
- C. 脂肪、糖类、维生素
- D. 蛋白质、脂肪、维生素
- E. 蛋白质、糖类、微量元素

12. 有一位药物中毒，病情较重的患者，在不知毒物名称和性质的情况下，护士给患者采取的正确体位是

- A. 坐位
- B. 半坐位

- C. 去枕右侧卧位
- D. 左侧卧位
- E. 平卧位，头偏向一侧

13. 预防室性心律失常的最佳方法是

- A. 适宜的锻炼
- B. 保持情绪稳定
- C. 良好的饮食习惯
- D. 经常进行健康体检
- E. 控制器质性心脏病病情

14. 腰穿患者去枕平卧的目的是

- A. 有利于脑部血液循环
- B. 防止脑水肿
- C. 减轻头晕、头痛
- D. 预防颅内压降低引起头痛
- E. 防止昏迷

15. 服用磺胺类药物治疗尿路感染时，加服碳酸氢钠的 作用是

- A. 抗炎
- B. 增加尿量
- C. 碱化尿液
- D. 保护尿路黏膜
- E. 增加肾血流量

16. 患者，男性，75岁，因脑梗死入院。护士交接班时发现患者胫骨部及跟尾部皮肤各有一 2.5cmX3cm 小 处发红、触痛，判断该压疮属于

- A. 淤血红润期
- B. 淤血浸润期
- C. 浅层溃疡期
- D. 深层溃疡期
- E. 坏死溃疡期

17. 组成胎膜的是

- A. 真蜕膜和羊膜
- B. 底蜕膜和羊膜
- C. 绒毛膜和羊膜
- D. 包蜕膜和羊膜
- E. 绒毛膜和底蜕膜

18. 临床死亡期的特征是

- A. 呼吸功能衰竭
- B. 意识丧失

C. 无肌张力


E. 循环衰竭

E. 心搏停止

19. 丙型肝炎的主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 水传播
- C. 食源性传播
- D. 血液传播
- E. 媒介传播

20. 使用连线法为患者进行肌内注射定位时，正确的操作是



- A. ①和②连线的上 1/3
- B. ③和⑤连线的上 1/3
- C. ③和⑥连线的上 1/3
- D. ④和⑤连线的上 1/3
- E. ④和⑥连线的上 1/3

21. PDCA 循环中属“p”代表

- A. 管理
- B. 计划
- C. 实施
- D. 检查
- E. 处理

22. 检测红细胞沉降率应使用的容器是

- A. 干燥试管
- B. 抗凝试管
- C. 血培养瓶
- D. 乳酸钠试管
- E. 液状石蜡试管

23. 患者，女性，38岁。血压 90mmHg, 患者主诉平时工作繁忙，睡眠不足，有头晕、头痛、耳鸣，伴心前区不适。护士为该患者进行健康指导时，最重要的项目是

- A. 口服降压药
- B. 促进身心休息为主

- C. 测量血压、2次/天  
D. 给予镇静药  
E. 防止高血压并发症
24. 患者，男性，58岁，诊断为急性心肌梗死，医嘱要，查肌酸激酶同工酶(CK-MB)，护士制定的适宜的采血时间是
- A. 饭前  
B. 即刻  
C. 饭后2小时  
D. 服药后  
E. 明日晨起空腹时
25. 治疗风湿性心脏病二尖瓣狭窄药物中，青霉素的 作用是
- A. 风湿热  
B. 心力衰竭  
C. 动脉栓塞  
D. 心律失常  
E. 心绞痛
26. 对患者进行健康教育属
- A. 独立性护理措施  
B. 非独立性护理措施  
C. 协作性护理措施  
D. 依赖性护理措施  
E. 辅助性护理措施
27. 患儿，9个月，呕吐、腹泻4天。查体：口腔黏膜干燥，皮肤弹性差，尿量明显减少，血清钠140mmol/L，考虑该患儿为
- A. 中度低渗性脱水  
B. 轻度等渗性脱水  
C. 中度高渗性脱水  
D. 中度等渗性脱水  
E. 轻度高渗性脱水
28. 胆色素结石形成的最主要原因是
- A. 胆汁黏稠  
B. 胆道感染  
C. 胆道梗阻  
D. 高脂肪饮食  
E. 胆囊功能异常
29. 服用胃黏膜保护剂硫糖铝后最常见的不良反应是
- A. 头晕  
B. 皮疹  
C. 乏力  
D. 便秘  
E. 口干
30. 患者，男，28岁。主诉腹痛、腹泻2天，以急性胃肠炎收入院。护士遵医嘱为其进行静脉输液，操作过程中护士运用的主要非语言沟通形式是
- A. 触摸  
B. 眼神  
C. 仪表  
D. 手势  
E. 表情
31. 患儿，20天，发热2天，皮肤黄染退而复现1天。嗜睡，脐部有少许脓性分泌物，诊断为败血症。护士采取的首要护理措施是
- A. 清除脐部感染灶  
B. 加强营养支持  
C. 维持体温  
D. 保持安静，避免声、光刺激  
E. 立即放入暖箱
32. 护士可以执行医生口头医嘱的情况是医生在
- A. 抢救患者时  
B. 手术过程中  
C. 电话告知时  
D. 外出会诊时  
E. 换药期间
33. 医疗机构从业人员违反医疗机构从业人员行为规范的，视情节轻重给予处罚，其中不正确的是
- A. 批评教育、通报批评、取消当年评优评职资格  
B. 卫生行政部门依法给予警告、暂停执业或吊销执业证书  
C. 纪检监察部门按照党纪政纪案件的调查处理程序办理  
D. 缓聘、解职待聘、解聘  
E. 涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理
34. 患者，女，52岁。患慢性肝炎16年，肝硬化2年。诉1个月来腹胀、食欲减退、呼吸困难、心悸、行动不便，腹



35. 忌用冷疗的疾病是
- 急性关节扭伤
  - 慢性炎症
  - 牙痛
  - 烫伤
  - 脑外伤
36. 患者，女，50岁。工人，高中文化，有听力障碍。护士在病室与其沟通时不妥的方式是
- 核实信息
  - 倾隔身体位置与患者同高
  - 用手势和表情加强信息传递
  - 提高讲话声音与其交流
  - 可适当使用文字交流
37. 法洛四联症的主要畸形不包括
- 主动脉骑跨
  - 右心室肥厚
  - 动脉导管未闭
  - 室间隔缺损
  - 肺动脉狭窄
38. 值班护士在听到呼叫器传来呼救：“XX床患者突然昏迷了”。此时护士去病室的行姿应为
- 慢步走
  - 快步走
  - 跑步
  - 小跑步
  - 快速跑步
39. 患者女性，31岁。测体温 $39^{\circ}\text{C}$ ，医嘱即刻肌内注射复方氨基比林2ml。护士执行此项医嘱属于
- 非驾理措施
  - 独立性护理措施
  - 协作性护理措施
  - 依赖性护理措施
  - 预见性护理措施
40. 尿路感染女性发病率高于男性，是因为女性尿道较男性尿道
- 短而宽
  - 长而窄
  - 扁而平
  - 宽而长
  - 短而窄
41. 患者，女，37岁， $G_2P_0$ ，3天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏III级。患者询问检查结果的意义，正确的解释是
- 轻度炎症
  - 重度炎症
  - 可疑癌症
  - 高度可疑癌症
  - 癌症
42. 病者逝去后，护士进行尸体料理，对死者义齿的应“理方法是
- 取下丢弃
  - 装入口中
  - 取下浸泡在冷水中
  - 取下交给死者家属
  - 取下以便于在口中填塞棉花
43. 某患者因慢性肾衰竭接受了肾移植手术，术后恢复良好，心怀感激，多次向责任护士打听捐肾者家庭住址，想登门致谢。面对患者的请求，责任护士正确的做法是
- 建议电话致谢
  - 婉拒患者的请求
  - 建议给予经济补偿
  - 宣传捐献者事迹
  - 与患者一道登门致谢
44. 一位3岁病儿患急性菌痢住进医院，经治疗本已好转，即将出院。其父母觉得小儿虚弱，要求输血。碍于情面，医生同意了。可护士为了快点交班，提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹，医护人员给他输血过程中，病儿突发心脏骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是

+无知, 无原则, 违背了有利病人的原则  
系, 无知, 无原则, 违背了人道主义原则

- C. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了行善的原则
- D. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了不伤害病人的原则
- E. 曲解家属自主权, 违反操作规程, 违背了人道主义原则

45. 患者, 男, 55岁。因“食欲不佳, 乏力不适”来门诊就诊。候诊时患者突然感到腹痛难忍, 头冒冷汗, 四肢冰冷, 呼吸急促。门诊护士应

- A. 协助患者平卧候诊
- B. 安抚患者, 劝其耐心等待
- C. 安排患者提前就诊
- D. 给予患者镇痛剂缓解疼痛
- E. 请医生加速诊治前面患者

46. 三(四)腔管的正确护理措施

- A. 放置期间不得轻易放气以防滑出
- B. 定期抽吸胃管
- C. 出血停止后应立即拔管, 以防黏膜受损
- D. 放置期间, 无需定时测定囊内压力, 以防窒息
- E. 间断应用气囊压迫一般以4~5天为限

47. 支气管扩张的早期病理改变是

- A. 柱状扩张
- B. 气管扭曲
- C. 气管坏死
- D. 支气管穿孔
- E. 空洞形成

48. 属于客观资料的是

- A. 头痛
- B. 发绀
- C. 恶心
- D. 发绀
- E. 乏力

49. 做碘过敏试验的时间应在碘化物造影检查前

- A. 2周
- B. 1周
- C. 3~5天
- D. 2~3天
- E. 1~2天

50. 妊娠合并心脏病患者, 下列不正确的处理措施是

- A. 不宜妊娠者应在12周前行人工流产
- B. 孕20周后控制食盐
- C. 避免过劳和情绪激动
- D. 心功能I~II级者, 应在妊娠36~38周入院待产
- E. 心功能III级或以上者, 应立即入院治疗

51. 某患儿因“新生儿硬肿症”入院, 家长可能出现的心里反应中不包括

- A. 焦虑不安
- B. 否认疾病
- C. 角色紊乱
- D. 害怕担忧
- E. 自我责怪

52. 有关一级护理的内容, 以下各项不妥的是

- A. 专夹24小时护理
- B. 制订护理计划
- C. 严格执行各项诊疗措施
- D. 做好基础护理
- E. 满足患者身心需要

53. 开放性脑损伤的主要表现不包括

- A. 硬脑膜破裂
- B. 头皮裂伤
- C. 侧脑室
- D. 脑脊液漏
- E. 颅骨骨折

54. 以下关于记录出入量说法错误的是

- A. 主要用于休克、大面积烧伤等患者
- B. 摄入量应包括饮水量、输血量等
- C. 痰液不计入排出量
- D. 患者饮水容器应固定便于测量
- E. 固体食物应记录个数及其含水量

55. 患者, 女, 28岁, 咽炎。医嘱: 复方新诺明1.0g, po bid  
护士指导患者服药时间, 正确的是

- A. 8am
- B. 8pm
- C. 8am-4pm
- D. 8am-12n-4pm
- E. 8am-12n-4pm-8pm

56. 下列不属于超声波雾化器工作特点的是

- A. 雾滴小而均匀
- B. 药液随呼吸可到达终末支气管及肺泡
- C. 雾化液温暖、舒适
- D. 雾量的大小可以调节
- E. 用氧量小, 节约资源

57. 患者, 男, 60岁。车祸致颅脑损伤, 下肢粉碎性骨折, 深昏迷, 营养状况差, 轻度水肿。评估见尾背部皮肤紫红色, 有皮下硬结, 并有小水疱。患者目前皮肤状况处于

- A. 正常
- B. 压疮淤血红润期
- C. 压疮炎性浸润期
- D. 压疮浅度溃疡期
- E. 压疮坏死溃疡期

58. 以下属于等渗电解质溶液的是

- A. 5%葡萄糖
- B. 11. 2%乳酸钠
- C. 10%葡萄糖
- D. 5%葡萄糖氯化钠
- E. 5%碳酸氢钠

59. 患儿, 男, 3岁。奔跑时摔倒, 诊断为左前臂闭合骨折。患儿在急诊科留观期间哭闹不止, 护士提供正确的心理护理措施是

- A. 安慰, 解释治疗的重要性
- B. 请患儿妈妈进入留观室陪伴
- C. 让患儿听舒缓的音乐
- D. 询问患儿需求, 给予满足
- E. 请主治医师与患儿交谈

60. 患者, 女, 22岁, 孕39周, 入院待产。护士纯围产监护时, 进行资料收集。以下有关资料收集的叙述, 不正确的是:

- A. 资料分为主观资料和客观资料
- B. 客观资料是通过观察和体检等获得的资料
- C. 主观资料只能由患者本人提供
- D. 要客观记录患者的主述
- E. 资料的记录不应带有主观结论

61. 患儿, 女, 10岁。剑突下突发阵发性“钻顶样”剧烈腹痛3小时, 呕出一条蛔虫, 患儿立即全身发抖, 双目紧闭, 面色苍白, 查体不配合。患儿的主要心理反应为

- A.
- B. 自卑
- C. 孤独
- D. 恐惧
- E. 绝望

62. 患者, 男, 35岁。胃肠道术后第1天尚未排气, 患者感觉饥饿要求进食, 护士首先应采取的措施是

- A. 直接拒绝患者请求
- B. 询问患者想进食的食物
- C. 告知其不能进食的原因
- D. 告知可进食的食物种类
- E. 直接将此情况报告医生

63. 患者, 女, 48岁, 因急性肺炎发生中毒性休克, 以下收集资料的方法不属于观察法的是

- A. 测量患者的脉搏
- B. 听右下肺有无湿啰音
- C. 触摸皮肤温度、湿度
- D. 阅读患者查体记录
- E. 查看患者尿液的颜色与性状

64. 患者, 男, 36岁, 南方人, 出差来到北方, 因不明原因发热而入院, 入院后又出现便秘, 主要原因是对于蹲式加厕方式不习惯, 给患者的护理诊断是“便秘与环境改变有关”, 该诊断的相关因素属于哪一方面的因素

- A. 疾病
- B. 与治疗有关
- C. 心理
- D. 环境
- E. 发展

65. 急性淋巴管炎患者首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 头地菌素
- D. 卡那霉素
- E. 氨节西林

66. “120”接诊了一名车祸致昏迷的患者, 脑CT提示颅内大量出血, 需立刻行开颅手术。患者无亲属陪伴, 也无证实其身份和联系人的信息, 依据《侵权责任法》的规定, 术前正确的做法是

- A. 通知手术室准备手术
- B. 报告派出所寻找家属

- C. 报告科室负责人获批
- D. 报告医院负责人获批
- E. 报告卫生行政部门负责人获批

67. 患者，女，65岁，股骨颈骨折，身体虚弱，生活不能自理，为患者做晨间护理的最佳顺序为

- A. 便器-皮肤护理-扫床-口腔护理
- B. 口腔护理-用便器-皮肤护理-扫床
- C. 扫床-用便器-皮肤护理-口腔护理
- D. 皮肤护理-扫床-用便器-口腔护理
- E. 用便器-口腔护理-皮肤护理-扫床

68. 患者，男，16岁，因右踝扭伤门诊就医，测得体温  $36.4^{\circ}\text{C}$ ，脉搏 70 次/分，呼吸 18 次/分，血压 90/58mmHg，此时护士应首先

- A. 安置患者于仰卧位
- B. 立即通知医生
- C. 备好升压药
- D. 询问其基础血压值并给予解释
- E. 建立静脉输液通道并解释

69. 糖皮质激素用于治疗哮喘的主要作用是

- A. 降低痰液黏稠度
- B. 抑制气道炎症反应
- C. 舒张支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽中枢
- E. 兴奋呼吸中枢

70. 临终患者最后丧失的感觉是

- A. 视觉
- B. 嗅觉
- C. 味觉
- D. 听觉
- E. 痛觉

71. 患者，男，45岁，因胆囊切除术后，回病房时四肢冰凉，给予热水袋，应调节水温为

- A.  $40^{\circ}\text{C}$  ~  $45^{\circ}\text{C}$
- B.  $45^{\circ}\text{C}$  ~  $50^{\circ}\text{C}$
- C.  $50^{\circ}\text{C}$  ~  $60^{\circ}\text{C}$
- D.  $60^{\circ}\text{C}$  ~  $70^{\circ}\text{C}$
- E.  $70^{\circ}\text{C}$  ~  $75^{\circ}\text{C}$

液为

- A. 中分子右旋糖酐

72. 孕妇，29岁，孕37周，G<sub>2</sub>P<sub>0</sub>，前置胎盘入院。现有少量流血，孕妇担心胎儿安危会产生心理问题是

A. 无助感

B. 恐惧

C. 悲哀

D. 自尊低下

E. 倦怠

73. 患者，女，65岁，腰肌劳损，为减轻疼痛。可采南”

A. 热敷

B. 冷敷

C. 按摩

D. 红外线照射

E. 绷带包裹

74. 护士在体温单上绘制肛温的符号为

A. 导（蓝韵）

B. 0（蓝色）

C. •（红色）

D. X（蓝色）

E. •（蓝色）

75. 患者，女，32岁，大叶性肺炎，痰液黏稠不易咳出，医嘱行超声雾化吸入稀释化痰止咳。使用超声波雾化器过程中，水槽内水温不窟过

A.  $70^{\circ}\text{C}$

B.  $60^{\circ}\text{C}$

C.  $50^{\circ}\text{C}$

D.  $40^{\circ}\text{C}$

E.

76. 患者，女，25岁。右小腿有10cmX5cm的肉芽组织水肿创面。换药时应选用的湿敷药液是

A. 等渗盐水

B. 0.02%呋喃西林溶液

C. 0.1%依沙吖啶溶液

D. 含氯石灰硼酸溶液子；

E. 5%氯化钠溶液

77. 患者，女，58岁，确诊慢性肾小球肾炎10余年，近1周来出现双下肢水肿加重，静脉输液宜选用的胶体溶

B. 低分子右旋糖酐

C. 浓缩白蛋白注射液

- p. 低分子羟乙基淀粉
- E. 复方氯化钠注射液

78. 某肝癌晚期患者住院期间情绪激动，常常指责或挑剔家属和医护人员，护士正确的护理措施是

- A. 给患者正确的死亡观和人生观教育
- B. 让患者尽可能的一个人独处
- C. 认真倾听患者的心理感受
- D. 诚恳地指出患者的不恰当做法
- E. 减少和患者的语言交流

79. 可能和自身免疫有关的急性心肌梗死的并发症是

- A. 乳头肌功能不全
- B. 心肌梗死后综合征
- C. 心室膨胀瘤
- D. 心脏破裂
- E. 栓塞

80. 苯巴比妥钠作为局部麻醉前用药，主要是因为

- A. 有镇静作用
- B. 减少局麻药用量
- C. 提高痛阈
- D. 能抑制平滑肌痉挛
- E. 能预防局麻药中毒反应

81. 体重指数（BMI）大于等于何值时为心血管疾病危险因素

- A.  $20\text{kg}/\text{m}^2$
- B.  $24\text{kg}/\text{m}^2$
- C.  $28\text{kg}/\text{m}^2$
- D.  $30\text{kg}/\text{m}^2$
- E.  $32\text{kg}/\text{m}^2$

82. 法洛四联症患者，青紫轻重程度决定于…

- A. 室间隔缺损程度
- B. 卵圆孔是否关闭
- C. 肺动脉狭窄程度
- D. 右心室增大程度
- E. 主动脉骑跨程度

83. 属于长期医嘱的是

- A. 地塞米松  $5\text{mgivqd}$
- B. 查尼丁  $0.2\text{gpoq2hX}5$

- C. B超
- D. 安定  $5\text{mgposos}$
- E. 速尿  $5\text{mgimst}$

84. 噫者，男，36岁。农民，尿毒症晚期，因无法承担高额的治疗费用欲放弃治疗，护士长发动全体护士为其捐款，此举动护士承担的主要角色是

- A. 决策者
- B. 协调者
- C. 照顾者
- D. 帮助者
- E. 管理者

85. 患者，男，73岁，高血压患者，于睡眠中突感极度胸闷、气急、大汗、咳嗽、咳痰带血，端坐呼吸，血压  $180/100\text{mmHg}$ ，心率  $110$  次/分，估计该患者可能发生了

- A. “高血压危象”
- B. 高血压脑病
- C. 急性肺水肿
- D. 肺梗死
- E. 肺栓塞

86. 患者，男，25岁，突感心悸、胸闷，听诊心率  $180$  次/分，律齐，第一心音强度一致，血压正常，意识清楚，该患者最可能的原因是

- A. 心房颤动
- B. 心室颤动
- C. 窦性心动过速
- D. 室上性心动过速
- E. 室性心动过速

87. 属于氨中毒引起肝性脑病的主要机制是

- A. 氨导致蛋白质代谢障碍
- B. 氨干扰脑的能量代谢
- C. 氨取代正常神经递质
- D. 氨引起神经传导异常
- E. 氨使氨基酸代谢不平衡

88. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是

- A. 青霉素
- B. 黄连素
- C. 制霉菌素
- D. 蒙脱石散
- E. 双歧杆菌

89. 下列药物中, 通过扩张动脉和静脉减轻心脏负荷的是

- + . 螺内酯
- , 前' 美托洛尔
- C. 哌哩嗪
- D. 地高辛
- E. 硝酸甘油

90. 能够促进护士与患者有效沟通的一般技巧是

- A. 及时陈述观点
- B. 表达个人判断
- C. 迅速做出解答
- D. 控制沟通时间
- E. 避免话题脱离预设目标

91. 为达到置换病室内空气的目的, 一般每次通风的时间是

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 60 分钟
- E. 90 分钟

92. 患者, 女, 45 岁。反复不规则发热 6 个月, 半个月前出现左下肢酸痛, 行走困难, 伴胸闷, 心悸, 被诊断为“亚急性感染性心内膜炎, 二尖瓣脱垂伴关闭不全”, 建议手术治疗。患者对手术非常担心, 适宜的护理措施是

- A. 建议患者转院
- B. 告知患者手术已经安排, 无法更改
- C. 向患者介绍手术成功的例子
- D. 告诉患者手术很简单
- E. 建议患者签字放弃治疗

93. “地西洋 5mg po sos”属于

- A. 长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 临时医嘱
- D. 临时备用医嘱
- E. 短期医嘱

94. 患者, 女, 25 岁。车祸导致面部开放性伤口。经清创缝合后, 暂时入院观察, 应采取的体位是

- A. 膝胸位
- B. 俯卧位
- C. 半坐卧位

95. 在铺暂空床的操作中, 符合节力原则的是

- A. 操作前备齐用物, 按顺序放置
- B. 操作中使用腕部力量
- C. 铺床角时两脚并列站齐
- D. 塞中单时身体保持站立位
- E. 铺大单时身体尽量远离床边.

96. 关于衰老表现的叙述, 正确的是

- A. 老年人的体重随年龄的增加而增加
- B. 老年人的血压随年龄的增加而降低
- C. 老年人的心率随年龄的增加而增加
- D. 老年人生活自理能力随增龄而降低
- E. 老年人眼睛近视程度随增龄而增加

97. 处理出院病人医疗护理文件的方法, 错误的是

- A. 噩龜病历交病案室保存
- B. 出院病历的最后一页是体温单
- C. 诊断卡、治疗卡夹入病历内
- D. 注销床头卡、饮食卡
- E. 填写病人出院登记本

98. 医嘱 0. 9%氯化钠溶液 500ml iv gtt。患者从上午 8 点 20 分开始输液, 输液器点滴系数为 20。护士根据情况把输液速度调整至 40 滴/分, 预计输液完成的时间为

- A. 上午 9 时 56 分
- B. 上午 11 点 40 分
- , 中午 12 [时料) 分
- D. 下午 [商 20 分
- E. 下午 2 点 15 分

99. 护士为患者分发口服药后将一次性药杯收回, 正确的处理方法是

- A. 直接丢弃
- B. 消毒后销毁
- C. 清洗后销毁
- D. 消毒后备用
- E. 清洗后备用

100 探患者因胸腔积液行胸腔闭式引流, 正确的操作是

- A. 将胸腔引流管连接于 A 管
- B. 将胸腔引流管连接于 D 管
- C. 每天记录引流瓶 (2) 的液体量

二、以下提供若干个案例，每个案例下设若干考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(101~103题共用题干)

患者，女性，52岁。风湿性心脏瓣膜病，二尖瓣狭窄10余年。3天前受凉后出现咳嗽，咳黄色黏痰，伴发热、胸闷、心悸、气短，上三层楼梯需中间休息5分钟，自服感冒药后未见改善，急诊以“风湿性心脏瓣膜病、心力衰竭、肺部感染”收入院。

101. 引起该患者发生心力衰竭的基本病因是

- A. 原发性的心肌损害
- B. 右心房代偿性扩张
- C. 心室后负荷过重
- D. 心室舒张充盈受限
- E. 心室前负荷过重
- E. V级

102. 导致患者发生心力衰竭的公要诱因是素肺部感染

- B. 心律失常
- C. 缺乏休息
- D. 恶劣的气候
- E. 用药不当

103. 护士根据患者目前的情况，判断患者心功能分级属于

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级

(104~106题共用题干)

患者，女性，65岁，2型糖尿病5年，遵医嘱胰岛素6U治疗，餐前30分钟，H, t iD

104. 护士应选择的合适注射部位是

- A. 腹部
- B. 背部
- C. 前臂
- D. 臂中肌
- E. 臀小肌

105. 遵医嘱护士每日的给药次数应为

- A. 每日1次
- B. 每日2次
- C. 每日3次
- D. 隔日1次
- E. 每周2次

106. 医嘱中的H代表

- A. 羧麻点滴
- B. 皮下注射
- C. 皮内注射
- D. 肌内注射
- E. 静脉注射

(107~108题共用题干)

患者女性，59岁。持续高热3天，每隔4小时测一次体温，都在39. TC以上，最高达40°C，经检查诊断为“伤寒”。

107. 该患者的热型属于

- A. 弛张热
- B. 潮热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波浪热

108. 护理该患者，正确的措施是

- A. 每日测体温4次
- B. 体温超过39. 2°C，给予酒精拭浴
- C. 药物降温1小时后复测体温
- D. 鼓励患者多饮水多运动
- E. J 患者有寒战，应注意保暖

(109、110 题共用题干)

患者，因输液速度过快，量过多，输液过程中突然出现呼吸困难、气促、咳嗽、咳出泡沫样血痰。

；10'9, 护士采取的急救措施应除外

- A. 取端坐卧位
- B. 立即减慢输液速度
- C. 四肢静脉轮流结扎
- D. 立即给氧
- E. 给予收缩血管药

110. 采取端坐位，两腿下垂并四肢轮流结扎的主要目的是

- A. 减少肺泡内毛细血管漏出液的产生
- B. 减少回心血量
- C. 增加患者舒适度
- D. 制动，减少心肌耗氧量
- E. 改善末梢血循环，提高组织兴奋性

(11 - 113 题共用题干)

患者，女，78 岁，因右侧肢体活动不便 4 小时入院。入院时神志清楚，呼吸 18 次/分，脉搏 90 次/分，血压 165/95mmHg，右侧肢体肌力 2 级。既往有高血压和糖尿病史

111. 护士对该患者及其家属进行入院宣教，宣教重点是

- A. 请不要到医生护士办公室翻看病历
- B. 主治医师的专业方向
- C. 应该尽早开始进行康复锻炼
- D. 当前应该卧床休息，不可自行起床活动
- E. 应该每天进行身体清洁

112. 医嘱要求急送该患者行 CT 检查，护士首先必须

- A. 告诉其家属 CT 室方位
- B. 先给患者吸氧 30 分钟后再送检查
- C. 安排用平车送患者前往
- D. 查看检查单是否已经收费
- E. 报告护士长请求外出

113. 该患者回到病床后，护士应该立即完成的护理措施是

- A. 睡硬板床
- B. 双侧上床栏
- C. 插留置导尿管

- D. 保持左侧卧位
- E. 进行手术前准备

(114^117 题共用题干)

患者，女，56 岁。卵巢癌术后，拔出尿管后 7 小时未能自行排尿。查体：耻骨上部膨隆，叩诊呈实音。有压痛，考虑尿潴留。

114. 为患者提供的护理措施中，维护其自尊的是

- A. 教育其养成良好的排尿习惯
- B. 耐心解释并提供隐蔽的排尿环境
- C. 调整体位以协助排尿
- D. 按摩其下腹部，使尿液排出
- E. 温水冲洗会阴以诱导排尿

115. 为患者实施导尿时，第 2 次消毒的顺序是

- A. 自上而下，由外而内
- B. 自下而上，由外向内
- C. 自下而上，由内向外
- D. 自上而下；由内向外
- E. 修而下，由内向外再向内

116. 首次导出尿液不应超过

- A. 1000ml
- B. 1200ml
- C. 1500ml
- D. 1700ml
- E. 2000ml

117. 如果一次放尿过多，将会发生

- A. 周叠挛缩
- B. 加重不舒适感 d 血尿和富脱
- D. 诱发膀胱感染
- E. 膀胱反射功能恢复减慢

(118^120 题共用题干)

患者，女性，45 岁，近日来反复上腹疼痛，进食后 4h 左右疼痛明显，进餐后可缓解，夜间有明显的上腹咂排黑粪 3d

118. 考虑诊断为

- A. 胃溃疡出血
- B. 十二指肠溃疡出血
- C. 痔出血

- D. 门静脉高压出血
- E. 急性胰腺炎

119. 护士为患者首先要采取的护理措施是

- A. 卧床休息
- B. 立即输血
- C. 禁食和胃肠减压
- D. 进食温凉的流食
- E. 心理疏导

120. 医生给予患者法莫替丁 20mg 口服,护士应如何指导患者服此药

- A. 餐前服用
- B. 餐中服用
- C. 餐后 2h 服用
- D. 晨起空腹服
- E. 嚼碎服

## 实践能力

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑 9

1. 治疗三叉神经痛的首选药物是

- A. 地西洋
- B. 氯丙嗪
- C. 卡马西平
- D. 氟哌噻醇
- E. 苯妥英钠

2. 结肠癌最早出现的临床表现多为

- A. 排便习惯及粪便性状改变
- B. 腹痛
- C. 肠梗阻症状
- D. 腹部肿块
- E. 贫血

3. 缺氧时，突出的临床表现是

- A. 皮肤湿冷，尿量减少
- B. 面色潮红，脉搏洪大
- C. 辗转反侧，呻吟不止
- D. 烦躁不安，口唇发绀
- E. 头晕眼花，血压下降

4. 引起尖锐湿疣的病原体是

- A. 苍白螺旋体
- B. 假丝酵母菌
- C. 阴道毛滴虫
- D. 人乳头状瘤病毒
- E. 淋病奈瑟菌

5. 患者女, 45 岁。慢性心力衰竭伴全身水肿。经诊疗后需要入院观察，住院处办理入院手续的根据是

- A. 单位介绍信
- B. 门诊病历
- C. 略病历
- D. 住院证
- E. 医保\*

6. 患者，女性，50 岁，拟行子宫切除术。术前留置导尿管的目的是

- A. 防止尿路感染

- B. 做尿培养
- C. 测定残余尿
- D. 避免术中误伤膀胱
- E. 避免出现尿潴留

7. 十二指肠溃疡易发生大出血的部位是

- A. 球部后壁
- B. 球部前壁
- C. 横部
- D. 升部
- E. 降部

8. 给高钾血症患者静脉注射 10%葡萄糖酸钙，主要目的是

- A. 促进糖原合成
- B. 促进钾的排出
- C. 对抗钾对心肌的抑制

\*促进蛋白质合成

- E. 对抗钾对神经的毒害作用

9. I 型呼吸衰竭主要见于

- A. 肺泡血量不足
- B. 肺泡通气不足
- C. 氧耗量不足
- D. 肺换气功能障碍
- E. 肺内动、静脉解剖分流增加

10. 为念珠菌性阴道炎病人作阴道灌洗，宜选择的药液是

- A. 生理盐水
- B. 1%高锰酸钾
- C. 0.5%乙酸
- D. 1%乳酸
- E. 2%~4%碳酸氢钠

11. 孕妇自我胎动计数哪项为异常

- A. >3 次/小时
- B. >5 次/小时
- C. <10 次/12 小时
- D. >20 次/12 小时
- E. >30 次/12 小时

12. 药物保管中，剧毒药使用的标签颜色是

- A. 蓝色

- B. 红色
- C. 黑色
- D. 绿色
- E. 黄色

；13'：引导病邪或有害物质，使之从口涌吐的方法为

- A. 汗法
- B. 下法
- C. 吐法
- D. 和法
- E. 清法

14. 小儿出生后生长发育速度最快的时期重%

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

15；新生儿期感染后最常出现的症状是

- A. 哭闹
- B. 拒乳
- C. 黄疸
- D. 偏食
- E. 便血

16. 为了给患者创造良好的住院环境，下列适宜的是

- A. 儿科病室冬季室温在 22~24° C
- B. 产妇病室应注意保暖，不能开窗通风，以免产妇着凉
- C. 支气管扩张患者室内湿度在 35%
- D. 破伤风患者勿剧烈活动，室内应通风良好、光线充足
- E. 哮喘患者房间可摆放鲜花和绿色植物

17. 股静脉穿刺后，局部按压时间至少为

- A. 1 分钟
- B. 3 分钟
- C. 5 分钟
- D. 7 分钟
- E. 10 分钟

18. 患者，男性，30 岁。患有精神分裂症，罪恶妄想童  
信自己有罪拒绝进食，护士有效的护理方法是

- A. 喂食
- B. 鼻饲

- D. 单独进食
- E. 饭菜混合一起

19. 老年入睡时容易发生脑血栓的原因是 A. 血液黏稠，流  
动缓慢

- B. 脑缺血
- C. 血际:莅
- D. 血鹿过高
- E. 脑血管痉挛

20. 成人经静脉补充钾离子时，要求尿量每小时不得少 g  
于

- A. 20ml
- B. 30ml
- C. 40ml
- D. 50ml
- E. 60ml

21. 急性心肌梗死后，心律失常发生率最高的时间为

- A. 24 小 § 内
- B. 涉 3 天
- C. 4~7 天
- D. 2 周以内
- E. 1 个月以内

22. 患者，男性，18 岁。从高处坠落，臀部着地致胸 1 斌  
腰 1 椎体压缩性骨折。导致骨折的原因是

- A. 直接暴力
- B. 间接暴力
- C. 肌肉牵拉
- D. 骨;贛劳损
- E. 骨骼疾病

23. 空腹时大肠最常见的运动形式是

- A. 翅疇劫
- B. 分节运动
- C. 紧张性收缩
- D. 袋状往返运动
- E. 多袋推进运动

24. 列关于氨茶碱的叙述，错误的是

- A. 有松弛支气管平滑肌的作用
- B. 常用给药途径为肌内注射
- C. 静脉注射应使用葡萄糖稀释后慢推

C. 集体进食

D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降

E. 浓度过高可引起心脏骤停

25. 患者，男性，38岁。焦虑症。患者惶恐不安，头晕、心悸，失眠、梦魇，有自杀企图，服用地西洋治疗。该患者的主要护理问题是

- A. 焦虑
- B. 恐惧
- C. 自杀
- D. 社交障碍
- E. 思维异常

26. 患者，女性，34岁，因“不孕症”就诊，行各项检查后，发现患者患有梅毒。门诊护士将此信息告知了科室的其他护士。该护士的行为属于

- A. 侵犯了患者的生命健康权
- B. 侵犯患者的隐私权
- C. 侵犯患者的同意权
- D. 侵犯患者的公平权
- E. 保护护理人员健康

27. 外伤后大出血处于休克的患者，护士为补充血容量，调整补液速度最有效的观察指标为

- A. 尿量
- B. 呼吸
- C. 血压
- D. 末梢循环
- E. 体温

28. 心源性水肿常首先表现为

- A. 心前区水肿
- B. 眼睑水肿
- C. 足踝部、胫骨前水肿
- D. 胸腔积液或心包积液
- E. 腹水

29. 小陈是病人严某的责任护士，但第一次交流就失败，请分析造成其失败的原因是

- A. 表情沉着、从容
- B. 在病人吃饭前进行交谈
- C. 热情介绍自己
- D. 选择一个安静环境进行交谈
- E. 仪表大方、整洁

30. 患儿，男，3岁。出生后1个月发现心脏杂音，确诊室

间隔缺损，近日来，患儿成诱因出现青紫，不喜动，乏力，呼吸急促，心率120次/分，考虑该患儿可能出现

- A. 法洛四联症
- B. 呼吸衰竭
- C. 心力衰竭
- D. 缺血缺氧性脑病
- E. 艾森门格综合征

31. 易引起周围神经炎的抗结核药物为

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 链霉素
- D. 对氨基水杨酸
- E. 乙胺丁醇

32. 房性期前收缩心电图特征中，下列描述正确的是

- A. P波提早出现，形态与窦性P波相同
- B. -R间期大于0.20秒
- C. 期前收缩的代偿间歇多不完全
- D. %S波群妻大畸形
- E. 房性期前收缩的P波后可无QRS波群。

33. 患者，男性，38岁，十二指肠溃疡病8年。近2个月来，上腹胀满不适，伴反复呕吐酸臭味宿食。为确诊最可靠的检查是

- A. X线积剂造影
- B. B超
- C. MRI
- D. 纤维胃镜
- E. 腹部CT

34. 患者，男性，34岁。不小心触高压电，导致心跳呼吸骤停。心肺初期复苏成功后，最重要的是恢复

- A. 消化功能
- B. 呼吸功能
- C. 循环功能
- D. 泌尿系统功能
- E. 中枢神经功能

35. 患儿，1岁。外伤致颅内出血，前区隆起，喷射性呕吐，嗜睡，对光反应迟钝。观察中可提示脑疝发生的表现是

- A. 血压下降
- B. 四肢肌力减退
- C. 由嗜睡转为浅昏迷

- D. 双侧瞳孔\*等大
- E. 自主活动减少或消失

36. 患者女性, 48岁, 患有滴虫性阴道炎, 患者向护士询问内裤的处理方法是

- A. 食醋浸泡
- B. 日光暴晒
- C. 肥皂清洗
- D. 煮沸消毒 5~10分钟
- E. 紫外线消毒

37. 患者男性, 18岁, 因胸痛就医, 病历资料中有助于判断自发性气胸的信息是

- A. 胸痛发作时在与同学踢足球
- B. 胸片显示有气胸线
- C. 听诊患侧呼吸音减弱
- D. 有轻度呼吸困难
- E. 叩诊患侧呈鼓音

38. 患者女性, 47岁, 患有外阴盆。遵医嘱给予 1:5000 的高锰酸钾液坐浴, 病人向护士询问每天做几次, 每次多长时间。下面回答正确的京

- A. 每日 2 次, 每次 5 分钟左右
- B. 每日 2 次, 每次 10 分钟左右
- C. 每日 2 次, 每次 15 分钟左右
- D. 每日 2 次, 每幅) 分钟左右
- E. 每日 2 次?每就 0 分钟左右

39. 脱水患儿经输液 6 小时后, 脱水情况好转, 开始排尿, 但又出现精神萎靡, 心音低钝, 腹胀, 肠鸣音减弱, 这时应首先考虑为

- A. 酸中毒未纠正
- B. y 氏血镁
- c. 低血钾
- D. 低血钙
- E. 中毒性肠麻痹

40. 男, 55岁, 全麻术后未清醒, 出现鼾声, 应考虑

- A. 痰液堵塞
- B. 舌根后坠
- C. 喉痉
- D. 即将醒甦
- E. 熟睡中

41. 患者男, 62岁。高血压 10 年, 夜间睡眠中突然憋醒, 大汗淋漓, 被迫坐起、喘息, 咳粉红色泡沫痰, 双肺闻及广泛哮鸣音, 给予乙醇湿化吸氧。采用乙醇湿化吸氧 的目的是

- A. 湿化气道
- B. 净化气道
- C. 降低通气阻力
- D. 降低肺泡表面张力
- E. 降低肺泡内泡沫的表面张力

42. 患者女, 33岁。干咳伴乏力、低热、夜间盗汗、体重减轻 2 个月余。X 线胸片: 右上肺阴影。疑诊断为月时结核收住入院。应采取的隔离措施是

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 接触隔离
- E. 床边隔离

43. 患者, 男性, 48岁。因肾衰竭入院治疗, 收集其 24 小时尿量为妙 80ml, 该患者目前的尿量属于

- A. 正常'
- B. 少实
- C. 无尿
- D. 多尿
- E. 尿崩

44. 患者, 男性, 60岁, 始债高血压病史 10 年。自诉多次发生短时间肢体麻木或眩晕, 可较快恢复正常, 发作时曾有跌倒现象。对该患者重要的健康教育内容是

- A. 给予低脂、低盐、低胆固醇饮食
- B. 观僂监测血压
- C. 教会患者控制情绪
- D. 指导患者配合, 进行有效安全防护
- E. 戒除烟酒等不良嗜好

45. 某初孕妇, 29岁, 现孕 22 周, 经检查确诊为妊娠合并风湿性心脏病, 心功能 II 级。根据该孕妇情况, 为防止心力衰竭, 妊娠期监测的时间应重点放在

- A. 22—24 周
- B. 25~26 周
- C. 27~28 周
- D. 29~31 周
- E. 32~34 周

46. 通过兴奋 P<sub>2</sub> 肾上腺素受体缓解支气管痉挛的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 麻黄素
- C. 阿托品
- D. 肾上腺素
- E. 沙丁胺醇

47. 患儿, 6岁, 风湿热经治疗痊愈, 医嘱预防应用长效青霉素 120万单位/月, 肌注。该药使用时间最少

- A. 1年
- B. 2年
- C. 5年
- D. 理年
- E. 12年

48. 患者, 男性, 42岁, 因足底被刺伤后出现全身肌肉强直性收缩, 阵发性痉挛, 诊断为破伤风。用于冲洗此病人伤口的溶液为

- A. 3%碘酒
- B. .5%盐水
- X 3%双氧水
- D. 10%硝酸银溶液
- E. 生理盐水

49. 患者, 男性, 60岁, 患有慢性支气管炎、肺气肿 20余年。近日并发上呼吸道感染, 咳嗽、咳痰加重, 体温 38.5°C, 脉搏 80次/分, 呼吸 28次/分。护士判断该患者呼吸发生的改变是

- A. 呼吸困 g
- B. 频率改变
- C. 节律改变
- D. 声调改变
- E. 呼吸类型改变

50. 患者, 男性, 5岁, 按医嘱服用驱虫药后, 需留便标本检查寄生虫, 护士告知患者留取粪便的正确方法是

- A. 留取全部粪便
- B. 取不同部位粪便
- C. 取边缘部位粪便
- D. 取前段粪便少许
- E. 取带血或黏液部分粪便

51. 患者, 男性, 36岁, 因急性阑尾炎穿孔行“阑尾切除术”。术后 5天, 感腹部持续性胀痛, 伴恶心呕吐, 未排便排气。体检: 全腹膨胀, 肠鸣音消失, 未触及腹部肿块,

腹部 X 线片检查见小肠及结肠均有大量充气及气液平面。

对于该病差的处理, 最适宜的是

- A. 立即剖腹探查
- B. 口服积剂全胃肠道透视
- C. 腹腔穿刺, 灌洗
- D. 积剂灌肠
- E. 胃肠减压及支持疗法

52. 患者, 女, 27岁, 已婚未孕育, 来院咨询常用的避孕方法, 你认为最不恰当的是

- A. 应用阴茎套
- B. 应用阴道隔膜
- C. 放置宫内节育器
- D. 口服避孕药
- E. 进行输卵管结扎

53. 患者, 男性, 34岁。严重脑外伤。护士收集资料、评估患者、制订护理计划。该计划中, 优先解决的健康问题是

- A. 皮肤的完整性受损
- B 抑及道阻戶
- C. 睡眠形态改变
- D. 有感染的危险
- E. 营养不良

54. 患者, 女性, 65岁。身体虚弱, 中暑后入院治疗, 『以下措施对患者预后决定作用的是

- A. 脱离高温环境”
- B. 测量体温
- C. 冰袋冷敷
- D. 补充体液
- E. 保持呼吸道通畅

風患者地足月临产, 10A, 宫爆膜未破,

3小时后感肛门坠胀, 流出棕黄色羊水, 查: 宫口开全: 0+4, 其处理不正确的是

- A. 立即吸氧
- B. 左侧卧位, 即听胎心
- C. 静注 5%碳酸氢钠
- D. 胎头吸引术助产
- E. 剖宫产

56. 患者, 女性, 18岁\*与自家宠物密切接触后发现咳嗽、咳痰伴喘息 4小时入院。查体: 体温 36.5°C, 脉搏 90次/

分，肺部听诊可闻及广泛哮鸣音。应考虑患者为

A. 大叶性肺炎

- B. 支气管拭张
- C. 支气管哮喘
- D. 肺结核
- E. 慢性阻塞性肺疾病

57. 患者，女，21岁。急性阑尾炎穿孔致腹膜炎。手术后第5天体温升高达39°C，伴大便次数增多，里急后重，黏液便，伤口不痛，无咳嗽。考虑哪项可能性最大

- A. 肠炎
- B. 菌痢
- C. 切口感染
- D. 阑尾脓肿
- E. 肺炎、肺不张

58. 风湿性心脏病心房颤动病人突然抽搐、偏瘫，首先考虑

- A. 心力衰竭加重
- B. 洋地黄中毒
- C. 低钾血症
- D. 脑栓塞
- E. 蛛网膜下腔出血

59. 患者，男性，52岁。肺源性心脏病入院治疗。患者呼吸困难、发绀，食欲差，口腔溃疡，焦虑。护士应首先为患者采取的护理措施是

- A. 卧床休息，减少探视
- B. 加强沟通，减轻紧张焦虑
- C. 口腔护理
- D. 测量生命体征

60. 患者，男，55岁。休克患者，在抢救过程中出现呼吸窘迫，发绀，吸氧无效，PaO<sub>2</sub>持续降低。诊断是休克为市，护理措施首先应采成匕

- A. 呼气终末正压给氧
- B. 持续吸纯氧
- C. 快速输液
- D. 给血管活性药
- E. 气管切开

61. 患者4女性，52岁。乙肝病史15年，肝硬化病史10年，现处于失代偿期。患者呼吸困难、双下肢水肿，腹部膨隆，蛙状腹，皮肤紧张发亮，叩诊有移动性浊音。患者

- A. 大量腹水

- E. 吸氧，缓解缺氧状态
- B. 肠胀气
- C. 大量脂肪沉积
- D. 腹腔内出血
- E. 腹腔肿瘤

62. 患者，男性，67岁。体重60kg，胃癌术后第5天。患者卧床翻身时身体滑向床尾，护士将其移向床头，下列做法正确的是

- A. 一手托患者颈部，一手托患者膝部
- B. 移动之前应固定床轮，松开盖被
- C. 移动之如在患者头侧一枕头
- D. 移动时患者双手放在胸腹前
- E. 搬运时，禁止患者协助

63. 患者，男性，15岁，1型糖尿病。关于1型糖尿病特点的描述，错误的是

- A. 又称胰岛素依赖型糖尿病
- B. 多见于年轻人
- C. 易发生酮症酸中毒
- D. 胰岛素绝对缺乏
- E. 病情较稳定

64. 患者，男性，32岁。肛瘘切除术后医嘱高锰酸钾坐浴。护士指导患者坐浴方法错误的是

- A. 高锰酸钾全部溶化后方可坐浴
- B. 高锰酸钾溶液浓度为1:5000
- C. 水温30~32°C
- D. 每日2~3次
- E. 沸水晾凉后再放入高锰酸钾

66. 患者，女，24岁，肛瘘切除术后，护士的健康教育不正确的是

- A. 多饮水
- B. 保持大便通畅
- C. 努力尽早排便
- D. 保持肛门清洁
- E. 适当加强体育锻炼

67. 患者女，6岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿，大水疱。未伤及范围包括头、面部、颈部，以及前胸、腹部约8个手掌大的皮肤。估计其烧伤面积为

- A. 63%
- B. 67%
- C. 73%
- D. 77%
- E. 83%


68. 一位护士在与一位患者交谈的过程中，当患者谈到住院以来的高额费用时异常激动、不满。为了缓解患者的情绪，护士此时可采用的交谈技巧是

- A. 倾听
- B. 核实
- C. 提问
- D. 阐释
- E. 沉默

69. 患者男性，48岁。入院行经腹腔镜胆囊切除术，术前一天护士发现以下哪种情况需及时告知医生考虑更改手术时间

- A. 血压 110/70mmHg
- B. 体温 38.9°C
- C. 呼吸 20次/分
- D. 脉搏 70次/分
- E. 白细胞 6.0X10<sup>7</sup>L

70. 下列骨折的哪种并发症可致下图所示畸形



- A. 脂肪栓塞
- B. 写笋膜室综合征
- C. 缺血性骨坏死
- D. 关节僵硬
- E. 缺血性肌挛缩

71. 女性，30岁。自然分娩一女婴，产后2日护士发现会阴侧切伤口红肿，局部湿热敷宜选择溶液是

- A. 75%乙醇
- B. 5%碘伏
- C. 2%碘酊
- D. 50%硫酸镁
- E. 1:5000高锰酸钾

72. 患者，女性，17岁。高处跌下引起左肱骨骨折及右股骨开放性骨折，伤口正大量出血。现场急救处理应首选

- A. 抗休克
- B. 清创缝合
- C. 骨折复位
- D. 加压包扎止血
- E. 骨折临时固定

73. 女性，37岁，出租车司机每天工作10小时，今日以尿频、尿急、尿痛1天，诊断肾盂肾炎收入院，护士向其进行健康宣教时，应说明最可能感染的途径是

- A. 上行感染
- B. 下穿感染
- C. 血液感染
- D. 直接感染
- E. 淋巴系统感染

74. 患者，男性，25岁。左腰部被撞伤半小时，因左腰痛、尿色红来院就诊。查血压 110/70mmHg, 心率 80次/分，呼吸平稳，左腰部稍肿伴明显压痛，腹软无压痛。... 诊断肾损伤，需重点强调的护理内容是

- A. 维持体液平衡
- B. 鼓励患者多饮水
- C. 绝对卧床休息
- D. 镇静止痛
- E. 做好术前准备

75. 患者，女性，47岁，用煤炉做饭后，感觉剧烈头痛、头晕、乏力伴恶心、呕吐，想卧床休息。家属发现患者躺卧地上，呼之不醒，立即到急诊。查体：生命体征正常，浅昏迷状态，双侧瞳孔等大，对光反射存在，口唇度肤黏膜呈樱桃红色，双肺未闻及湿啰音，应诊断为

- A. 二氧化碳中毒
- B. 一氧化碳中毒
- C. 硫化氢中毒
- D. 苯酚中毒

76. 患者女，26岁，妊娠7个月。孕期检查发现：尿糖(+++)，空腹血糖7.8mmol/L，餐后2小时血糖

16.7mmol/L，诊断为妊娠期糖尿病。该患者最适宜的治疗是

- A. 单纯饮食控制治疗
- B. 运动治疗
- C. 综合生活方式干预治疗，
- D. 口服降糖药治疗
- E. 胰岛素注射治疗

77. 患者女性，29岁。急性化脓性阑尾炎手术治疗后，护士对患者进行术后指导，告知患者术后最常见的并发症是

- A. 出血
- B. 切口感染
- C. 粪瘘
- D. 肺部感染
- E. 粘连性肠梗阻

78. 患者，女性，19岁，失恋后突然表现为儿童样的幼稚语言、表情和动作，以幼儿自居。确诊为童样痴呆，

- 护理该患者时措施不妥的是
- A. 倾听患者的诉说和感
- B. 将患者当做儿童来对待
- C. 教给家属暗示治疗的技巧
- D. 引导患者调整心态
- E. 避免给患者施加压力

79. 患儿，4个月。发热、咳嗽2天，以为支气管肺炎收入院。入院2小时，患儿烦躁不安，呼吸困难，发绀；查体：呼吸60次/分，脉搏190次/分；心音低钝；奔马律，双肺细湿啰音密集，肝肋下3cm。患儿可能并发

- A. 脓胸
- B. 感染性心内膜炎

- C. 肺不张
- D. 心包积液
- E. 心力衰竭

80. 患者，女性，32岁。口服避孕药进行避孕已2年，因工作忙当晚漏服，护士告知补服时间为性生活后

- A. 即时
- B. 6W
- C. 9小时
- D. 12小时内
- E. 24小时内

81. 患者，女，58岁，严警翁能不全时，患者可能出现的最严重的呼吸困 § 是

- A. 心源性哮喘
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 劳力性呼吸困难
- ?. 急性肺水肿
- E. 静息时间呼吸困难

82. 囉者，男性，65岁。因结肠癌入院，行 M<sup>es</sup> 手术，以十关于术后结肠造口护理不正确的是

- A. 清洗造口周围皮肤，涂氧化锌软膏
- B. 用塑料薄膜将腹部切口和造瘘口隔开，防止污染腹部切口
- C. 排便后造口以凡士林纱布覆盖外翻的肠黏膜
- D. 人工肛门袋应坚持长期使用
- E. 3~4个肛门袋轮流使用

83. 患者，女性，58岁，胰腺癌术后第1天，表情痛苦，心率加快，血压升高，多次询问后患者诉伤口疼痛严重。此时首先应给予的护理措施是

- A. 立即给予止痛药
- 止痛指导
- C. 鼓励患者忍受疼痛
- D. 分散患者注意力
- E. 继续观察

84. 患者女，34岁，车祸后送来医院，查体：现刺痛后]睁眼，回答问题正确，能遵命令动作，其格拉斯哥議；评分是

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

E. 13

85. 患儿,男,胎龄35周,生后3天,臀位产,用高位产钳,Apgar评分4分,复苏后出现嗜睡,并时有惊厥,囟区隆起。该患儿最有可能的是

切'新生儿化脓性脑膜舞

- B. 新生儿颅内出血
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿破伤风
- E. 新生儿低血糖

86. 患者,男,45岁。因上消化道大出血被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应

- A. 记录病人入院时间和病情变化
- B. 向家属了解病史,耐心解释
- C. 通知住院处,办理入院手续
- D. 测生命体征,建立静脉通路
- E. 注射止血药物,抽血查配血

患者,女性,23岁,孕18周,同时伴有“淋病”就诊。门诊护士向其详细介绍淋病对妊娠、分娩、胎儿及新生儿的影响后,要求其复述部分内容,下列哪项孕妇的复述说明护士仍需要再次对其进行解释

- A. “我可能会因为淋病而早产”
- B. “淋病会导致新生儿肺炎”
- C. “我不想让我丈夫知道这事”
- D. “我会因此发生盆腔感染”
- E. “我的宝宝可能会出现宫内发育迟缓的情况”

88. 患者,男性,56岁。糖尿病,昏迷1小时入院,查血糖33.2mmol/L,尿素氮20mmol/L,血肌肝90mmol/L,血钠153mmol/L,血钾4.1mmol/L,CO<sub>2</sub>CP15mmol/L,尿酮体(++)。考虑患者最可能的诊断是、

- A. 尿毒症
- B. 高钠血症昏迷
- C. 乳酸性酸中毒
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 高钾[生非酮症糖尿病昏迷

89. 患者,男性,66岁。诊断心绞痛入院,舌下含服硝酸甘油0.5mg后眼前发黑、恶心,护士首先应

- A. 搀扶坐于:
- B. 活动四肢
- C. 立即平卧

D. 吸氧

E. 加服硝酸甘油0.5mg

90. 患者,女性,26岁,患肝硬化伴食管静脉曲张破裂出血。入院第2天,行三腔双囊管压迫止血,护士需要给患者进行护理评估,但应除外

- A. 意识状态
- B. 患者兴趣
- C. 身各管道通畅情况
- D. 三腔双囊管牵引效果
- E. 出血是否停止或减少

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的A、C、D、E五个备选答前选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(91-92题共用题干)

患儿3男,4岁。因肾病综合征入院金表现有水肿、蛋白尿,目前无感染迹象。

91. 患儿入院后,护士为他制订护理计划,下列不妥的是

- A. 每日测量体重
- B. 绝对卧床休息
- C. 详细记出入量
- D. 不限制液体摄入.
- E. 蛋白摄入量为每天2g/kg

92. 为了帮助患儿减轻眼睑水肿,护士最好采取下列哪种方法

- A. 抬高患儿床头
- B. 缩短患儿看电视的时间
- C. 用生理盐水冲洗患儿眼睛
- D. 冷敷患儿双眼,每日数次
- E. 建议jfh多卧床休息

(93~94题共用题干)

患儿,7个月。因惊厥持续5分钟来院就诊。患儿一直以羊奶喂养,未加辅食,2周末易哭闹,睡眠不稳,无发热、咳嗽,大小便正常。查体:体温37.6°C,面颤动,口周发绀,四肢抽动,神志不清、前区平软,2cm X2cm,枕部有乒乓球点。

93. 护士应立即采取的急救措施是

A. 服用解痉药物

- B. 保持病室安静, 避免光、声刺激
- C. 补充钙剂
- D. 给予维生素 D 和钙剂
- E. 控制惊厥与喉痉挛, 给予钙剂

94. 护士根据患儿的情况考虑该小儿惊厥的原因首先是

- A. 脑脓肿
- B. 低血糖
- C. 缺血缺氧性脑病
- D. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- E. 高热惊厥

(95~97 题共用题干)

患者, 女性, 60 岁。3 小时前胸骨后压榨样疼痛发作, 伴呕吐、冷汗及濒死感而入院。护理体检: 神志合作, 心率 112 次/分, 律齐, 交替脉, 心电图检查显示有急性广泛性前壁心肌梗死。

95. 此患者存在的最主要护理问题是

- A. 活动无耐力
- B. 心输出量减少
- C. 体液量过多
- D. 潜在心律失常
- E. 潜在感染

96. 对此患者第 1 周的护理措施正确的有

- A. 高热量、高蛋白饮食
- B. 协助病人翻身、进食
- C. 协助病人如厕
- D. 低流量持续吸氧
- E. 指导病人床上活动

97. 在监护过程中护士发现患者烦躁不安, 面色苍白, 皮肤湿冷。脉细速, 尿量减少, 应警惕发生

- A. 严重心律失常
- B. 急性左心衰竭
- C. 心源性休克
- D. 继发感染
- E. 紧张, 恐惧

(98~99 题共用题干)

初产妇, 28 岁。产下一男婴, 产后 10 天, 恢复良好。

98. 判断其宫底的高度应在

- A. 平脐
- B. 脐下两横指
- C. 脐耻连线中点
- D. 耻骨联合上 1 横指
- E. 耻骨联合下

99. 护士观察其恶露, 正常颜色应该是

- A. 鲜红色
- B. 淡红色
- C. 白色
- D. 巧克力色
- E. 黄色

(100~102 题共用题干)

男, 40 岁。2 小时前左上腹被汽车门撞伤, 即出现腹部剧痛、头晕、心慌、呕吐, 查体: 面色苍白、出冷汗, P120 次/分, BP80/50mmHg, 腹稍胀, 腹式呼吸减弱, 腹膜刺激征(+), 以左上腹为主, 移动性浊音(+), 肠鸣音消失, 肝浊音界存在。

100. 该患者诊断为闭合性腹部损伤考虑最可能损伤的脏器为

- A. 胃
- B. 脾脏
- C. 胰腺
- D. 膀胱
- E. 肝脏

101. 对协助诊断有意义的检查除外

- A. B 超
- B. CT
- C. 血常规
- D. 腹腔穿刺
- E. 肝功能测定

102. 该患者手术治疗的准备不包括

- A. 术前常规禁饮食
- B. 药物皮肤过敏试验
- C. 术前通便灌肠
- D. 配血、备皮
- E. 常规实验室检查

(103~105 题共用题干)

患者，男，35岁。5年前因胃溃疡行胃切除术，近半年来经常头晕、心悸，体力逐渐下降，诊断为缺铁性贫血。

103. 其贫血的原因最可能是

- A. 铁摄入不足
- B. 铁需要量增加
- C. 铁吸收不良
- D. 铁消耗过多
- 铁不能利用

104. 其外周血红细胞形态主要为

- A. 巨红细胞
- B. 正常红细胞正常色素
- C. 小髻 g 胞低色素
- D. 点彩红细胞
- E. 球襻细徐

105. 指导其服用铁剂错误的是

- A. 进餐时或进餐后服用
- B. 液体铁需用吸管服用
- C. 禁饮茶
- D. 可同服维生素 C
- E. 血红蛋白恢复正常后即停药

(106~107 题共用题干)

患者，女性，23 岁，小腿紫癜 1 周余。2 周前因受凉出现上呼吸道感染，自服感冒冲剂后出现腹痛、腹泻及便血。次日双侧膝关节以下出现散在性紫癜。血小板  $150 \times 10^9/L$ ，尿势 0，红细胞  $10 \sim 20 \text{ A1}^{\wedge} \text{HP}$ ，白细胞  $5 \sim 10$  今涉 HP，颗粒管型  $1 \sim 2$  个/HP。

106. 患者有可能发生的情况是

- A. 细菌性痢疾
- B. 泌尿系统结石
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 过敏性紫癜
- E. 药物疹

107. 护士对患者进行健康教育，其内容应除外

- A. 帮助患者寻找致病因素
- B. 急性期卧床休息
- C. 避免接触致敏原
- D. 让患者学会自我观察
- E. 补充优质蛋白，如鱼、虾、蟹等

(108-110 题共用题干)

患者女性，26 岁。职业为酒吧待应生，患者因发热、乏力、食欲减退伴体重下降 2 & 就诊。体检：体温  $38^{\circ} \text{C}$ ，颈部、

腋下、腹股沟浅表淋巴结肿大。查血：白细胞  $3.0 \times 10^9/L$ ， $\text{CD}_4/\text{CD}_8$  0.9，

108. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性淋巴结炎
- B. 艾滋病
- C. 伤寒
- D. 恶性淋巴瘤
- E. SARS

109. 该患者首要的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 活动无耐力
- C. 知识缺乏
- D. 营养失调：低于机体需要量
- E. 有传播感染有危险

110. 该患者主要的传播方式是

- A. 血液传播
- B. 性交传播
- C. 母婴传播
- D. 共用针具传播
- E. 消化道传播

(111-112 题共用题干)

新生儿，胎龄 40 周，顺产。出生体重 3800g，身长 53cm，胎毛少，哭声响亮，皮肤红润，头发分条清楚，耳壳碗骨发育好。护士对新生的妈妈进行母乳喂养的健康指导。

111. 喂奶后婴儿应采取的卧位是

- A. 右侧卧位
- B. 左侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 俯卧位
- E. 半曲位

112. 护士告诉新妈妈喂母乳后应竖起抱婴儿，轻轻拍其背部，并解释其目的是

- A. 促进消化吸收表
- B. 预防感染
- C. 增进母子感情
- D. 防止溢乳
- E. 智力开发

(113~115 题共用题干)

患者，男，40 岁。于饱餐、饮酒后突然发生中上腹持久剧烈疼痛，伴有反复恶心，呕吐出胆汁。护理体检：上腹部压痛，腹壁轻度紧张。测血清淀粉酶明显增高。

X 朽亥患者的首选处理措施是

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 适当补钾、补钙
- C. 外科手术准备
- D. 屈膝侧卧位
- E. 应用抗生素

114. 【假设信息】若患者为单纯水肿型胰腺炎，则不应有的表现是

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 休克
- D. 呕吐
- E. 发热

115. 患者确诊为急性胰腺炎，该病最常见的病因为

- A. 大量饮酒和暴饮暴食
- B. 手术创伤
- C. 胆道疾病
- D. 并窗流行性腮腺炎
- E. 高钙血症

(116-120 题共用题干)

护理部质控组运用 PDCA 的管理办法，定期到临床检查 要素质量、环节质量和终末质量，针对质量问题制订出 具体实施计划，经过实施，反馈预定目标执行情况，将 存在问题转入下一个管理循蹟中。

116. 护理质量控制的作用是

- A. 监督指导
- B. 循环管理
- C. 持续改进
- D. 目标管理
- E. 检查落实

117. 护理质量控制的依据是

- A. 统计数轟
- B. 质量标准
- C. 个人观察
- D. 问卷调查

E. 书面报告

118. 护理质量控制以预防为主，鼓励上报分析的是

- A. . 工作漏洞
- B. 护患纠纷.
- c. 护理事欺:
- D. 不良事奪
- E. 护遍詠陷

119. 从患者得到的护理效果评价是

- A. 环境质量
- B. 观察病情
- C. 患者管理
- D, 心理护理
- E. 出院满意度

120. 环节质量控制的项目是

- A. 护理文件书写
- B. 住院满意度
- C. 药品质量
- D. 规章制度
- E. 出院满意度