

# 2021 中西医执业医师考试



扫码关注获取更多免费  
资料及医考资讯

2021 年  
中西医医师资格  
考试专用

## 第一单元

## A1 型选择题 (1~90 题)

答题说明: 每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1. 下列表述中不属于症的是

- A. 胸闷
- B. 恶寒
- C. 口苦
- D. 发热
- E. 消渴

2. 人体是一个有机整体, 其中心是

- A. 心
- B. 脑
- C. 经络
- D. 脏腑
- E. 五脏

3. 两汉时期“元气一元论”认为, 构成宇宙万物最基本、最原始的物质是

- A. 元气
- B. 精气
- C. 谷气
- D. 云气
- E. 精

4. 关于阴和阳的概念描述中, 最确切的是

- A. 阴和阳是中国古代的两点论
- B. 阴和阳即是矛盾
- C. 阴和阳代表对立的事物
- D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物 属性
- E. 阴和阳说明相互关联着的事件

5. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”, 主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约
- B. 互根互用

C. 互为消长

D. 平衡协调

E. 互相转化

6. 下列哪种治法体现了五行相克规律

- A. 金水相生
- B. 益火补土
- C. 抑木扶土
- D. 滋水涵木
- E. 培土生金

7. 属于“相侮”的脏病传变是

- A. 肝病及脾
- B. 肝病及肾
- C. 肝病及肺
- D. 肝病及心
- E. 脾病及心

8. 具有“主肃降”生理特性的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

9. “浊气归心, 淫精于脉”中的“浊气”主要靠哪一个脏腑的运化

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 大肠

10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是

- A. 肾精

- B. 肾气  
C. 肾阴  
D. 肾阳  
E. 肾血
11. 与维持正常呼吸关系最密切的两脏是  
A. 心与脾  
B. 脾与肾  
C. 肾与肝  
D. 肝与肺  
E. 肺与肾
12. “中精之腑”指  
A. 胆  
B. 胃  
C. 大肠  
D. 小肠  
E. 三焦
13. 具有“喜润恶燥”生理特性的是  
A. 胆  
B. 胃  
C. 小肠  
D. 大肠  
E. 膀胱
14. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生殖泄”  
A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
15. 脑主司感觉运动，有赖于  
A. 脑髓充养  
B. 营血充养  
C. 肾精充养  
D. 肝血充养  
E. 脾精充养
16. “太冲脉衰少，天癸竭，地道不通”指的时  
间是  
A. 女子二七  
B. 女子七七  
C. 女子四七  
D. 女子五七  
E. 女子六七
17. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是  
A. 精  
B. 气  
C. 血  
D. 津  
E. 液
18. 中医诊断的基本原则是  
A. 整体审察，四诊合参，病证结合  
B. 辨证求因，审因论治，脉症合参  
C. 证候真假，证候错杂，诊法合参  
D. 证候转化，病证结合，辨证求因  
E. 司外揣内，见微知著，以常衡变
19. 热极的患者其唇的色泽可表现为  
A. 唇色深红  
B. 唇色青紫  
C. 口唇青黑  
D. 口唇赤肿而干  
E. 口唇呈樱桃红色者
20. 斑与疹的主要区别是  
A. 是否色红成片  
B. 是否时现时隐  
C. 是否抚之碍手  
D. 是否压之褪色  
E. 是否伴有身热
21. 下列哪项不是得神的表现  
A. 目光精彩  
B. 神志清楚  
C. 额赤如妆  
D. 面色荣润  
E. 呼吸调匀
22. 鼻流浊涕者，多属  
A. 外感风热

- B. 胆经湿热
- C. 阳气虚弱
- D. 外感风寒
- E. 阴虚肺燥

23. 眼窝凹陷多属

- A. 肺胀
- B. 吐泻伤津
- C. 肝胆火炽
- D. 脾胃虚衰

- E.肾阴不足
- 24.舌苔薄白而干者多见于
- A.湿浊中阻  
B.食积内停  
C.脾肾阳虚  
D.外感风热  
E.燥热伤津
- 25.外感秽浊与热毒之邪相合的舌象是
- A.白腻苔  
B.黄腻苔  
C.积粉苔  
D.灰黑苔  
E.腐苔
- 26.舌中部点刺者多为
- A.肝胆火盛  
B.心火亢盛  
C.肺热壅盛  
D.胃肠热盛  
E.大肠湿热
- 27.舌苔脱落处舌面不光滑，仍有新生苔质颗粒者称
- A.花剥苔  
B.地图舌  
C.镜面舌  
D.光滑舌  
E.类剥苔
- 28.导致出现咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的病因是
- A.风邪与痰热搏结  
B.久病肺气虚损  
C.燥邪犯肺  
D.寒痰湿浊停肺  
E.阴虚疫毒攻喉
- 29.病室中有尸臭气多为
- A.患者失血  
B.瘟疫发作  
C.脏腑衰败  
D.肾衰
- 30.病人口气酸臭，脘腹胀满者属
- A.肝胃蕴热  
B.胃肠蕴热  
C.食积胃肠  
D.内有脓疡  
E.口腔不洁
- 31.常见饭后嗜睡，其原因多为
- A.脾气虚弱  
B.湿邪困脾  
C.心肾阳虚  
D.邪闭心神  
E.以上都不是
- 32.大便澹结不调多见于
- A.脾虚  
B.肾虚  
C.脾肾阳虚  
D.肝郁脾虚  
E.食滞胃肠
- 33.下列关于头痛不同性质的内容叙述错误的是
- A.头痛连项，遇风加重者属风寒头痛  
B.头痛怕热，面红目赤者属风热头痛  
C.头痛如裹，肢体困重者属风湿头痛  
D.头痛绵绵，过劳则盛者属肾虚头痛  
E.头痛眩晕，面色苍白者属血虚头痛
- 34.胁痛与下列哪项无关
- A.饮停胸胁  
B.肝郁气滞  
C.肝胆火盛  
D.寒滞肝脉  
E.肝胆湿热
- 35.气滞血瘀的痛证可见哪种脉象
- A.革脉  
B.紧脉  
C.滑脉  
D.实脉  
E.涩脉
- 36.腹部肿块，推之不移，痛有定处者为

**E.消渴病重**

**A.虫积**

- B. 气鼓  
C. 水鼓  
D. 积  
E. 聚
37. 下列症状哪项不是实证的临床表现  
A. 五心烦热  
B. 大便秘结  
C. 小便不通  
D. 痰涎壅盛  
E. 腹痛拒按
38. 黄芩与茯苓配伍, 茯苓能增强黄芩的补气 利水作用, 这种配伍关系是  
A. 相须  
B. 相使  
C. 相反  
D. 相恶  
E. 相畏
39. 既能发汗解表, 又能利水消肿的药物是  
A. 麻黄、荆芥  
B. 香薷、紫苏  
C. 麻黄、香薷  
D. 紫苏、生姜  
E. 荆芥、防风
40. 治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是  
A. 菊花、木贼  
B. 薄荷、柴胡  
C. 桑叶、菊花  
D. 桑叶、牛蒡子  
E. 蝉蜕、乌贼
41. 治疗怀胎蕴热、胎动不安者, 当选用的药物是  
A. 桑寄生  
B. 黄芩  
C. 紫苏  
D. 续断  
E. 砂仁
42. 以下哪项是芦根和淡竹叶共有的功效  
A. 止呕  
B. 利尿  
C. 止咳  
D. 凉血  
E. 以上都不是
43. 鱼腥草的功效是  
A. 清热解毒, 凉血止痢  
B. 清热解毒, 止痢截疟  
C. 清热解毒, 息风止痉, 清肝明目  
D. 清热解毒, 消痈排脓, 利尿通淋  
E. 清热解毒, 消痈排脓, 祛瘀止痛
44. 既能清热解毒, 又能疏散风热的药对是  
A. 桑叶、菊花  
B. 薄荷、牛蒡子  
C. 牛黄、水牛角  
D. 金银花、连翘  
E. 蒲公英、紫花地丁
45. 下列关于巴豆的用法及用量叙述正确的是  
A. 入丸散, 每次 0.1~0.3g  
B. 入丸散, 每次 0.2~0.5g  
C. 入汤剂, 每次 0.3~0.5g  
D. 入汤剂, 每次 0.1~0.5g  
E. 入汤剂, 每次 0.5~1.5g
46. 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物  
A. 桑枝  
B. 防己  
C. 威灵仙  
D. 苘菡仁  
E. 络石藤
47. 防己的功效是  
A. 祛风湿, 舒经络, 解表  
B. 祛风湿, 消骨鲈, 解暑  
C. 祛风湿, 止痛, 化湿和胃  
D. 祛风湿, 止痛, 安胎  
E. 祛风湿, 止痛, 利水消肿
48. 可用于养血安胎的药物是  
A. 狗脊  
B. 砂仁

- C. 乌梢蛇  
D. 五加皮  
E. 桑寄生
49. 既能化湿行气，又能止泻及安胎的药物是
- A. 藿香  
B. 佩兰  
C. 砂仁  
D. 白豆蔻  
E. 草果
50. 既能化湿，又能解暑的药物是
- A. 藿香、佩兰  
B. 苍术、厚朴  
C. 砂仁、豆蔻  
D. 陈皮、青皮  
E. 茯苓、玉竹
51. 既能利水消肿，渗湿健脾，除痹，又能清热排脓的药物是
- A. 薏苡仁  
B. 车前子  
C. 木通  
D. 茯苓  
E. 滑石
52. 具有清肺止咳功效的利水渗湿药物是
- A. 海金沙  
B. 石韦  
C. 通草  
D. 篇蓄  
E. 车前子
53. 既能温中止痛，又能杀虫，可用于蛔虫腹痛、呕吐或吐蛔的药物是
- A. 干姜  
B. 吴茱萸  
C. 砂仁  
D. 小茴香  
E. 花椒
54. 沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于
- A. 温肺化饮  
B. 燥湿化痰  
C. 温肾纳气  
D. 益气健脾  
E. 补益肺肾
55. 既能消食健胃，又能涩精止遗，还可治疗小儿脾虚疳积的药物是
- A. 银柴胡  
B. 麦芽  
C. 乌梅  
D. 莱菔子  
E. 鸡内金
56. 川楝子、槟榔皆具有的功效是
- A. 杀虫行气  
B. 杀虫利水  
C. 行气利水  
D. 行气疏肝  
E. 行气健脾
57. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是
- A. 大蓟  
B. 小蓟  
C. 白茅根  
D. 地榆  
E. 槐花
58. 既能收敛止血，止痢，又能截疟，补虚的药物是
- A. 苦楝皮  
B. 沙苑子  
C. 侧柏叶  
D. 仙鹤草  
E. 三七
59. 具有镇静安神，平肝潜阳，收敛固涩功效的



- 药物是
- A. 菊花
  - B. 夏枯草
  - C. 龙骨
  - D. 朱砂
  - E. 石决明
60. 下列除哪项外, 均具有明目功效
- A. 菟丝子
  - B. 金樱子
  - C. 沙苑子
  - D. 枸杞子
  - E. 女贞子
61. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为
- A. 散发
  - B. 暴发
  - C. 流行
  - D. 流行性
  - E. 大流行
62. 下述哪项不是艾滋病的传播途径
- A. 性接触
  - B. 注射及输血和血制品
  - C. 母婴传播
  - D. 器官移植
  - E. 消化道
63. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
- A. 休息
  - B. 保肝
  - C. 降酶
  - D. 抗病毒
  - E. 调节免疫
64. 流行性出血热的“三痛”是
- A. 头痛、全身痛和腰痛
  - B. 头痛、关节痛和腰痛
  - C. 头痛、腓肠肌痛和腰痛
  - D. 头痛、眼眶痛和腰痛
  - E. 头痛、腹痛和腰痛
65. 狂犬病的传播途径不包括
- A. 眼结膜
  - B. 肛门粘膜
  - C. 胃肠粘膜
  - D. 角膜移植
  - E. 呼吸道
66. 霍乱的典型临床表现是
- A. 先泻后吐
  - B. 先吐后泻
  - C. 只泻不吐
  - D. 腹泻伴腹痛
  - E. 吐泻同时发生
67. 普通型流脑败血症期重要的体征是
- A. 高热
  - B. 剧烈头痛
  - C. 全身中毒症状
  - D. 皮肤黏膜瘀斑
  - E. 脑膜刺激征
68. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期
- A. 潜伏期
  - B. 初期
  - C. 极期
  - D. 缓解期
  - E. 恢复期
69. 下列哪项不是急性菌痢的典型表现
- A. 里急后重
  - B. 发热
  - C. 呕吐
  - D. 腹痛
  - E. 黏液便
70. 血浆药物浓度下降一半所需的时间指的是
- A. 生物利用度
  - B. 血浆半衰期
  - C. 稳态血浓度
  - D. 治疗指数
  - E. 坪值

71. 高血压危象应选用药物

- A. ACEI 类
- B. 硝普钠
- C.  $\beta$ 受体阻滞药
- D. 卡托普利
- E. 利血平

72. 下列不属于药物不良反应的是

- A. 副作用
- B. 变态反应
- C. 毒性反应
- D. 后遗效应
- E. 拮抗作用

73. 大多数弱酸性药和弱碱性药物一样,口服后大部分在小肠吸收,这主要是因为

- A. 都呈最大解离
- B. 吸收面积最大
- C. 小肠血流较其他部位丰富
- D. 都呈最小解离
- E. 存在转运大多数药物的载体

74. 不同给药途径吸收快慢次序是

- A. 舌下)静脉注射)肌内注射)皮下注射)口服)直肠)皮肤
- B. 吸入)舌下)肌内注射)皮下注射)口服)直肠)皮肤
- C. 静脉滴注)肌内注射)皮下注射>舌下)口服>直肠)皮肤
- D. 皮肤)直肠)口服)皮下注射)肌内注射)舌下)吸入
- E. 吸入)舌下)静脉滴注)皮下注射)口服)直肠)皮肤

75. 对药物作用的选择性,认识不正确的是

- A. 选择性低的药物,使用针对性低
- B. 选择性高的药物,使用针对性高
- C. 较小剂量时选择性高,剂量增大,选择性降低
- D. 选择性高的药物药理活性较强,与剂量大小无关
- E. 选择性低的药物,不良反应较多,但作用

范围广

76. 外周血管痉挛性疾病宜选用下列哪种药物

- A. 普蒙洛尔
- B. 肾上腺素
- C. 多巴胺
- D. 酚妥拉明
- E. 美托洛尔

77. 毛果芸香碱不具有的药理作用是

- A. 胃肠道平滑肌收缩
- B. 腺体分泌增加
- C. 心率减慢
- D. 骨骼肌收缩
- E. 眼内压减低

78. 支配虹膜环形肌的是

- A. N受体
- B. M受体
- C.  $\alpha$ 受体
- D.  $\beta$ 受体
- E.多巴胺受体

79. 氯解磷定的作用,不正确的是

- A. 使肌束颤动消失或明显减轻
- B. 对中枢中毒症状疗效最明显
- C. 不直接对抗体内积聚的ACh,需与阿托品合用
- D. 对中毒过久“老化”的磷酸化胆碱酯酶解毒效果差
- E. 能与体内游离的有机磷酸酯类直接结合

80. 关于氯解磷定的叙述,正确的是

- A. 可迅速制止肌束颤动
- B. 对乐果中毒疗效好
- C. 属可逆性抗胆碱酯酶药
- D. 不良反应较碘解磷定大
- E. 对内吸磷中毒无效

81. 眼科检查、验光常选用

- A. 东莨菪碱
- B. 新斯的明
- C. 双复磷

- D. 后马托品
- E. 毛果芸香碱
82. 654-2 临床可用于
- A. 支气管哮喘
- B. 内脏平滑肌绞痛
- C. 心肌梗死
- D. 晕动病和呕吐
- E. 胃肠道出血
83. 临床何种病人禁用阿托品
- A. 肠绞痛
- B. 青光眼
- C. 流涎症
- D. 胆绞痛
- E. 有机磷农药中毒
84. 苯巴比妥治疗癫痫大发作, 疗效不佳, 后改用苯妥英钠, 结果反而病情加重, 可能的原因是
- A. 苯妥英钠剂量太小
- B. 苯妥英钠对大发作无效
- C. 苯妥英钠剂量过大而中毒
- D. 苯妥英钠诱导了肝药酶, 加速自身代谢
- E. 苯妥英钠的血药浓度尚未达到有效血药浓度
85. 对医学道德的认识不正确的是
- A. 医务人员容易理解、接受
- B. 人道主义精神的集中体现
- C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
- D. 在内容上具有稳定性、连续性
- E. 在形式上比较具体、生动
86. 医务人员对患者诚信、宽厚, 潜心医学事业, 对医学科学忠诚, 体现了
- A. 仁爱
- B. 仁
- C. 诚挚
- D. 公正
- E. 奉献
87. 医学人道主义的含义包括
- A. 认为人的生命是宝贵的
- B. 人的生命和尊严具有最高的价值
- C. 医学人道主义要求医务人员同情、关心、尊重和爱护患者
- D. 是人道主义思想在医学领域中的具体体现
- E. 以上皆是
88. 患者的基本权利不包括
- A. 基本医疗权
- B. 疾病认知权
- C. 知情同意权
- D. 自主决定权
- E. 社会免责权
89. 人体实验类型中, 无需承担道德代价的是
- A. 天然实验
- B. 自愿实验
- C. 欺骗实验
- D. 强迫实验
- E. 自我实验
90. 认为心理、社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系的医学模式是
- A. 神灵主义医学模式
- B. 自然哲学医学模式
- C. 机械论医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

## 二、A2 型选择题 (91~98 题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

91. 患者女性, 慢性乙型肝炎 12 年, 血化验: HBSAg (+)、HBeAg (+)、抗-HBcIgG (+)。育有一女, 13 岁, 体检时查: 血清抗-HBs (+), 追问病史, 无任何临床症状, 未注射乙肝疫苗。其女儿属于下列哪种感染
- A. 潜伏性感染

- B. 显性感染  
C. 病毒携带状态  
D. 隐性感染  
E. 垂直感染
92. 男性, 20岁, 无任何不良反应, 体检时, 发现血清 **HBsAg** 阳性, 转氨酶等其他肝功能检查均正常
- A. 既往感染过  
B. 显性感染  
C. 潜在性感染  
D. 病原体携带  
E. 重复感染
93. 5岁男孩, 高热一天, 腹泻 6~7次, 为黏液性脓血便, 腹痛伴里急后重, 反复惊厥, 逐渐出现昏睡、神志不清, 病前吃过未洗的黄瓜, 诊断为细菌性痢疾。其临床类型属于
- A. 普通型  
B. 轻型  
C. 重型  
D. 中毒型  
E. 慢性型
94. 患者男性, 44岁, 3个月前发热、腹痛、腹泻, 服药 1天好转, 此后腹泻反复发作, 多于劳累及进食生冷食物后, 大便 5~6次/日, 稀便有黏液, 有腹痛、里急后重。体检: 左下腹压痛。大便镜检 **WBC 20-30/HP, RBC 5-10/HP**, 发现有结肠阿米巴滋养体, 最可能的诊断是
- A. 阿米巴痢疾  
B. 慢性菌痢  
C. 肠结核  
D. 慢性血吸虫病  
E. 急性菌痢
95. 患者女性, 32岁, 农民。7月在水利工地上突起发热, **T39.5Y**, 伴头痛, 腰痛, 眼眶痛。起病 5天后就诊时体温已下降, 血压 **92/63mmHg**, 球结膜水肿, 出血, 胸背部见条索点状瘀点。就诊前一日 24小时尿量 **320ml**, 对该患者治疗原则不包括
- A. 早发现  
B. 早诊断  
C. 早治疗  
D. 加强锻炼  
E. 少搬动
96. 患者女性, 26岁, 持续发热 10天, 开始为 38龙左右, 5天后持续高热 39~40龙, 伴腹胀和轻度腹泻。体检: 体温 **40Y**, 呼吸 26次/分, 脉搏 86次/分, 精神淡漠。两肺无异常。心率 86次/分, 律齐, 第一心音偏低。腹胀、无压痛, 肝右肋下 **2cm**, 软, 脾左肋下 **1cm**。血白细胞  $3.0 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 **75%**, 嗜酸粒细胞 **0%**, 单核 **5%**, 淋巴 **20%**。首先考虑的诊断是
- A. 伤寒  
B. 菌痢  
C. 风湿热  
D. 结缔组织病  
E. 结核病
97. 一伤寒患者经治疗后体温渐降, 但未降至正常, 此后体温再次升高, 血培养 (+), 属于下列哪种情况
- A. 再燃  
B. 再感染  
C. 重复感染  
D. 复发  
E. 混合感染
98. 男 30岁, 在洗浴中无意发现腹部皮下可能触及一球型结节, 黄豆大小, 活动好, 无压痛, 囊虫免疫试验 (+), 最可能的诊断是
- A. 绦虫病  
B. 囊虫病  
C. 华枝睾吸虫病  
D. 并殖吸虫病

E. 以上都不是

### 三、B1型选择题（99~150题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

#### （99~100题共用备选答案）

- A. 精神不集中，甚则失神狂乱
- B. 精神萎靡不振，气短乏力
- C. 二便失禁，昏厥，遗精
- D. 纳呆，腹胀
- E. 心悸，惊恐不安

99. 暴喜可引起

100. 过度悲伤可引起

#### （101~102题共用备选答案）

- A. 伏而后发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 感邪即发
- E. 复发

101. 感邪后缓慢发病是

102. 疠气致病多为

#### （103~104题共用备选答案）

- A. 眩晕欲仆
- B. 目睛上吊
- C. 手足蠕动
- D. 手足拘挛不伸
- E. 咳嗽咽痒

103. 热极生风可见

104. 血虚生风可见

#### （105~106题共用备选答案）

- A. 塞因塞用
- B. 寒者热之
- C. 热因热用
- D. 寒因寒用
- E. 通因通用

105. 适用于脾虚腹胀的治则治法是

106. 适用于真热假寒证的治则治法是

#### （107~108题共用备选答案）

- A. 胖大舌
- B. 瘦薄舌
- C. 点刺舌
- D. 老舌
- E. 强硬舌

107. 气血两虚的舌象是

108. 水湿内停的舌象是

#### （109~110题共用备选答案）

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

109. 歪斜舌多见于

110. 颤动舌多见于

#### （山~112题共用备选答案）

- A. 热扰心神
- B. 痰热扰心
- C. 心气不足
- D. 脏气衰微
- E. 宗气大虚

111. 导致自言自语，见人便止，首尾不续的病因是

112. 导致语言时有错乱，语后自知言错的病因是

#### （113~114题共用朝答案）

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰
- C. 心脾两虚
- D. 心阳亏虚
- E. 心脉痹阻

113. 睡眠时时惊醒，不易安卧多见于

114. 不易入睡，甚至彻夜不眠，兼心烦不寐多见于

#### （115~116题共用备选答案）

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假

- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

115. 麻疹麻毒外透属于

116. 寒包火证属于

(117~118 题共用备选答案)

- A. 妊娠恶阻，胎动不安证
- B. 妊娠胎漏下血，胎动欲坠
- C. 妊娠胎热，胎动不安证
- D. 妊娠肝肾亏虚，胎动不安证
- E. 妊娠脾虚气弱，胎动不安证

117. 白术的主治病证是

118. 桑寄生的主治病证是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 砒石
- B. 炉甘石
- C. 铅丹
- D. 硼砂
- E. 轻粉

119. 既能治疗咽喉肿痛，又能治疗肺热咳嗽的 药物是

120. 既能治疗瘰疬癧疮，又能治疗寒痰哮喘的 药物是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 既能收敛固涩，又能补肾宁心
- B. 既能敛肺止咳，又能生津安蛔
- C. 既能敛肺止咳，又能固精缩尿
- D. 既能敛肺止咳，又能收敛止血
- E. 既能敛肺止咳，又能利咽开音

121. 五味子的功效是

122. 诃子的功效是

(123T24 题共用备选答案)

- A. 滋补肝肾, 养胃生津
- B. 补脾益气, 养胃生津
- C. 滋阴除烦, 养胃生津
- D. 养阴润燥, 清肺生津
- E. 清肺养阴, 益胃生津

123. 北沙参的功效是

124. 天冬的功效是

(125~126 题共用案)

- A. 龟板
- B. 龙骨
- C. 鳖甲
- D. 牡蛎
- E. 代赭石

125. 功效为平肝潜阳, 软坚散结, 收敛固涩的 药物是

126. 功效为滋阴潜阳, 软坚散结, 善于治疗阴 虚风动的药物是

(127-128 题共用案)

- A. 风湿痹痛
- B. 湿热黄疸
- C. 血虚失眠
- D. 肾虚腰痛
- E. 肠燥便秘

127. 川芎可用于治疗的病证是

128. 郁金可用于治疗的病证是

(129-130 题共用备选答案)

- A. 体液传播
- B. 土壤传播
- C. 飞沫传播
- D. 水、食物、苍蝇传播
- E. 蚊虫传播

129. 流感传播途径主要是

130. 流脑传播途径主要是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 病程超过 2 周
- B. 病程超过 1 月
- C. 病程超过 2 月
- D. 病程超过半年
- E. 病程超过 1 年

131. 慢性肝炎

132. 慢性菌痢

(133~134 题共用备选答案)

- A. 发热, 腹痛, 腹泻, 洗肉水样大便
- B. 发热, 腹痛, 腹泻, 脓血便, 里急后重
- C. 腹泻, 呕吐, 水样大便, 无发热, 无腹痛
- D. 发热, 腹痛, 腹泻, 水样大便
- E. 低热, 腹痛, 腹泻, 果酱样大便

133. 急性菌痢典型表现为

134. 霍乱典型表现为

(135-136 题共用备选答案)

- A. 超声波
- B. 洗手
- C. 碘类消毒
- D. 电离辐射
- E. 紫外线

135. 属高效消毒法的是

136. 属灭菌法的是

(137-138 题共用备选答案)

- A. 毛果芸香碱
- B. 新斯的明
- C. 阿托品
- D. 度冷丁
- E. 吗啡

137. 可用于治疗青光眼的是

138. 可用于阵发性室上性心动过速的是

(139-140 题共用备选答案)

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 氯霉素

D. 磺胺嘧啶

E. 庆大霉素

139. 雷米封即

140. 甲哌利福霉素即





(141~142 题共用备选答案)

- A. 作用于髓祥升支粗段的髓质和皮质部，抑制  $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2Cr}$  共同转运系统
- B. 作用于髓祥升支粗段皮质部，抑制  $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2Cr}$  共同转运系统
- C. 作用于远曲小管和集合管，竞争醛固酮受体，对抗醛固酮的作用
- D. 作用于远曲小管近端，阻滞  $\text{Na}^+$ 通道，减少  $\text{Na}^+$ 的重吸收
- E. 作用于近曲小管，抑制碳酸酐酶，减少  $\text{H}^+\text{-Na}^+$ 交换

141. 呋塞米的利尿作用机制是

142. 螺内酯的利尿作用机制是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 灭滴灵
- B. 痢特灵
- C. 甲氧节噻
- D. 呋喃坦噻
- E. 颠茄磺节噻

143. 呋喃妥因又称为

144. 呋喃唑酮又称为

(145~146 题共用答案)

- A. 氮芥类
- B. 喜树碱类
- C. 亚硝脲类
- D. 普卡霉素类
- E. 二氢叶酸还原酶抑制药

145. 属于抗代谢药中常用药物的是

146. 属于抗肿瘤抗生素常用药物的是

(147~148 题共用答案)

- A. 对服务对象实施有利的医学行为
- B. 善待生命，同情、关心、体贴患者
- C. 在医护实践中尊重能够自主的病人的自主性
- D. 在医学服务中公平、正直地对待每一位病人的伦理原则
- E. 在诊治、护理过程中努力避免病人不应有的医疗伤害

147. 尊重原则的含义是

148. 无伤原则的含义是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 要有急病人所急的紧迫感
- B. 要有敢担风险团结协作的使命感
- C. 要有深厚的同情感
- D. 抢救前先让患者知情同意
- E. 要有经济头脑，保证少花钱多办事

149. 在抢救危重病人时，保证抢救成功的前提条件是

150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

## 第二单元

## -sA1 型选择题 (1~85 题)

答题说明：每一道考题下面有 A、B、C、

D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

- 除下列哪一项外，均是《素问·上古天真论》指出的养生的重要原则
  - 法于阴阳
  - 和于术数
  - 起居有节
  - 延年益寿
  - 食饮有节
- 《素问·评热病论》中“劳风”的治法宜
  - 表里刺之
  - 以救俯仰
  - 饮之服汤
  - 调其虚实
  - 和其顺逆
- 太阳中风证发热的特点是
  - 蒸蒸发热
  - 翕翕发热
  - 时时发热
  - 或已发热，或未发热
  - 往来寒热
- 下列哪项不属于“胃家”的含义
  - 胃
  - 大肠
  - 小肠
  - 膀胱
  - 阳明经
- 关于通脉四逆汤的加减法，下列哪项论述是错误的
  - 面色赤加葱九茎
  - 腹中痛，去甘草加芍药二两
  - 呕者加生姜二两
  - 咽痛者去芍药加桔梗一两
  - 利止脉不出者去桔梗加人参二两
- 补肝之要妙，以下哪种方法正确
  - 补用酸，助用焦苦，益用甘味之药以调之
  - 补用苦，助用焦酸，益用甘味之药以调之
  - 补用辛，助用焦苦，益用甘味之药以调之
  - 补用甘，助用焦苦，益用辛味之药以调之
  - 补用咸，助用焦苦，益用甘味之药以调之
- 关于桂枝芍药知母汤证的主症，以下哪项不是
  - 肢节疼痛
  - 头眩短气
  - 温温欲吐
  - 脚肿
  - 口不能言
- “大逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦门冬汤主之”，本方主治的脏腑是
  - 心肺
  - 肺肾
  - 肺胃
  - 脾肾
  - 心肾
- 叶天士《温热论》认为，伤寒与温病传变的区别是
  - 伤寒之邪流连在表，然后化热入里
  - 伤半表半里，然后化热入里
  - 伤寒之邪流连在太阳，然后化热入里
  - 伤寒之邪流连在里，然后化热出表
  - 伤寒之邪流连在阳明经，然后化热入阳明腑
- 《温热论》中提到“营分受热”的情况，以下

哪项不恰当



- A. 胃津受劫  
B. 心神不安  
C. 夜甚无寐  
D. 斑疹隐隐  
E. 撤去气药
11. 下列各项中属于“反佐”范畴的是  
A. 寒药热服  
B. 热因热用  
C. 以泻代清  
D. 火郁发之  
E. 壮水制火
12. 败毒散中配伍人参的主要用意是  
A. 大补肺脾，以复正气  
B. 补脾益肺，培土生金  
C. 扶助正气，鼓邪外出  
D. 益气生津，以资汗源  
E. 益气和中，温阳止痹
13. 银翘散中体现去其性而取其用之法的配伍是  
A. 银花、连翘  
B. 芦根、芥穗  
C. 竹叶、薄荷  
D. 牛蒡子、苦桔梗  
E. 荆芥穗、淡豆豉
14. 九味羌活汤的功用是  
A. 散寒解表，祛风除湿  
B. 发汗解表，疏风止痛  
C. 发汗祛湿，兼清里热  
D. 宣肺除湿止痛  
E. 散寒除湿，通痹止痛
15. 麻子仁丸的组成药物中不含  
A. 大黄  
B. 枳实  
C. 当归  
D. 杏仁  
E. 芍药
16. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是  
A. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣  
B. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣  
C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草  
D. 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草  
E. 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
17. 青蒿鳖甲汤中青蒿与鳖甲的配伍意义是  
A. 除烦坚阴，润燥降火  
B. 养血育阴，益气固表  
C. 滋阴退热，泻火除烦  
D. 益气养血，育阴清热  
E. 滋阴清热，内清外透
18. 香薷散的功用是  
A. 祛湿化浊，理气宽中  
B. 散寒解表，化湿和中  
C. 解表散寒，理气和中  
D. 祛暑解表，化湿和中  
E. 祛暑解表，清热化湿
19. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是  
A. 当归  
B. 附子  
C. 桂枝  
D. 干姜  
E. 甘草
20. 防风通圣散的功用是  
A. 疏风清热，宣肺止咳  
B. 疏风解表，清热通便  
C. 和解少阳，内泻热结  
D. 辛凉宣肺，清热平喘  
E. 解表散寒，温肺化饮
21. 当归补血汤原方当归与黄芪的配伍用量比例是  
A. 1: 1  
B. 1: 2  
C. 1: 5  
D. 2: 1

- E. 5: 1
22. 炙甘草汤的组成药物中含有
- 麦冬、麻仁、枣仁
  - 生地、元参、麦冬
  - 阿胶、当归、芍药
  - 生姜、大枣、黄芷
  - 生地、阿胶、麦冬
23. 左归丸组成中含有而右归丸组成中不含有的药物是
- 枸杞子
  - 龟板胶
  - 鹿角胶
  - 山茱萸
  - 菟丝子
24. 桑螺峭散中配伍龙骨、龟甲的意义是
- 补肾助阳，固精缩尿
  - 滋养肾阴，补心安神
  - 收敛固涩，镇心安神
  - 滋阴潜阳，固精缩尿
  - 固涩止遗，补肾益精
25. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是
- 温阳散寒
  - 温肾纳气
  - 温通经脉
  - 鼓外血
  - WIE 痛
26. 下列何药不是天台乌药散的组成药物
- 青皮
  - 槟榔
  - 木香
  - 巴豆
  - 香附
27. 温经汤的组成药物中不包括
- 干姜、肉桂
  - 丹皮、麦冬
  - 半夏、甘草
  - 当归、芍药
  - 人参、阿胶
28. 川芎茶调散的组成药物中含有
- 牛蒡
  - 羌活
  - 苍术
  - 当归
  - 蝉蜕
29. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是
- 杏苏散
  - 增液汤
  - 桑杏汤
  - 养阴清肺汤
  - 清燥救肺汤
30. 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有
- 白术、茯苓
  - 泽泻、猪苓
  - 滑石、甘草
  - 茯苓、桂枝
  - 滑石、阿胶
31. 患者脘腹绵绵作痛，喜温喜按，呕吐便澹，脘痞食少，畏寒肢冷，口不渴，舌淡苔白润，脉沉细。治宜选用
- 小建中汤
  - 吴茱萸汤
  - 参苓白术散
  - 补中益气汤
  - 理中丸
32. AIE 散的功用
- 宣畅气机，清利湿热
  - 清热化湿，理气和中
  - 清热泻火，利水通淋
  - 利湿化浊，清热解毒
  - 利水渗湿，温阳化气
33. 治疗肝火犯肺所致之咳痰带血，宜选用
- 十灰散
  - 止嗽散
  - 咳血方
  - 四神丸
  - 小蓟饮子
34. 下列不属于“外感六淫”的是

- A. 风
  - B. 寒
  - C. 暑
  - D. 湿
  - E. 痰
35. 以下属于无菌术组成的是
- A. 灭菌法
  - B. 抗菌法
  - C. 管理制度
  - D. 一定的操作规则
  - E. 以上都是
36. 麻醉并发血压下降给予的基础处理是
- A. 要绝对平卧
  - B. 红外线照射物理治疗
  - C. 消除紧张情绪, 鼓励患者
  - D. 吸氧, 保持呼吸道通畅
  - E. 使用维生素 B 族药物
37. 急性呼吸性酸中毒应最先解决的问题是
- A. 肺部感染, 使用大量抗生素
  - B. 进行人工呼吸
  - C. 应用呼吸中枢兴奋剂
  - D. 解除呼吸道梗阻, 改善肺换气功能
  - E. 给予碱性液体
38. 成分输血的优点是
- A. 经济
  - B. 提高疗效
  - C. 使用合理
  - D. 减少不良反应
  - E. 以上都是
39. 术后一般监测不包括
- A. 心电监测
  - B. 肾功能监测
  - C. 血容量监测
  - D. 呼吸功能监测
  - E. 体温监测
40. 术后镇痛的方法包括
- A. 口服给药
  - B. 肌肉注射
  - C. 静脉注射
  - D. 椎管内镇痛
  - E. 以上都是
41. 下列哪项目前不属于腹腔镜手术适应证
- A. 胆囊切除术
  - B. 肝叶切除术
  - C. 淋巴结清扫术
  - D. 结肠切除术
  - E. 胃肠吻合术
42. 治疗气性坏疽的抗生素首选
- A. 青霉素
  - B. 红霉素
  - C. 四环素
  - D. 林可霉素
  - E. 氨苯西林
43. 肾损伤的主要症状不包括
- A. 休克
  - B. 血尿
  - C. 疼痛
  - D. 发热
  - E. 腰肌紧张
44. 毒蛇咬伤后局部症状不显著, 疼痛较轻, 仅感局部麻木或蚁行感, 伤口出血很少, 周围不红肿, 属
- A. 神经毒
  - B. 热毒
  - C. 血液毒
  - D. 混合毒
  - E. 火毒
45. 诊断神经纤维瘤的重要依据是
- A. 多发性肿物
  - B. 肿物米粒至拳头大小
  - C. 蚯蚓状结节
  - D. 肿瘤沿神经干走向生长
  - E. 皮肤出现与神经瘤分布无关的咖啡斑
46. 可以确诊单纯性甲状腺肿的是
- A. 喉镜检查
  - B. 影像学检查
  - C. 基础代谢率



- D. 细胞学检查  
E. 放射性核素检查
47. 下列关于肺癌的描述错误的是
- A. 咳嗽为最常见的症状, 早期多为刺激性干咳  
B. 最常见的转移部位是锁骨上淋巴结  
C. 肿瘤位于胸膜附近易产生规律性的钝痛  
D. 痰液细胞学检查是重要的确诊方法  
E. 可引起异位激素综合征
48. 乳腺癌早期的常见局部体征是
- A. 凹陷性酒窝征  
B. 乳房内包块  
C. 乳头抬高  
D. 乳头内陷  
E. 肿块坚硬
49. 胃、十二指肠溃疡大出血最常见的症状是
- A. 腹痛  
B. 黑便  
C. 肠鸣音活跃  
D. 胃脘部胀满  
E. 体温轻度增高
50. 胃癌的最好发部位为
- A. 胃小弯  
B. 胃大弯  
C. 胃底  
D. 胃窦  
E. 贲门
51. 肝癌诊断中最常用而有效的方法是
- A. CT  
B. MRI  
C. X线检查  
D. 超声检查  
E. 肝血管造影
52. 下列关于门静脉特点的说法错误的是
- A. 门静脉主干的两端均为毛细血管  
B. 门静脉主干中没有静脉瓣存在  
C. 门静脉与腔静脉之间存在脐周交通支  
D. 门静脉与腔静脉之间存在腹膜后分支  
E. 门静脉与腔静脉之间存在胃底、食管下段交通支
53. 肠梗阻的典型症状不包括
- A. 腹痛  
B. 腹胀  
C. 腹泻  
D. 呕吐  
E. 停止排气排便
54. 内痔的主要临床表现为
- A. 便血、贫血、坠胀  
B. 下血、嵌顿、贫血  
C. 便血、坠胀、肿块脱出  
D. 水肿、糜烂、坏死  
E. 嵌顿、坠胀、痔核脱出
55. 前列腺增生症最重要的症状是
- A. 尿潴留  
B. 尿频  
C. 进行性排尿困难  
D. 血尿  
E. 尿痛
56. 透视检查的基础是
- A. 穿透性  
B. 影像效应  
C. 荧光效应  
D. 感光效应  
E. 电离效应
57. 二尖瓣狭窄的 M 型超声心动图叙述错误的是
- A. 左心房增大  
B. 二尖瓣曲线增粗  
C. 二尖瓣回声增强  
D. 二尖瓣前叶曲线双峰消失  
E. EF 斜率增大
58. 高热 3 天, 体温 39.9 ℃, 胸痛, 咯嗽, 咯痰。胸片显示肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈大叶性分布, 在大片密实阴

- 影中常可见到透亮的含气支气管影。考虑是
- 大叶性肺炎
  - 支气管肺炎
  - 右上肺不张
  - 肺结核
  - 中心性肺癌
59. 十二指肠溃疡多发生于
- 水平部
  - 壶腹部
  - 球部
  - 降部
  - 升部
60. 食管癌 X 线钡剂造影可见
- 黏膜皱襞明显增宽、迂曲
  - 管腔狭窄
  - 肿瘤区蠕动消失
  - 形如硬管状
  - 以上都不是
61. 真实客观地记录病人住院期间全部病情经过的是
- 病程记录
  - 首次病程记录
  - 会诊记录
  - 转科记录
  - 出院记录
62. 书写“体格检查”部分的内容时,应重点记载的是
- 一般情况
  - 皮肤、黏膜
  - 阳性体征
  - 淋巴结
  - 头部及其器官
63. 板状腹可见于
- 急性阑尾炎
  - 急性胆囊炎
  - 肠结核
  - 急性胃肠穿孔
  - 大量腹水
64. 下列会出现腹肌紧张的是
- 结核性腹膜炎
  - 恶性肿瘤晚期
  - 体弱的老年人
  - 重症肌无力
  - 大量放腹水后
65. 肛门外(齿状线以下)有紫红色柔软包块,表面为皮肤者称为
- 肛裂
  - 内痔
  - 外痔
  - 肛瘘
  - 直肠脱垂
66. 检查脊柱弯曲度的正确体位是
- 仰卧位
  - 右侧卧位
  - 左侧卧位
  - 膝胸卧位
  - 站立位
67. 叩诊发现心影呈梨形增大,是由于
- 右室、左室增大
  - 左房增大
  - 左房增大或合并肺动脉段扩大
  - 右室、右房增大
  - 左室增大,主动脉弓突出
68. 二尖瓣狭窄时的听诊特点是
- 心尖部收缩期吹风样杂音
  - 心尖部舒张中晚期隆隆样杂音
  - 主动脉瓣区舒张期叹气样杂音
  - 胸骨左缘 3、4 肋间粗糙的收缩期杂音
  - 肺动脉瓣区舒张期杂音
69. 下列不会出现蠕动波的是
- 极度消瘦者
  - 肠麻痹患者
  - 腹壁松弛且菲薄的多产妇
  - 幽门梗阻患者

- E. 肠梗阻患者
70. 触诊发现包块，导尿后肿物消失，可能为
- A. 肝脏
  - B. 胆囊
  - C. 胃扩张
  - D. 胀大膀胱
  - E. 多囊肾
71. 糖尿病酮症酸中毒时尿呈
- A. 烂苹果味

- B.带蒜臭味
- C.脓尿
- D.氨味
- E.菌尿

72.吸气性呼吸困难表现为

- A.明显的哮鸣音
- B.深大呼吸
- C.桶状胸
- D.三凹征
- E.胸部一侧呼吸减弱

73.变异型心绞痛的心电图表现为

- A. T 波双向
- B. T 波低平
- C. S-T 段呈下垂型压低
- D. S-T 段抬高
- E. S-T 段呈水平型

74.黄绿色痰可顺

- A.铜绿假单胞菌肺炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.慢性支气管炎
- E.肺结核

75.下列疾病可引起咯血, 但除外

- A.肺结核
- B.肺炎
- C.支气管内膜结核
- D.风湿性心脏病
- E.支气管哮喘

76.下列不属于个人史的是

- A.社会经历
- B.习惯与嗜好
- C.冶游史
- D.职业和生活条件
- E.生育史

77.下列不符合心包摩擦音特点的是

- A.收缩期及舒张期均可听到
- B.通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到
- C.将听诊器胸件向胸部加压时, 可使摩擦

D.屏住呼吸时摩擦音消失

E.病人采取坐位稍前倾时, 易于听到

78.正常人支气管呼吸音可听到的部位为

- A.左锁骨上窝
- B.右锁骨上窝
- C.胸骨角周围
- D.胸骨上窝
- E.肩胛间区

79.大量气胸患者, 语音震颤

- A.增强
- B.减弱或消失
- C.稍增强
- D.正常
- E.无变化

80.高钾血症见于

- A.肺心病
- B.呼吸性酸中毒
- C.代谢性酸中毒
- D.代谢性碱中毒
- E.以上均不是

81.血清总胆固醇增高可见于

- A.肝硬化
- B.营养不良
- C.恶性肿瘤
- D.肾病综合征
- E.甲状腺功能亢进症

82.血清中 HBeAg 阳性时, 说明

- A.无传染性
- B.病情比较稳定
- C.曾感染乙肝病毒
- D.颠免疫力
- E.具有较大传染性

83.患者自诉心前区疼痛, 心电图 S<sub>T</sub> 段抬高, 最可能的诊断是

- A.急性心包炎
- B.心肌炎
- C.典型心绞痛发作
- D.变异型心绞痛发作

音增强

E,正常变异

84. 气胸出现的呼吸困难为
- 呼气性呼吸困难
  - 吸气性呼吸困难
  - 混合性呼吸困难
  - 神经精神性呼吸困难
  - 以上都不是
85. 典型心绞痛发作时, 心电图的改变是
- P-R 间期延长
  - 完全性右束支传导阻滞
  - P 波高尖
  - 异常 Q 波
  - T 波低平、双向或倒置

## 二、A2 型选择题 (86~97 题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

86. 患者女性, 28 岁, 手术后出现表情淡漠、嗜睡、烦躁、腹胀、心律加快, 心电图早期 T 波低平、双相倒置, 继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波出现, 属
- 轻度脱水
  - 中度脱水
  - 重度脱水
  - 低钾血症
  - 高钾血症
87. 患者女性, 64 岁, 右下肢出现片状红疹、边缘清楚、略为隆起、局部有烧灼样疼痛, 应首先考虑的诊断是
- 疥
  - 痈
  - 疔
  - 丹毒
  - 急性蜂窝织炎
88. 男性患者, 26 岁, 西医诊断为肝破裂, 中医辨证为血脱证, 宜用方药
- 当归补血汤合参附汤
  - 复元活血汤
  - 四物汤
  - 八珍汤
  - 补阳还五汤
89. 患者, 男, 65 岁, 神清痴呆, 失语, 四肢麻木舌干红无苔, 脉弦细数。治疗首选
- 苏合香丸
  - 保立苏汤
  - 柴胡细辛汤
  - 琥珀安神汤
  - 补阳还五汤合收呆至神汤
90. 患者, 女, 40 岁, 颈前弥漫性肿大, 性情急躁易激动, 双眼突出, 双手颤动, 身体消瘦但食欲亢进。应首先考虑的是
- 单纯性甲状腺肿
  - 甲状腺腺瘤
  - 甲状腺癌
  - 甲状腺功能亢进症
  - 甲状腺机能减退症
91. 患者, 女, 27 岁, 西医诊断为急性乳腺炎。症见乳房生疮, 疮口溃后疼痛逐渐减轻, 但脓水不断, 收口迟缓, 伴有面色少华、易疲劳、饮食欠佳、低热不退等; 舌质淡, 苔薄, 脉细, 选用的治法是
- 疏肝清胃, 通乳散结
  - 清热解毒, 托里透脓
  - 疏肝理气, 散结止痛
  - 活血化瘀, 软坚祛痰
  - 益气活血养营, 清热托毒
92. 患者女性, 35 岁, 转移性右下腹疼痛 3 天, 右下腹压痛、反跳痛、肌紧张, 腰大肌试验阳性, 血白细胞升高, 应诊断为
- 急性阑尾炎
  - 慢性阑尾炎
  - 急性肠梗阻
  - 肠系膜淋巴结炎
  - 右侧附件炎
93. 患者男性, 78 岁, 双侧腹股沟部出现圆形肿

物,不降入阴囊,平卧时可消失,应诊断为

- A. 直疝
- B. 斜疝
- C. 股疝
- D. 嵌顿疝
- E. 难复性疝

94. 患者男性,80岁,出现便血,伴贫血、腹痛、右下腹肿块1个月,无发热,伴明显消瘦,腹胀,应首先考虑的诊断为

- A. 慢性阑尾炎
- B. 阑尾类癌
- C. 结肠癌
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠结核

95. 患者,男,35岁,睾丸肿痛剧烈,阴囊红肿灼热,若脓成则按之应指;高热,口渴,小便黄赤短少;舌红苔黄腻,脉洪数,治疗首选方剂为

- A. 暖肝煎
- B. 柴胡疏肝散
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 仙方活命饮
- E. 滋阴除湿汤

96. 患者,男,52岁,左下肢发凉,间歇性跛行1年,冠心病史3年,心电图检查示:冠状动脉供血不足。应首先考虑的是

- A. 下肢深静脉血栓形成
- B. 动脉硬化性闭塞症
- C. 单纯性下肢静脉曲张
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 干性坏疽

97. 患者,女,23岁,小便不畅、短涩,淋漓不尽,带下多,酒后或疲劳易复发;腰酸腿软,五心烦热,食少纳差;舌红,苔少,脉细数,可初步诊断为

- A. 梅毒-肝经湿热证
- B. 梅毒-血热蕴毒证
- C. 梅毒-毒结筋骨证

D. 淋病-湿热毒蕴证

E. 淋病-阴虚毒恋证

### 三、A3型选择题(98-106题)

答题说明:以下提供若干个案例,每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(98~100题共用题干)

患者女性,54岁,腋下可触及肿块,皮色不变,灼热疼痛,上肢活动不利,伴恶寒发热,纳差,舌红、苔薄白、脉滑数。

98. 根据此患者的症状,考虑为

- A. 气性坏疽
- B. 腋痈
- C. 疔
- D. 脓肿
- E. 丹毒

99. 治法宜选用

- A. 清热解毒
- B. 散风清热,化痰消肿
- C. 和营祛瘀,清热利湿
- D. 清热利湿解毒
- E. 清肝解郁,消肿化毒

100. 宜选用的方剂为

- A. 五味消毒饮
- B. 牛蒡解肌汤
- C. 柴胡清肝汤
- D. 革癖渗湿汤
- E. 活血散瘀汤

(101~103题共用题干)

患者,女,35岁,乳房胀痛半年,经前加重,经后痛减;伴情绪抑郁,心烦易怒,失眠多梦,胸胁胀满;舌质淡红苔薄白,脉细涩。

101. 其证型是

- A. 痰嗽结证
- B. 肝郁气滞证
- C. 气滞血瘀证
- D. 冲任失调证
- E. 毒热蕴结证

## 102. 其治法

- A. 疏肝理气，散结止痛
- B. 调摄冲任，理气散结
- C. 清热解毒，活血化痰
- D. 调理肝脾，益气养血
- E. 疏肝活血，化痰散结

## 103. 选择的方药为

- A. 逍遥散
- B. 二仙汤
- C. 失笑散合开郁散
- D. 逍遥散合桃红四物汤
- E. 桃红四物汤合失笑散

(104~106 题共用题干)

患者，男，17岁，头面及颈部皮损白斑光亮2年，常起病快，发展快，并扩散为一片，微痒，舌质淡红，苔薄白，脉细滑。

## 104. 此患者诊断为

- A. 带状疱疹
- B. 湿疹
- C. 癣
- D. 白癜风
- E. 银屑病

## 105. 选用的治法为

- A. 清热利湿，和营通络
- B. 调和气血，消风通络
- C. 滋补肝肾，养血祛风
- D. 养血和血，祛风润燥
- E. 清热凉血，祛风润燥

## 106. 选用的方药为

- A. 革癖渗湿汤
- B. 除湿胃苓汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 桃红四物汤
- E. 柴胡疏肝散

## 四、B1型选择题(107~15。题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，某

一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(107-108 题共用备选答案)

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝加葛根汤
- C. 葛根汤
- D. 麻黄汤
- E. 小青龙汤

107. 太阳病，项背强几几，无汗恶风，治疗宜用

108. 太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，无汗而喘，脉浮紧，治疗宜用

(109~111 题共用备选答案)

- A. 理中汤
- B. 四逆汤
- C. 桂枝人参汤
- D. 干姜黄芩黄连人参汤
- E. 白头翁汤

109. 太阴病，见腹满而吐，腹痛，食不下，自利益甚者，宜选用

110. 少阴病，见脉微细，但欲寐，恶寒蜷卧，下利清谷者，选用

111. 厥阴病，见腹痛、发热，口苦，渴欲饮水，热利下重者，治用

(112~114 题共用备选答案)

- A. 脉浮，骨节疼痛，恶风
- B. 脉浮，跗肿，其腹如鼓
- C. 脉沉迟，喘息
- D. 脉沉，腹满
- E. 脉沉迟，发热，胸满，四肢头面肿

112. 皮水的临床表现为

113. 正水的临床表现为

114. 石水的临床表现为

(115-116 题共用备选答案)

- A. 玉女煎
- B. 梨皮、蔗浆
- C. 金汁
- D. 化斑汤
- E. 知母、阿胶、龟板



115. 叶天士《温热论》中指出, 若斑出热不解, 因为胃津亡, 轻者治疗可选用
116. 叶天士《温热论》中指出, 若斑出热不解, 因为胃津亡, 重者治疗可选用  
(117~118 题共用<»案)
- A. 保和丸  
B. 健脾丸  
C. 枳实消痞丸  
D. 枳实导滞丸  
E. 木香槟榔丸
117. 饮食不节, 脘腹痞胀, 暖腐吞酸, 恶食呕吐, 大便泄泻, 舌苔厚腻, 脉滑者, 治宜选用
118. 食积内停, 脘腹胀痛, 下痢泄泻, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉沉而有力者, 治宜选用  
(119320 题共用»答案)
- A. 芍药、大腹子  
B. 白术、炮附子  
C. 生姜、草豆蔻  
D. 肉桂、炮干姜  
E. 桂枝、茯苓皮
119. 真武汤的组成药物中含有
120. 实脾散的组成药物中含有  
(121~122 题共用备选答案)
- A. 玉液汤  
B. 炙甘草汤  
C. 麦门冬汤  
D. 养阴清肺汤  
E. 清燥救肺汤
121. 治疗肺胃阴虚之肺痿, 宜用
122. 治疗气阴两亏之肺痿, 宜用  
(123-124 题共用案)
- A. 龙骨、牡蛎、鳖甲  
B. 龙骨、龟板、鳖甲  
C. 牡蛎、鳖甲、石决明  
D. 龙骨、牡蛎、龟板  
E. 鳖甲、牡蛎、龟板
123. 大定风珠的组成中含有的药物是
124. 镇肝息风汤组成中含有的药物是  
(125-126 题共用备选答案)
- A. 丹参饮  
B. 温经汤  
C. 生化汤  
D. 失笑散  
E. 桂枝茯苓丸
125. 具有活血祛瘀, 散结止痛功用的方剂是
126. 具有养血祛瘀, 温经止痛功用的方剂是  
(127-128 题共用备选答案)
- A. 大黄、芒硝、赤芍  
B. 桃仁、丹皮、芒硝  
C. 大黄、桃仁、甘草  
D. 赤芍、丹皮、甘草  
E. 大黄、赤芍、丹皮
127. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是
128. 桃核承气汤的组成中含有药物是  
(129-130 题共用备选答案)
- A. 肿疡  
B. 根盘  
C. 根脚  
D. 应指  
E. 护场
129. 肿疡基底部周围之坚硬区, 边缘清楚, 称为
130. 肿疡之基底根部称为  
(131~132 题共用备选答案)
- A. 纵隔损伤  
B. 吸入性肺炎  
C. 鳞状脱屑、脱发  
D. 高渗性非酮症昏迷  
E. 胆囊结石、胆汁淤积
131. 肠外营养操作不当可发生
132. 肠外营养糖代谢紊乱可发生

(133~134 题共用备选答案)

- A. 皮肤及其网状淋巴管的急性炎症
- B. 一个毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- C. 皮下筋膜下蜂窝组织急性炎症
- D. 多个相邻毛囊及其所属皮脂腺的急性化脓性感染
- E. 足癣感染, 足背及小腿出现红丝, 局部肿胀, 行动不便

133. , 发, 是指

134. “红丝疔”是指

(135~136 题共用朝答案)

- A. 人参养荣汤
- B. 四妙勇安汤
- C. 四逆加入参汤
- D. 益胃汤合参苓白术散

E. 黄连解毒汤合犀角地黄汤

135. 治疗冷伤之气血两虚证首选

136. 治疗冷伤之阴盛阳衰证首选

(137~138 题共用备选答案)

- A. 疏肝清热, 通下利胆
- B. 清胆利湿, 通气通腑
- C. 泻火解毒, 通腑救逆
- D. 清热泻火, 通里逐积
- E. 清热利湿, 行气通下

137. 胆石病的肝胆湿热证选用的治法是

138. 胆石病的肝胆蕴热证选用的治法是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 当归饮子
- B. 除湿胃苓汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 消风散合四物汤
- E. 革藓渗湿汤合三妙丸

139. 湿疹湿热浸淫证选用的方剂为

140. 湿疹脾虚湿蕴证选用的方剂为

(141~142 题共用备选答案)

- A. 急性和亚急性肝坏死
- B. 肝囊肿
- C. 大量腹水
- D. 急性腹膜炎
- E. 肺源性心脏病, 右心室肥大

141. 可出现液波震颤的为

142. 可出现腹壁紧张, 伴有压痛、反跳痛的为

(143~144 题共用朝答案)

A. 右上腹压痛

B. 左上腹压痛

C. 中下腹压痛

D. 墨菲征阳性

E. 右下腹麦氏点压痛、反跳痛

143. 急性胆囊炎为

144. 急性阑尾炎为

(145~146 题共用备选答案)

A. 高糖血症

B. 尿糖阳性

C. 血糖减低

D. 低糖血症

E. 空腹血糖过高

145. FBG > 9.0mmol/L 时为

146. FBG V 3.9mmol/L 时为

(147~148 题共用备选答案)

A. 脓血便

B. 鲜血便

C. 柏油样便

D. 灰白色便

E. 稀糊状便

147. 阻塞性黄疸为

148. 上消化道出血为

(149~150 题共用备选答案)

A. 血尿

B. 血红蛋白尿

C. 胆红素尿

D. 乳糜尿

E. 脓尿

149. 肾盂肾炎患者可出现

150. 血小板减少性紫癜时可出现



## 第三单元

## 一、A1型选择题(1~53题)

答题说明:每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 非小细胞肺癌中,最常见的是
  - A. 小细胞肺癌
  - B. 鳞状上皮细胞癌
  - C. 腺癌
  - D. 大细胞癌
  - E. 鳞腺癌
2. 不属于肺炎链球菌肺炎病理改变分期的是
  - A. 充血期
  - B. 红色肝变期
  - C. 灰色肝变期
  - D. 消散期
  - E. 吸收期
3. 化脓性感染的主要原因是
  - A. 衣原体
  - B. 寄生虫
  - C. 肺炎链球菌
  - D. 表皮葡萄球菌
  - E. 金黄色葡萄球菌
4. 治疗原发性支气管肺癌中医证型之阴虚毒热证选用的方药是
  - A. 导痰汤
  - B. 保真汤
  - C. 血府逐瘀汤
  - D. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
  - E. 百合固金汤合秦鳖鳖甲散
5. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是
  - A. 慢性阻塞性肺疾病
  - B. 严重的胸廓畸形
  - C. 神经-肌肉病变
  - D. 晚期支气管哮喘
  - E. 重症肺结核
6. 急性左心衰竭常见临床表现是
  - A. 呼吸困难
  - B. 咳嗽、咯痰、咯血
  - C. 肝\_颈静脉反流征阳性
  - D. 急性肺水肿
  - E. 少尿
7. 液体潴留的可靠指标是
  - A. 短时间内体重增加
  - B. 颈静脉充盈程度
  - C. 肝\_颈静脉反流征
  - D. 肺和肝充血的程度
  - E. 下肢和骶部水肿
8. 急性心肌梗死最常见的心律失常是
  - A. 窦性停搏
  - B. 阵发性室上性心动过速
  - C. 室性期前收缩
  - D. 交界性心律
  - E. 心房扑动
9. 一心脏病患者轻度活动时即引起乏力、心悸、呼吸困难等症状。其心功能应属
  - A. 心功能1级
  - B. 心功能2级
  - C. 心功能3级
  - D. 心功能4级
  - E. 心功能正常
10. 栓塞最常见于下列哪种病人
  - A. 二尖瓣关闭不全
  - B. 主动脉瓣关闭不全
  - C. 二尖瓣狭窄伴房颤
  - D. 主动脉瓣狭窄
  - E. 三尖瓣狭窄
11. 胸外心脏按压的频率是
  - A. 每分钟至少60次
  - B. 每分钟至少80次
  - C. 每分钟至少100次
  - D. 每分钟至少120次

E. 每分钟至少 140 次



12. 高血压急症的首选降压药是
- 硝普钠
  - 硝酸甘油
  - 映塞米
  - 硝苯地平
  - 贝那普利
13. 急性胃炎在中医中密切相关的脏腑是
- 肝脾
  - 肺脾
  - 肺肾
  - 脾肾
  - 心肝
14. 治疗溃疡性结肠炎脾肾阳虚证首选
- 四神丸
  - 实脾散
  - 痛泻要方
  - 参苓白术散
  - 膈下逐瘀汤
15. 关于上消化道出血的叙述，错误的是
- 出血量超过 50ml, 即可出现柏油样黑粪
  - 出血早期血压、血红蛋白可正常
  - 出血 24~48 小时内可急诊胃镜检查
  - 咖啡渣样液是血液经过胃酸作用后形成的
  - 大量出血者就是食管静脉曲张静脉破裂出血
16. 消化性溃疡的命名是由于
- 溃疡位于消化道
  - 溃疡影响消化功能
  - 溃疡局限于胃和十二指肠
  - 溃疡由消化道功能紊乱引起
  - 溃疡的形成有胃酸和胃蛋白酶的消化作用参与
17. 原发性肝癌淋巴结转移，以何部位最多见
- 肝门淋巴结
  - 锁骨上淋巴结
  - 胰腺
  - 腋窝淋巴结
18. 慢性肾炎有多少由急性肾炎转变而来
- 全部
  - 少数
  - 半数
  - 大多数
  - 没有
19. 女性易患尿路感染的最主要原因是
- 妊娠
  - 月经期抵抗力下降
  - 更年期内分泌失调
  - 尿道口接近肛门且尿道直而宽
  - 饮食影响尿液 pH 值
20. 肾病综合征所表现的水肿最易损伤五脏中哪些脏器
- 心、肝、肾
  - 肾、肺、脾
  - 肺、脾、心
  - 肝、肾、脾
  - 心、肝、脾
21. 急性白血病的首发表现是
- 贫血
  - 发热
  - 出血
  - 脾大
  - 失明
22. 巨脾伴见白细胞数显著增高多见于
- 急性淋巴细胞性白血病
  - 慢性髓细胞性白血病
  - 血吸虫病晚期
  - 骨髓纤维化症
  - 肝硬化
23. 下列缺铁性贫血所属中医范畴错误的是
- 血劳
  - 浮肿
  - 虚劳
  - 萎黄
  - 黄胖
24. 下列哪项不是引起再障的主要原因



E.脾脏

A.药物

- B. 接触化学毒物  
C. 病毒感染  
D. 饮食不当  
E. 电离辐射
25. 等渗性失水多发生于  
A. 胃肠液急性丧失  
B. 水分摄入不足  
C. 大量出汗  
D. 渗透性利尿  
E. 水分丧失
26. 痛风的特征性临床表现是  
A. 关节疼痛  
B. 局部红肿热痛  
C. 关节肿胀  
D. 痛风石  
E. 功能受限
27. 痛风诊断的金标准为  
A. 尿酸测定  
B. 尿尿酸测定  
C. 滑囊液检查  
D. X线检查  
E. 超声检查
28. 甲状腺摄<sup>131</sup>I率和血清T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>呈特征性分离现象的疾病是  
A. Graves病  
B. 桥本病  
C. 单纯性甲状腺肿  
D. 甲状腺腺瘤  
E. 亚急性甲状腺炎
29. 类风湿关节炎的基本病理改变是  
A. 皮炎  
B. 滑膜炎  
C. 心包炎  
D. 血管炎  
E. 心脏炎
30. 短暂性脑缺血发作持续时间为  
A. 数秒至数分钟  
B. 数分钟至1小时  
C. 1~2小时  
D. 2~6小时  
E. 6~24小时
31. 脑栓塞的多发人群是  
A. 儿童  
B. 少年  
C. 青壮年  
D. 中年  
E. 老年
32. 晚期帕金森病的典型步态是  
A. 小步态  
B. 慌张步态  
C. 蹒跚步态  
D. 间歇跛行  
E. 拖曳步态
33. 腔隙性梗死约占急性缺血性脑卒中的  
A. 10%  
B. 20%  
C. 30%  
D. 40%  
E. 50%
34. 蛛网膜下腔出血最可靠的诊断依据是  
A. 突然剧烈头痛, 呕吐  
B. 脑膜刺激征阳性  
C. 偏瘫  
D. CT脑检查呈低密度影  
E. 脑脊液检查呈均匀血性, 压力增高
35. 苯二氮草类拮抗药是  
A. 纳洛酮  
B. 苯丙胺  
C. 苯海拉明  
D. 盐酸苯海索  
E. 氟马西尼
36. 血胆碱酯酶活力测定可疑时还可进行哪项检查

- A. 痰液检查  
B. 大便检查  
C. 尿液检查  
D. 脑脊液检查  
E. 活组织检查
37. 休克的病理特点是  
A. 有效循环血量代偿性增加  
B. 组织器官有效灌流量锐减与有效循环血量不足  
C. 有效循环血量不足  
D. 组织器官灌流减少  
E. 组织器官有效灌流量增加
38. 实喘的治疗原则是  
A. 化痰平喘  
B. 祛邪利气  
C. 降气平喘  
D. 降气化痰  
E. 以上都不是
39. 虚烦不寐,触事易惊,终日惕惕,胆怯心悸,伴气短自汗,倦怠乏力,宜选  
A. 黄连阿胶汤  
B. 半夏秫米汤  
C. 归脾汤合酸枣仁汤  
D. 安神定志丸合酸枣仁汤  
E. 六味地黄丸
40. 便秘是指两次排便时间间隔  
A. 6天以上  
B. 2天以上  
C. 3天以上  
D. 4天以上  
E. 5天以上
41. 胃痞痰湿中阻证治疗的主方是  
A. 二陈平胃汤加減  
B. 保和丸加減  
C. 泻心汤和连朴饮加減  
D. 越鞠丸和枳术丸加減  
E. 枳实消痞丸加減
42. 下列哪一项不是肝胆湿热胁痛的特点  
A. 肋肋灼热胀痛  
B. 口苦口黏  
C. 小便黄赤  
D. 舌红少苔  
E. 脉弦滑数
43. 眩晕与中风的鉴别点关键在  
A. 眩晕  
B. 头痛  
C. 昏扑  
D. 汗出  
E. 半身不遂
44. 肝胆湿热证的胁痛,治疗主方为  
A. 小承气汤  
B. 大承气汤  
C. 甘露消毒丹  
D. 龙胆泻肝汤  
E. 三仁汤
45. 虚劳的辨证论治纲领是  
A. 以气血阴阳为纲,五脏虚候为目  
B. 以气血阴阳为纲,五脏病机为目  
C. 以脏腑虚实为纲,病邪轻重为目  
D. 以感受病邪为纲,五脏病机为目  
E. 以脏腑经络为纲,五脏虚候为目
46. 郁证与五脏皆有关系,但关系密切的脏是  
A. 心、肝、脾  
B. 心、肝、肺  
C. 心、肝、肾  
D. 心、肺、肾  
E. 脾、肺、肾
47. 自汗、盗汗与战汗的区别错误的是  
A. 汗出有无突然恶寒战栗  
B. 心悸少寐  
C. 汗出是否是发生在急性热病进程中  
D. 汗出之后脉静身凉  
E. 全身汗出
48. 提出“溜痿者独取阳明”的医著是

- A. 《素问》
- B. 《证治准绳》
- C. 《医学纲目》
- D. 《赤水玄珠》
- E. 《张氏医通》

49. 下列各项中, 在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是

- A. 《中华人民共和国刑法》
- B. 《中华人民共和国宪法》
- C. 《中华人民共和国民法通则》
- D. 《中华人民共和国食品安全法》
- E. 以上均不是

50. 卫生法所涉及的民事责任主要形式是

- A. 赔偿损失
- B. 行政处罚
- C. 刑事处罚
- D. 财产责任
- E. 损害责任

51. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚决定之日起至申请注册之日止不满多长时间的不给予注册

- A. 6个月
- B. 12个月
- C. 18个月
- D. 24个月
- E. 36个月

52. 下列关于假药的情形叙述正确的是

- A. 变质的药品
- B. 被污染的药品
- C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品
- D. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品
- E. 以上均是

53. 关于突发公共卫生事件的应急预案措施中, 有关部门及医疗卫生机构应当对传染病做到下列哪“四早”

- A. 早发现、早报告、早隔离、早治疗
- B. 早发现、早隔离、早诊断、早治疗
- C. 早发现、早报告、早诊断、早治疗
- D. 早发现、早报告、早诊断、早治疗
- E. 早发现、早报告、早观察、早治疗

## 二、A2型选择题(54~85题)

答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

54. 张某, 男, 48岁。支气管肺癌术后3个月, 配合中药治疗。现症见: 咳嗽不畅, 咯痰不爽, 胸胁胀痛、刺痛, 面青唇暗, 大便秘结, 舌质暗紫, 舌下有瘀斑, 脉弦。治拟何法

- A. 活血散瘀, 行气化滞
- B. 祛湿化痰, 清热解毒
- C. 养阴清热, 解毒散结
- D. 益气养阴, 化痰散结
- E. 行气化滞, 清热解毒

55. 韩某, 男, 68岁。肺心病多年, 诊见: 呼吸短难续, 声低气怯, 甚则张口抬肩, 倚息不能平卧, 咳嗽, 痰白清稀如沫, 胸闷, 心慌形寒, 汗出, 舌淡, 脉沉细微无力。治疗宜选

- A. 苏子降气汤
- B. 生脉散合血府逐瘀汤
- C. 补肺汤
- D. 涤痰汤
- E. 小青龙汤

56. 患者, 男, 19岁, 患支气管哮喘, 现症见气粗息涌, 咳呛阵作, 喉中哮鸣, 胸高肋胀, 烦闷不安, 汗出, 口渴喜饮, 面赤口苦, 咳痰色黄, 黏浊稠厚, 咯吐不利, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 中医治法为

- A. 温肺散寒, 化痰平喘
- B. 清热宣肺, 化痰定喘
- C. 补肺固卫

- D. 健脾化痰  
E. 补肾纳气
57. 患者，女，40岁。提早出现的P'波，形态与窦性P波不同；P'-R>0.12秒；QRS形态正常；代偿间歇不完全。该患者的诊断为
- A. 室上性心动过速  
B. 房性早搏  
C. 室性早搏  
D. 房颤  
E. 室颤
58. 患者，男，45岁。近来出现心动过速。查体：心率为160次/分，律规则，按压颈动脉窦后，心率突然减慢至90次/分，但运动后又增至160次/分。诊断最可能是
- A. 阵发性室上性心动过速  
B. 阵发性室性心动过速  
C. 窦性心动过速  
D. 阵发性房性心动过速伴2:1房室传导  
E. 心房扑动，2:1房室传导
59. 患者，男，28岁。1年来阵发性血压升高，发作时有剧烈头痛、面色苍白、心动过速等。平时血压正常且无症状，应首先考虑做下列哪项检查
- A. 肾动脉造影  
B. 测定24小时尿儿茶酚胺和香草基杏仁酸  
C. 24小时尿17-羟皮质类固醇  
D. 血浆肾素活性测定  
E. 静脉肾盂造影
60. 患者，男，60岁。上腹隐痛1年，饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃肠造影胃皱襞少，黏膜粗乱。诊断首先考虑为
- A. 胃溃疡  
B. 慢性萎缩性胃炎  
C. 胃癌  
D. 慢性浅表性胃炎  
E. 胃黏膜脱垂症
61. 患者，男，28岁。经常出现规律性上腹痛3年，空腹发作，夜间更重，进食可缓解，服抗酸药可止痛。最可能的诊断为
- A. 胃溃疡  
B. 十二指肠球部溃疡  
C. 复合性溃疡  
D. 十二指肠壅积症  
E. 胃黏膜脱垂症
62. 患者，男，42岁。不规则低热3个月，厌食，体重下降5kg，右季肋下胀痛，巩膜轻度黄染，面部有三个蜘蛛痣，肝肋下3.5cm，质硬表面不平，脾肋下1cm，肝区可闻及血管杂音，白细胞 $5.8 \times 10^9/L$ ，中性0.64，谷丙转氨酶130U/L。碱性磷酸酶30U/L。经中西医治疗无效。应诊断为
- A. 慢性活动性肝炎  
B. 原发性肝癌  
C. 门脉性肝硬化  
D. 肝脓肿  
E. 肝血管瘤
63. 患者刘某，男性，34岁。因身体不适就诊，全身浮肿，面色苍白，畏寒肢冷，腰脊冷痛，神疲，纳少，便溏，舌嫩淡胖，有齿痕，脉沉。尿常规检查见蛋白尿，血压160/90mmHg。应诊为慢性肾炎哪一型
- A. 肺肾气虚证  
B. 脾肾阳虚证  
C. 脾肾气虚证  
D. 肝肾阴虚证  
E. 气阴两虚证
64. 患者，男，38岁，体检发现蛋白尿，但未进行治疗，1年后出现浮肿等，就诊时24小时定量为5.69，表现为面浮身肿，按之凹陷不起，心悸，气促，腰部冷痛酸重，小便量少，形寒神疲，面色灰滞，舌质淡胖，苔白，脉沉细无力。应选用
- A. 实脾饮加减  
B. 济生肾气丸合真武汤

- C. 左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子  
 D. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮  
 E. 越婢加术汤加減
65. 罗某, 男性, 21岁, 患慢性髓细胞性白血病, 现采用周期特异性抑制。DNA合成的药物羟基脲, 为控制疾病, 拟采用中西医结合方法。患者面色萎黄, 头晕眼花, 心悸, 心慌, 疲乏无力, 气短懒言, 自汗, 食欲減退, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。应如何辨证, 采用何方治疗
- A. 阴虚内热证, 青蒿鳖甲汤加減  
 B. 气血两虚证, 膈下逐瘀汤加減  
 C. 气血两虚证, 八珍汤加減  
 D. 热毒壅盛证, 犀角地黄汤加減  
 E. 阴虚内热证, 犀角地黄汤加減
66. 王某, 男性, 9岁。在房屋装修后立即入住, 半年后出现头晕, 乏力, 心悸, 就诊时骨髓活检示增生低下, 患者表现为面色苍白, 唇甲色淡, 心悸乏力, 额红盗汗, 手足心热, 口渴思饮, 腰膝酸软, 皮肤出血, 便结, 舌质淡, 舌苔薄, 脉细数。最可能诊断为西医何病、中医何证
- A. 缺铁性贫血, 肾阴虚证  
 B. 再障, 肾阳亏虚证  
 C. 恶性贫血, 肾阳亏虚证  
 D. 再障, 肾阴虚证  
 E. 再障, 肾阴阳两虚证
67. 患者王某, 男, 45岁, 体重60kg, 患贲门癌进食困难2个月, 现口渴严重, 疲乏, 尿量减少。查体: 血压100/70mmHg, 心率90次/分, 体温正常, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差, 唇舌干燥。依据失水程度计算, 该患者需补液量为
- A. 1000ml  
 B. 1500ml  
 C. 3000ml  
 D. 4000ml  
 E. 5000ml
68. 患者, 女, 39岁。现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛, 发热多汗, 急躁, 心悸半月。左侧甲状腺轻度肿大。心率100次/分, 律齐。应首先考虑的诊断是
- A. Graves病  
 B. 桥本病  
 C. 单纯性甲状腺肿  
 D. 甲状腺腺瘤  
 E. 亚急性甲状腺炎
69. 李某, 女, 高热5天, 不恶寒, 满面红赤, 皮肤红斑鲜红, 咽干, 口渴, 喜冷饮, 尿赤而少, 关节疼痛, 舌红绛, 苔黄, 脉滑数。查抗双链DNA(dsDNA)抗体、抗Sm抗体(+ )。证属
- A. 气营热盛证  
 B. 阴虚内热证  
 C. 热郁积饮证  
 D. 瘀热痹阻证  
 E. 气分热盛证
70. 患者, 男, 62岁, 头晕目眩, 猝然半身不遂, 移时恢复如常, 舌质暗, 苔黄厚腻, 脉滑数, 选用的方药为
- A. 镇肝息风汤  
 B. 补阳还五汤  
 C. 星萎承气汤  
 D. 天麻钩藤饮  
 E. 黄连温胆汤合桃红四物汤
71. 患者, 男, 45岁, 高血压十余年, 左侧面部和上下肢无力, MRI可清晰显示脑干病灶, 其余未见明显异常, 可考虑患者为
- A. 脑出血  
 B. 脑栓塞  
 C. 脑血栓形成  
 D. 腔隙性梗死  
 E. 蛛网膜下腔出血
72. 患者, 男, 35岁, 被人发现时躺在公园一角落, 呈半昏迷状态, 便急送医院。体检: 体温、血压正常, 神志不清, 两侧瞳孔针尖大

- 小，口角流涎，口唇紫紺，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率 60 次/分钟，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。可能的诊断是
- 有机磷杀虫药中毒
  - 酒精中毒
  - CO 中毒
  - 中暑
  - 安定中毒
73. 张某，12 岁，因发热就诊，肌注青霉素后出现肢冷，汗出，血压下降，应采用下列哪种药物治疗
- 间羟胺
  - 氢化考的松
  - 去甲肾上腺素
  - 多巴胺
  - 肾上腺素
74. 某男，28 岁，喘逆上气，息粗鼻煽。咳而不爽，痰吐稠黏，形寒身热，身痛无汗，口渴，苔薄白，质红，脉浮数。治疗方剂宜首选
- 麻黄汤
  - 小青龙汤
  - 麻杏石甘汤
  - 桑白皮汤
  - 三子养亲汤
75. 患者，女，28 岁。心烦不寐，胸闷脘痞，泛恶暖气，伴口苦，头重，目眩，舌偏红，苔黄腻，脉滑数，选用的治法是
- 疏肝泻火，镇心安神
  - 清化痰热，和中安神
  - 补益心脾，养血安神
  - 滋阴降火，交通心肾
  - 益气镇惊，安神定志
76. 患者，男，51 岁。腹痛绵绵，时作时止，喜温喜按，形寒肢冷，大便溏薄，神疲气短，舌淡苔白，脉沉细。治疗主方为
- 补中益气汤
  - 附子粳米汤
  - 保和丸
  - 小建中汤
  - 四逆汤
77. 患者，男，53 岁。大便时澹时泄，稍进油腻之物，则大便次数增多，饮食减少，食后脘闷不舒，面色萎黄，肢倦乏力，舌淡苔白，脉细弱。治法为
- 健脾益气
  - 温肾健脾
  - 固涩止泻
  - 补中益气
  - 益气升清
78. 左某，男，42 岁。患慢性肝炎十余年。近一周来出现腹胀大，按之不坚，肋下胀满疼痛，纳食减少，食后作胀，暖气不爽，小便短少，苔白腻，脉弦。治宜选用
- 柴胡疏肝散
  - 五苓散
  - 实脾饮
  - 调营饮
  - 中满分消丸
79. 患者，男，52 岁。近来肋肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。治法宜选用
- 疏肝理气
  - 蹴通络
  - 清热利湿
  - 养阴柔肝
  - 以上都不是
80. 患者，女，40 岁，水肿多年，腰以下为甚，按之不易复起，脏腹胀闷，纳呆便澹，面色萎黄，神倦肢冷，小便短少。舌淡胖，边有齿痕，舌苔白腻，脉沉弱，治疗用何方最佳
- 实脾饮
  - 济生肾气丸合真武汤
  - 胃苓汤合五皮饮
  - 参苓白术散

## E. 越婢加朮汤

81. 患者,男,23岁,低热,午后热甚,胸闷痞痞,全身重着,不思饮食,渴不欲饮,呕恶,大便黏滞不爽,舌苔白腻,脉濡数。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 痰湿郁热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

82. 患者,女,30岁。心悸,失眠,烦躁,潮热,盗汗,口舌生疮,面色潮红,舌红少津,脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 养心汤
- B. 天王补心丹
- C. 沙参麦冬汤
- D. 四物汤

## E. 朱砂安神丸

83. 患者,男,55岁。有慢性咳嗽病史十余年,平素易汗出,劳动后尤甚,易外感,体倦乏力,恶风,舌苔薄白,脉细弱。其治疗首选

- A. 桂枝汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 玉屏风散
- D. 当归六黄汤
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

84. 患者程某,男,62岁,腰膝酸软,不能久立,肢体痿软无力,以下肢为著,下肢肌肉渐萎缩,咽干耳鸣,舌红少苔,脉细数。其首选的治疗方法是

- A. 清热利湿,凉血活血
- B. 清热润燥,养肺生津
- C. 清热利湿,通利筋脉
- D. 补脾益气,健运升清
- E. 补益肝肾,滋阴清热

85. 方某,女,45岁,腰髓部冷痛重着,“如带五千钱”,不能转侧,活动不利,静卧痛不减,

天阴下雨则疼痛尤甚,舌质淡,苔白腻,脉沉而迟缓。其选择的中医治法是

- A. 清热利湿,舒筋止痛
- B. 活血理气,舒筋止痛
- C. 耀行湿,温经通络
- D. 温补肾阳,舒筋止痛
- E. 滋补肾阴,温经通络

## 三、A3型选择题(86-109题)

答题说明:以下提供若干个案例,每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息,在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

## (86~88题共用题干)

患者,男,30岁。1周前出现发热,恶风,鼻塞,咳嗽,自服感冒药、止咳化痰药物,症状不减。昨日咳嗽,咯痰加重。现症:咳嗽频剧,气促,痰色白,咯吐不爽,口微渴,发热重,恶寒轻,头痛,鼻塞。查体:T39.0℃,右下肺叩诊浊音,听诊呼吸音减低,可闻及湿啰音。舌边尖红,苔薄白,脉浮数。血常规:白细胞12x10<sup>9</sup>/L,中性粒细胞80%。胸部X线片示:右下肺片状浸润阴影。

86. 最可能的诊断是

- A. 胸膜炎
- B. 肺癌
- C. 肺脓肿
- D. 肺结核
- E. 肺炎链球菌肺炎

87. 西医治疗首选

- A. 氨基糖苷类抗生素
- B. 红霉素
- C. 四环素
- D. 青霉素G
- E. 克林霉素

88. 中医治疗首选

- A. 生脉散合四逆汤
- B. 竹叶石膏汤



- C. 麻杏甘石汤
- D. 三拗汤
- E. 清营汤

(89~91 题共用题干)

患者，女，45岁。患糖尿病5年。3年前间歇出现头痛，测血压增高，最高达160/96mmHg。现症：头痛，痛有定处；固定不移。头晕阵作，心前区痛，偏身麻木。查体：BP165/95mmHg。口唇发绀，心率75次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，两肺呼吸音清，腹软。舌紫，脉弦细涩。心电图示：窦性心律，左室高电压。尿常规：未见异常。

89. 该患者的血压应降至
- A. 130/80mmHg 以下
  - B. 140/90mmHg 以下
  - C. 150/80mmHg 以下
  - D. 150/90mmHg 以下
  - E. 160/90mmHg 以下

90. 其中医辨证是
- A. 瘀血内停证
  - B. 肝阳上亢证
  - C. 肝肾阴虚证
  - D. 痰湿内盛证
  - E. 肾阳虚衰证

91. 治疗应首选
- A. 半夏白术天麻汤
  - B. 天麻钩藤饮
  - C. 血府逐瘀汤
  - D. 杞菊地黄丸
  - E. 济生肾气丸

(92~94 题共用题干)

患者，男，40岁。中上腹饥饿性隐痛反复发作10年，情志不遂时加重，痛引两胁，伴反酸、暖气，口苦，进食和服用抑酸剂可缓解。舌淡红，苔薄白，脉弦。

92. 该患者最可能的疾病是
- A. 胃癌

- B. 胰腺癌
- C. 消化性溃疡
- D. 慢性胆囊炎
- E. 慢性胰腺炎

93. 对于本病最直接的诊断方法是
- A. 胃镜检查
  - B. X线钡餐检查
  - C. 幽门螺杆菌检测
  - D. 胃液分析和血清胃泌素测定
  - E. 腹水检查

94. 中医治疗应首选
- A. 柴胡疏肝散和五磨饮子
  - B. 一贯煎合芍药甘草汤
  - C. 化肝煎合左金丸
  - D. 活络效灵丹合丹参饮
  - E. 黄芷建中汤

(95~97 题共用题干)

患者，女，35岁。因寒战、发热、腰痛伴尿频、尿急、尿痛1天入院。查体：体温39.5℃。左侧肾区有叩击痛，肋脊角压痛。尿沉渣镜检白细胞6个/高倍视野，可见白细胞管型。

95. 该患者最可能的诊断是
- A. 急性肾小球肾炎
  - B. 急性膀胱炎
  - C. 急性肾盂肾炎
  - D. 慢性肾盂肾炎
  - E. 肾结核

96. 该患者进一步检查，以便尽快选择有效药物治疗，最简便、阳性率最高的试验是
- A. 尿白细胞排泄率
  - B. 尿涂片细菌检查
  - C. 尿细菌培养
  - D. 内生肌酐清除率
  - E. X线检查

97. 若患者进行尿细菌培养，最有助于诊断的结果是
- A.  $N 10/mL$
  - B.  $N 10^2/mL$

- C.  $3 \times 10^3/\text{mL}$
- D.  $> 10^4/\text{mL}$
- E.  $2 \times 10^5/\text{mL}$

(98~100 题共用题干)

患者，男，44岁。心悸、怕热、手颤、乏力1年，大便不成形，日3~4次，体重下降10kg。查体：脉搏90次/分，血压128/90mmHg，皮肤潮湿，双手细颤，双眼突出，甲状腺Ⅱ度弥漫性肿大，可闻及血管杂音，心率104次/分，律不齐，心音强弱不等，腹平软，肝脾肋下未及，双下脚水肿。

98. 为明确诊断，首选的检查是

- A. 甲状腺摄碘率
- B. 血 TSH、T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>
- C. T<sub>3</sub> 抑制试验
- D. TRH 兴奋试验
- E. 红细胞沉降率

99. 本例的心律不齐最可能是

- A. 窦性心律不齐
- B. 阵发性期前收缩
- C. 心房颤动
- D. 心房扑动
- E. 室颤

100. 治疗应首选

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 立即行甲状腺次全切除术
- C. 核素 <sup>131</sup>I
- D. 普萘洛尔
- E. 甲状腺全切除术

(101~103 题共用题干)

患者，女，30岁。近2个月出现颊部蝶形红斑，中度发热，全身肌痛，四肢关节肿痛，口腔溃疡。小便短赤，烦躁多怒，苔白舌红，边有瘀斑，脉细涩。尿常规示红细胞(+)尿蛋白(++)。

101. 最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 骨关节炎
- C. 痛风性关节炎

- D. 系统性红斑狼疮
- E. 急性肾小球肾炎

102. 为缓解病情，应首选

- A. 抗生素
- B. 糖皮质激素
- C. 非甾体抗炎药
- D. 镇痛药
- E. 抗疟药

103. 中医治疗应首选

- A. 犀角地黄汤
- B. 清瘟败毒饮
- C. 济生肾气丸
- D. 葶苈大枣泻肺汤合泻白散
- E. 茵陈蒿汤合柴胡疏肝散

(104~106 题共用题干)

患者，男，30岁。2年前某晚睡眠中突然大叫一声，双眼上翻四肢强直、抽动；伴咬舌，尿失禁，呼之不应，5~6分钟后清醒。自觉头痛，全身疼痛。2年内有3次类似发作，事后不能回忆。

104. 下列哪一种诊断最可能

- A. 癫痫持续状态
- B. 全面性强直-阵挛发作
- C. 肌阵挛发作
- D. 失神发作
- E. 复杂部分性发作

105. 进一步明确诊断，应首选的检查是

- A. 腹部 B 超
- B. 脑电图
- C. 头颅 CT 扫描
- D. 脑血管造影
- E. 肾功能

106. 治疗本病应首选

- A. 苯妥英钠
- B. 丙戊酸钠
- C. 卡马西平
- D. 氯硝西泮
- E. 苯巴比妥

(107~109 题共用题干)

患者，男，54岁。症见半身不遂，舌强语謇，口角喎斜，神志清，兼肢体麻木，手足拘挛，眩晕耳鸣，舌红，苔少，脉细数。

107. 其诊断是

- A. 痉证
- B. 面瘫
- C. 痹证
- D. 中风
- E. 痿证

108. 治疗应选取的经脉是

- A. 督脉、手厥阴及足太阴经穴
- B. 督脉、手厥阴经和十二井穴
- C. 足少阳、足厥阴经及督脉穴
- D. 局部穴、手足阳明经穴
- E. 督脉穴及相应的背俞穴

109. 治疗除水沟、内关穴外，还应选取的主穴是

- A. 三阴交、极泉、尺泽、委中
- B. 足三里、极泉、尺泽、曲池
- C. 三阴交、曲池、尺泽、委中
- D. 足三里、天枢、尺泽、委中
- E. 三阴交、涌泉、尺泽、曲池

#### 四、B1型选择题（110~15.题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

（110~112题共用备选答案）

- A. 气滞血瘀证
- B. 痰湿毒蕴证
- C. 阴虚毒热证
- D. 气阴两虚证
- E. 痰瘀互结证

110. 李某，男，52岁。支气管肺癌手术及化疗后，咳嗽无力，有痰，痰中带血，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，纳呆腹胀，便干，舌质红苔薄，脉细数无力。中医应辨证为

111. 钱某，男，56岁。被诊断为肺癌，现症见刺

激性咳嗽，咯痰不爽，胸胁胀痛，面青唇暗，大便秘结，舌质暗紫有瘀斑，脉弦。中医应辨证为

112. 某女，63岁。诊断肺癌4个月，咳嗽，痰多，气憋胸闷，偶或胸胁疼痛，纳差便澹，身热尿黄，舌质暗，苔厚腻，脉滑数。中医应辨证为

（113~115题共用备选答案）

- A. 痰浊阻肺证
- B. 肺肾气虚证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 痰蒙神窍证
- E. 阳微欲脱证

113. 一肺心病患者，近日病情突然加重，症见：喘逆剧甚，张口抬肩，鼻翼煽动，面色苍白，冷汗淋漓，四肢厥冷，烦躁不安，面色紫暗，舌紫暗，脉微欲绝。中医应辨证为

114. 钱某，女，68岁，患慢阻肺30余年，症见：喘而胸满闷塞，甚则胸盈仰息，咳嗽，痰多黏腻色白，咯吐不利，兼有呕恶，食少，口黏不渴，舌苔白腻，脉滑。中医应辨证为

115. 一呼衰患者，症见：呼吸急促，伴痰鸣，神志恍惚，谵语，烦躁不安，嗜睡，渐至抽搐、昏迷，面色紫绀，舌暗紫，苔白腻，脉滑数。中医应辨证为

（116~117题共用备选答案）

- A. 射干麻黄汤
- B. 定喘汤
- C. 六君子汤
- D. 玉屏风散
- E. 金匱肾气丸

116. 李某，男，56岁，哮喘多年，劳累后哮喘易发，平素息促气短，呼多吸少，动则为甚，形瘦，神疲，心悸，腰酸腿软，面色苍白，畏寒肢冷，舌淡苔白，脉沉细。其治疗宜首选

117. 某女，哮喘6年，近日复发，症见气粗息涌，

咳呛阵作，喉中哮鸣，胸高胁胀，烦闷不安，汗出，口渴喜饮，面赤口苦，咳痰色黄，黏浊稠厚，咯吐不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其治疗宜首选

(118~119 题共用备选答案)

- A. II 度 I 型房室传导阻滞
- B. II 度 II 型房室传导阻滞
- C. m 度房室传导阻滞
- D. 干扰性房室分离
- E. II 度 I 型窦房传导阻滞

118. P~R 逐个延长，R~R 逐次缩短，直至 QRS 波脱落，周而复始

119. P~P 规则，P-R 固定，QRS 波间歇性或周期性脱落

(120321 题共用备选答案)

- A. 重脉
- B. 奇脉
- C. 交替脉
- D. 水冲脉
- E. 缺脉

120. 脉压增大可出现

121. 左室功能不全可出现

(122324 题共用<>案)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 左归丸
- C. 瓜蒌薤白半夏汤
- D. 补阳还五汤
- E. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤

122. 心绞痛气虚血瘀证的治疗方剂是

123. 心绞痛心血瘀阻证的治疗方剂是

124. 心绞痛阴寒凝滞证的治疗方剂是

(125-127 题共用备选答案)

- A. 天麻钩藤饮
- B. 杞菊地黄丸
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 济生肾气丸

E. 血府逐瘀汤

125. 高血压病肝阳上亢证首选方剂是

126. 高血压病痰湿内盛证首选方剂是

127. 高血压病肝肾阴虚证首选方剂是

(128~129 题共用备选答案)

- A. 脾肿大
- B. 腹水
- C. 腹壁静脉曲张
- D. 出血倾向及贫血
- E. 痔静脉曲张

128. 肝硬化代偿功能减退的最突出的体征是

129. 属于肝硬化肝功能减退的临床表现是

(130~131 题共用备选答案)

- A. 早饱
- B. 纳差
- C. 腹胀
- D. 上腹痛
- E. 上腹压痛

130. 进展期胃癌最早出现的症状是

131. 中晚期胃癌最常见的体征为

(132~133 题共用备选答案)

- A. 龛影
- B. 胃黏膜僵直
- C. 钼剂潴留
- D. 痉挛性切迹
- E. 上腹疼痛

132. 消化性溃疡的直接征象是

133. 消化性溃疡的间接征象是

(134~135 题共用备选答案)

- A. AFP
- B. X 线
- C. B 超
- D. CT
- E. MRI

134. 目前肝癌筛查的首选检查方法是

135. 目前肝癌的主要诊断依据是

(136-138 题共用备选答案)

- A. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- B. 红细胞生成素
- C. 替代疗法
- D. 必需氨基酸
- E. 抗生素

136. 慢性肾衰竭营养不良治疗宜选用

137. 慢性肾衰竭氮质血症期, 血压 140/110 mmHg, 治疗宜选用

138. 尿毒症治疗宜选用

(139~142 题共用备选答案)

- A. 香砂六君子汤合当归补血汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤合无比山药丸
- D. 化虫丸合八珍汤
- E. 桃红四物汤

139. 贫血脾肾阳虚证治宜选用

140. 贫血虫积证治宜选用

141. 贫血心脾两虚证治宜选用

142. 贫血脾胃虚弱证治宜选用

(143-144 题共用备选答案)

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 蛛网膜下腔出血

143. 某青年男性, 原有风湿性心脏病, 突然出现中风, 首先应考虑的是

144. 患者, 男, 55 岁, 因在剧烈运动时, 突然出现剧烈头痛, 呕吐, 口舌歪斜, 首先应考虑的是

(145-146 题共用朝答案)

- A. 严谨细致
- B. 紧张有序
- C. 及时准确
- D. 依靠科学
- E. 预防为主

145. 属于突发公共卫生事件应急工作方针的是

146. 属于突发公共卫生事件应急工作原则的是

(147~148 题共用宛答案)

- A. 仿制药品
- B. 残次药品
- C. 特殊管理的药品
- D. 假药
- E. 劣药

147. 麻醉药品是国家明文规定实行

148. 精神药品是国家明文规定实行

(149~150 题共用备选答案)

- A. 以人为本, 践行宗旨
- B. 遵纪守法, 依法执业
- C. 尊重患者, 关爱生命
- D. 廉洁自律, 恪守医德
- E. 优质服务, 医患和谐

149. 弘扬高尚医德, 严格自律, 不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是

150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨, 以病人为中心, 全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是

## 第四单元

### 一、A1型选择题（1~64题）

答题说明：每一道考题下面有A、B、C、D、

E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

- 骨盆骨骼的组成下列哪项正确
  - 一块髓骨、一块尾骨、一块髓骨
  - 一块骶骨、一块尾骨、左右两块髓骨
  - 一块骶骨、两块髓骨
  - 一块腰椎骨、一块骶骨、一块髓骨、一块尾骨
  - 一块尾骨、两块髓骨
- 古籍中有关子宫的名称错误的是
  - 胞宫
  - 女子胞
  - 子处
  - 子门
  - 血室
- 卵子从卵巢排出，在输卵管何处受精
  - 输卵管峡部
  - 输卵管峡部与壶腹部连接处
  - 输卵管伞部
  - 输卵管间质部
  - 子宫腔
- 关于人绒毛膜促性腺激素的叙述，下列哪项正确
  - 绒毛细胞滋养细胞产生
  - 受精后10日开始分泌
  - 有与黄体生成素相似的生物活性
  - 为糖蛋白激素，产后1周内消失
  - 至妊娠14-16天达高峰，持续1-2周后下降
- 做产前检查应常规每周1次的是
  - 孕24周后
  - 孕36周起
  - 孕24~36周
  - 孕30周后
  - 孕16~20周
- 临产的主要标志是
  - 见红，规律宫缩，胎头下降
  - 规律宫缩，破膜，胎头下降
  - 见红，破膜，宫口扩张
  - 规律宫缩，胎头下降，宫口扩张
  - 见红，破膜，规律宫缩
- 正常恶露总量约为
  - 100~200ml
  - 200~400ml
  - 250~500ml
  - 400~800ml
  - 800~1000ml
- 子宫发育不良、不孕、流产等是由于
  - 过度忧虑
  - 营养过剩
  - 脂肪缺乏
  - 维生素E缺乏
  - 严重营养不良
- 脾胃素弱，胃失和降，冲气上逆引起的妊娠恶阻选用的代表方为
  - 理中丸
  - 举元煎
  - 完带汤
  - 四君子汤
  - 苏叶黄连汤
- 妊娠剧吐的主要发病机理是
  - 脾气虚弱，胃失和降
  - 痰浊上扰，胃失和降
  - 冲气上逆，胃失和降
  - 阴血下注，阳气偏亢
  - 肝胃不和，胃失和降
- 异位妊娠的基本病机是
  - 湿热下注

- B. 肾气亏虚  
C. 少腹血瘀实证  
D. 瘀血阻滞冲任胞宫  
E. 冲任不固，带脉失约
12. 尿路感染常见病机不包括  
A. 阴虚火旺  
B. 心火偏亢  
C. 肾阳衰微  
D. 膀胱气化失司  
E. 湿热下注膀胱
13. 软产道异常不包括  
A. 外阴水肿  
B. 阴道纵隔肿瘤  
C. 宫颈坚韧  
D. 宫颈瘢痕  
E. 骨盆入口平面狭窄
14. 可提示胎盘功能不良的是  
A. 尿雌三醇 ( $E_3$ )  $> 10\text{mg}/24\text{h}$   
B. 尿中雌激素/肌酐比值  $> 10$   
C. 血清胎盘生乳素  $> 4\text{mg}/\text{L}$   
D. 连续测定尿雌三醇下降  $> 30\%$   
E. 妊娠特异 S 糖蛋白 (SP1)  $> 100\text{mg}/\text{L}$
15. 产后出血的常见病因为  
A. 气滞和血瘀  
B. 气虚和血瘀  
C. 气脱和血瘀  
D. 气滞和血虚  
E. 气虚和血虚
16. 脐带异常的类型有  
A. 脐带先露  
B. 脐带缠绕  
C. 脐带打结  
D. 脐带扭转  
E. 以上都是
17. 属于产后关节痛的中医范畴的是  
A. 产后出血  
B. 产后发热  
C. 产后血晕  
D. 产后身痛  
E. 产后眩晕
18. 下列关于女性生殖道的自然防御功能，错误的是  
A. 两侧大阴唇自然合拢，可防止外界微生物的污染  
B. 阴道口闭合，阴道前后壁紧贴，可防止外界污染  
C. 阴道分泌物可维持中性粒细胞活性，防止细菌侵入阴道黏膜  
D. 输卵管黏膜上皮细胞的纤毛向宫腔方向摆动，有利于阻止病原体的侵入  
E. 宫颈管分泌的黏液栓内含有乳铁蛋白、溶菌酶，可抑制细菌侵入子宫内膜
19. 月经病的治疗原则是  
A. 治本调经  
B. 清热利湿  
C. 化瘀止痛  
D. 补肾调经  
E. 清热解毒
20. 宫颈癌早期临床特点是  
A. 绝经后阴道大量出血  
B. 接触性出血  
C. 大量脓血性恶臭白带  
D. 下肢肿痛  
E. 输尿管上段扩张
21. 下列诊断依据哪项对葡萄胎最有意义  
A. 子宫妊娠 5 个月大小，摸不到胎体  
B. B 超示落雪状图像  
C. 血 HCG  $> 100\text{KU}/\text{L}$   
D. 阴道排出水泡状组织  
E. 停经后阴道流血
22. 最容易被子宫内膜异位症侵犯的器官是  
A. 卵巢  
B. 输卵管  
C. 肠管  
D. 输尿管

- E. 膀胱
23. 小儿常用内治法中消食导滞法之消食化积常用方为
- A. 消乳丸  
B. 保和丸  
C. 健脾丸  
D. 枳实导滞丸  
E. 资生健脾丸
24. 小儿常用内治法中利水消肿法之阳水常用方剂是
- A. 实脾饮  
B. 真武汤  
C. 五苓散  
D. 十灰散  
E. 防己黄芪汤
25. 以下各期中死亡率最高的是
- A. 学龄期  
B. 学龄前期  
C. 幼儿期  
D. 新生儿期  
E. 婴儿期
26. 正常小儿前囟关闭的年龄是
- A. 6~8个月  
B. 8~10个月  
C. 10~12个月  
D. 12~18个月  
E. 16~24个月
27. 小儿的舒张压正常值应为收缩压的
- A. 1/3  
B. 1/4  
C. 1/5  
D. 2/3  
E. 1/6
28. 小儿时期最常见的两脏疾病是
- A. 肺脾  
B. 肝肾  
C. 心肾  
D. 肝脾  
E. 肝肺
29. 重度脱水时患儿失水量约为体重的
- A. 5%以下  
B. 8%左右  
C. 5%~10%  
D. 10%左右  
E. 10%以上
30. 母乳喂养早吸吮的最合理时间是
- A. 出生后30分钟内  
B. 出生后1~2小时  
C. 出生后2~6小时  
D. 出生后6~24小时  
E. 出生后24~48小时
31. 小儿腹部叩之音浊,按之有波动感,脐突,应首先考虑的是
- A. 气滞  
B. 虫症  
C. 食积  
D. 疳证  
E. 腹水
32. 小儿应用脉诊的最早年龄是
- A. 1周岁  
B. 2周岁  
C. 3周岁  
D. 4周岁  
E. 7周岁
33. 古医家认为诊断小儿疾病最重要的是
- A. 按诊  
B. 望诊  
C. 闻诊  
D. 问诊  
E. 切诊
34. 察目应首选观察的项目是
- A. 眼神



- B. 瞳孔
- C. 眼睑
- D. 巩膜
- E. 结膜

35. 下列哪项不属于小儿反复呼吸道感染的病因

- A. 喂养不当，调户失宜
- B. 少见风日，不耐风寒
- C. 湿蕴脾胃，熏蒸肝胆

- D.用药不当,损伤正气  
E.正虚邪伏,遇感乃发
- 36.小儿时邪感冒的治法宜选用
- A.辛温解表  
B.辛凉解表  
C.清暑解表  
D.清热解毒  
E.辛凉解毒
- 37.不属于新生儿黄疸之寒湿阻滞证的证候特征的是
- A.颜色鲜明  
B.目黄身黄  
C.神疲倦怠  
D.四肢欠温  
E.舌淡苔白腻
- 38.新生儿硬肿症寒凝血滞证治疗首选方是
- A.四逆汤  
B.参附汤  
C.金匱肾气丸  
D.当归四逆汤  
E.血府逐瘀汤
- 39.病毒性心肌炎的中医发病外因是
- A.正气亏虚  
B.风热邪毒  
C.麻毒时邪  
D.暑湿疫毒  
E.温热邪毒
- 40.治疗病毒性心肌炎湿热侵心证的首选方剂是
- A.生脉散  
B.银翘散  
C.甘麦大枣汤  
D.复脉汤  
E.葛根黄芩黄连汤
- 41.引起小儿腹泻的病因不包括的是
- A.感受外邪  
B.饮食所伤  
C.脾胃虚弱  
E.肺脾气虚
- 42.下列各项中,与水肿的发生密切相关的脏腑是
- A.心肝脾  
B.心脾肾  
C.肺脾肾  
D.心脾肺  
E.心肺肾
- 43.下述病史与急性肾小球肾炎关系最为密切的是
- A.1~3周前上呼吸道感染  
B.3天前腹泻  
C.2周前腰部外伤史  
D.3个月前有猩红热史  
E.2个月前有水痘病史
- 44.治疗小儿肾病综合征中湿浊证的首选方剂是
- A.温胆汤  
B.六味地黄丸  
C.知柏地黄丸  
D.桃红四物汤  
E.防己黄芪汤
- 45.手少阳三焦经的主治特点是
- A.前头、鼻、口、齿病  
B.前头、口齿、胃肠病  
C.侧头、胁肋病  
D.后头、肩胛病、神志病  
E.后头、背腰痛
- 46.中极穴是以下哪个脏腑之募穴
- A.大肠  
B.小肠  
C.膀胱  
D.肾  
E.肝
- 47.胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是
- A.4寸  
B.6寸  
C.8寸

D.脾肾阳虚

D. 9寸

## E. 12 寸

48. 善于治疗无脉症的腧穴是
- 孔最
  - 尺泽
  - 列缺
  - 太渊
  - 少商
49. 下列腧穴中, 可以治疗胆道蛔虫症的是
- 商阳
  - 合谷
  - 阳溪
  - 手三里
  - 迎香
50. 下列何经循行“绕肩胛”
- 手阳明大肠经
  - 足太阳膀胱经
  - 手太阳小肠经
  - 手少阳三焦经
  - 足少阳胆经
51. 下列腧穴中, 常用于治疗呃逆症的是
- 睛明
  - 攒竹
  - 承泣
  - 四白
  - 印堂
52. 足少阴肾经在腹部的循行是旁开前正中线
- 0.5 寸
  - 1 寸
  - 2 寸
  - 4 寸
  - 6 寸
53. 针刺环跳穴的最佳体位是
- 坐位
  - 站位
  - 仰卧位
  - 俯卧位
  - 侧卧位
54. 下列哪项不是大椎穴的主治病证
- 热病、疟疾
  - 骨蒸潮热
  - 癫狂痫、小儿惊风
  - 腹泻、痢疾、脱肛
  - 风疹、瘰疬
55. 有关晕针的处理方法, 叙述不正确的是
- 立即停止针刺, 将针全部起出
  - 使患者平卧, 头部抬高
  - 宽衣解带, 注意保暖
  - 予以饮温开水或糖水
  - 可刺人中、素髌、内关、足三里等穴
56. 属于行针基本手法的是
- 循法
  - 弹法
  - 刮法
  - 提插法
  - 震颤法
57. 以下哪项不是三阴交穴的主治病证
- 脾胃虚弱证
  - 妇产科病证
  - 生殖泌尿系统病证
  - 心悸、失眠
  - 阳虚诸证
58. 足太阴脾经与足阳明胃经的循行交接部位是
- 足大趾内端
  - 足大趾外端
  - 足二趾内端
  - 足二趾外端
  - 足三趾内端
59. 以下哪穴不是八会穴
- 阳陵泉
  - 阴陵泉
  - 绝骨
  - 大杼
  - 章门
60. 在胸部, 距前正中线 4 寸循行的经脉是
- 足太阴脾经

- B. 手厥阴心包经  
C. 足少阴肾经  
D. 足阳明胃经  
E. 手太阴肺经
61. 下列腧穴中, 治疗急性吐泻有速效的是  
A. 委阳  
B. 委中  
C. 承山  
D. 飞扬  
E. 昆仑
62. 下列腧穴中, 治疗汗证首选  
A. 复溜  
B. 然谷  
C. 太溪  
D. 阴谷  
E. 大钟
63. 太冲穴的定位是  
A. 足背, 当第1、2趾间的趾蹼缘上方纹头处  
B. 足背, 当第2、3趾间的趾蹼缘上方纹头处  
C. 足背, 第1、2跖骨结合部之前凹陷中  
D. 足背, 第2、3跖骨结合部之前凹陷中  
E. 内踝前1寸, 胫骨前肌腱内缘凹陷中
64. 对奇经八脉的叙述, 下列哪项是错误的  
A. 阳维脉总督六阳  
B. 阳跷脉调节肢体运动  
C. 冲脉涵蓄十二经气血  
D. 任脉总任六阴经  
E. 跷脉司眼睑开合
- 二、A2型选择题(65-100题)
- 答题说明: 每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。
65. 患者, 女, 31岁, 以往有多次刮宫史, 妊娠33周出现无诱因、无痛性反复阴道流血, 该患者可考虑诊断为  
A. 胎膜早破  
B. 胎动不安  
C. 前置胎盘  
D. 异位妊娠  
E. 胎盘早剥
66. 患者, 女, 29岁, 妊娠期间身目俱黄, 色鲜明如橘子色, 右胁胀痛, 恶心厌食, 口苦咽干, 胸胁痞满, 倦怠乏力, 尿黄便坚; 舌质红, 苔黄腻, 脉弦滑, 治疗首选  
A. 胃苓汤  
B. 逍遥散  
C. 茵陈蒿汤  
D. 犀角地黄汤  
E. 黄连解毒汤
67. 初孕妇, 28岁, 妊娠34周, 睡眠中突然出现大量阴道流液, 起床后又有持续流液, 因胎膜早破收入院。入院后诊断胎膜早破的检查方法有  
A. 阴道酸碱度检查  
B. 阴道液涂片检查  
C. 羊膜镜检查  
D. 超声检查  
E. 以上都有
68. 患者, 女, 27岁, 产后恶露量多, 色淡红, 质稀, 无臭气, 面色觥白, 神疲懒言, 四肢无力, 小腹空坠; 舌淡, 苔薄白, 脉细弱。选用的治法为  
A. 补脾益气, 固冲摄血  
B. 养阴清热, 安冲止血  
C. 活血化瘀, 调冲止血  
D. 清热解毒, 凉血化瘀  
E. 清营解毒, 散瘀泄热
69. 患者, 女, 28岁, 月经干净后开始出现外阴奇痒, 灼热疼痛, 带下量多, 色黄气秽, 局部皮肤黏膜粗糙肥厚或破损溃疡, 渗流黄水, 胸闷烦躁, 口苦口干, 没赤便秘; 舌红, 苔黄腻, 脉弦数。主方选用

- A. 龙胆泻肝汤  
B. 五味消毒饮  
C. 易黄汤  
D. 革痛胜湿汤  
E. 二妙散
70. 经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡质稀，神疲乏力，下腹积块，腹腔镜检查诊断为子宫内膜异位症，首选方剂为
- A. 少腹逐瘀汤  
B. 膈下逐瘀汤  
C. 血府逐瘀汤  
D. 桃红四物汤  
E. 理冲汤
71. 一农妇，诉阴道脱出物3年，查体：宫颈已脱出至阴道口外，宫体在阴道内，双附件无异常，诊断为子宫脱垂。其程度应属于
- A. I度轻  
B. I度重  
C. II度轻  
D. II度重  
E. m度
72. 患者，女，结婚4年未孕，月经38~50天一行，量少色淡，面色晦暗，腰酸腿软。舌淡红，苔薄白，脉沉细，检查子宫发育欠佳。治宜
- A. 滋阴养血，调冲益精  
B. 补肾益精，养血调经  
C. 疏肝解郁，养血理脾  
D. 燥湿化痰，理气调经  
E. 温肾养血益气，调补冲任
73. 患者正常宫内妊娠45天，曾多次人工流产，瘢痕子宫，要求终止妊娠，对手术流产恐惧。应采取的措施是
- A. 负压吸引术  
B. 药物流产  
C. 钳刮术  
D. 手术流产  
E. 输卵管绝育术
74. 患者，女，人工流产术后3周，阴道出血时多时少，色暗红，有时夹血块，腹痛，B超提示：宫腔内回声不均。首先考虑的诊断为
- A. 子宫穿孔  
B. 术后子宫内膜炎  
C. 子宫收缩欠佳  
D. 吸宫不全  
E. 漏吸
75. 女性，28岁，孕4产1，于产后1年停哺乳，月经来潮，月经干净3天后放置宫内节育器顺利。以下哪项不属于放置宫内节育器的并发症
- A. 节育器嵌顿  
B. 节育器移位  
C. 月经过多、经期延长  
D. 节育器下移  
E. 带器妊娠
76. 女性，23岁，新婚，想半年后要孩子，首先应选用哪种避孕方法最适宜
- A. 宫内节育器  
B. 口服避孕药  
C. 避孕套  
D. 皮下埋植避孕  
E. 阴道隔膜
77. 小儿，男，3岁，站位测身高96cm，体重14kg。评价其生长发育状况最恰当的是
- A. 正常范围  
B. 身长体重低于正常  
C. 身长正常，体重低于标准  
D. 体重正常，身长低于标准  
E. 身长体重超过正常
78. 患儿，女，1岁。轻咳无热，鼻流清涕，苔白而润。应首先考虑的是
- A. 外感风寒  
B. 外感风热  
C. 乳食内停  
D. 胃肠积冷  
E. 风热闭肺

79. 患儿，女，1岁。高热咽痛，咽部充血，软腭上有2~4mm大小的疱疹，疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。应首先考虑的是
- 疱疹性咽峡炎
  - 咽结合膜热
  - 支气管炎
  - 支气管肺炎
  - 急性化脓性扁桃体炎
80. 患儿，男，2岁。鼻塞流涕，咽部充血，兼见咳嗽较剧，咳声重浊，喉中痰鸣，舌苔厚腻。其诊断是
- 感冒夹滞
  - 感冒夹惊
  - 感冒夹痰
  - 风寒感冒
  - 时行感冒
81. 患儿，女，1岁。发热有汗，鼻塞流涕，咽部充血，口渴，苔薄黄，兼见惊惕啼叫，睡卧不宁，舌质红，脉浮弦。其诊断是
- 感冒夹食滞
  - 感冒夹惊
  - 感冒夹痰
  - 风寒感冒
  - 时行感冒
82. 患儿，男，3岁，症见：发热咳嗽流涕1天，伴有脱腹胀满，口气秽浊。大便酸臭，小便短黄，舌苔厚腻，脉滑。其中医辨证为
- 风热感冒
  - 风寒感冒
  - 时邪感冒
  - 暑邪感冒
  - 感冒夹滞
83. 患儿，男，1岁，诊断为肺炎，症见：突然面色苍白，口唇紫绀，四肢厥冷，呼吸困难，脉细弱而数，指纹青紫达命关。其证型是
- 痰热闭肺证
  - 风热闭肺证
  - 风寒闭肺证
  - 邪陷厥阴证
  - 心阳虚衰证
84. 患儿，男，6岁。患病毒性心肌炎6个月，面色晦暗，胸闷憋气，时觉胸前区刺痛，时欲呕恶，舌质紫暗，苔白腻，脉滑。其中医证型是
- 风热犯心证
  - 湿热侵心证
  - 气阴亏虚证
  - 痰瘀阻络证
  - 心阳虚弱证
85. 患儿，男，8岁，心悸不宁，胸闷憋气，胸前区痛如针刺，面色晦暗，唇甲青紫，舌质紫暗有瘀点，苔腻，脉滑。治法宜
- 益气养阴，宁心复脉
  - 清热解毒，宁心复脉
  - 清热化湿，宁心复脉
  - 温振心阳，宁心复脉
  - 豁痰化瘀，宁心通络
86. 患儿，男，5岁，病毒性心肌炎病史3个月，心悸不宁，活动后明显，少气懒言，神疲倦怠，烦热口渴，舌光红少苔，脉细数。其治法是
- 清热解毒，养阴活血
  - 益气养阴，宁心复脉
  - 清热化湿，宁心复脉
  - 扶正固本，宁心复脉
  - 清热解毒，化瘀通络
87. 患儿，男，9岁。患病毒性心肌炎。寒热起伏，胸闷憋气，肌肉酸痛，脘痞腹泻，恶心想吐，舌质红，苔黄腻，脉濡数。其中医证型为
- 风热犯心证
  - 湿热侵心证
  - 热实结胸证
  - 心脉痹阻证
  - 痰火扰心证

88. 患儿，女，7岁。2周前曾有感冒，现发热，低热绵延，鼻塞流涕，咽红肿痛，肌痛肢楚，胸闷胸痛舌红苔薄，脉数。诊断为病毒性心肌炎，中医辨证为风热犯心证，治疗应首选的方剂是
- 银翘散
  - 失笑散
  - 生脉散
  - 葛根黄芩黄连汤
  - 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
89. 某男，70岁，大便艰涩，排出困难，腹中冷痛，面色胱白，四肢不温，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗本病，除主穴外，还应加用
- 合谷、内庭
  - 太冲、中脘
  - 脾俞、气海
  - 神阙、关元
  - 足三里、三阴交
90. 某女，53岁。2小时前突然发现右半身麻木，口角歪斜，言语不利。现神志清，头晕目眩，苔白腻，脉弦滑。其诊断是
- 中经络，风痰阻络证
  - 中经络，肝阳暴亢证
  - 中经络，阴虚风动证
  - 中脏腑，气虚血瘀证
  - 中脏腑，阴虚风动证
91. 某男，75岁，咽喉微感疼痛，色暗红，入夜尤甚。针灸治疗主穴选取
- 尺泽、合谷、少商、照海
  - 关冲、合谷、少商、列缺
  - 关冲、厉兑、鱼际、内庭
  - 太溪、照海、鱼际、列缺
  - 太溪、曲池、鱼际、合谷
92. 患者，男，48岁。头胀痛近2年，时作时止，伴目眩易怒，面赤口苦，舌红苔黄，脉弦数。治疗除取主穴外，还应选用
- 曲池、大椎
  - 头维、阴陵泉
  - 风门、列缺
  - 太溪、太冲
  - 中脘、丰隆
93. 患者，男，42岁。哮喘反复发作5年，本次发作喘促不能平卧，咳嗽清稀，无汗，头痛，脉浮紧。治疗应首选
- 中府、列缺、肺俞、尺泽
  - 肺俞、风门、丰隆、太渊
  - 膻中、太渊、太溪、肾俞
  - 天突、定喘、尺泽、膻中
  - 膏肓、肾俞、太溪、丰隆
94. 患者，男，35岁。目赤肿痛，羞明，流泪，眵多。伴头痛发热，苔微黄，脉浮数。治疗除取主穴外，还应选用的是
- 少商、外关
  - 行间、侠溪
  - 太渊、风池
  - 太溪、鱼腰
  - 外关、四白
95. 患者，男，50岁。腰部疼痛10余年，有劳伤史，久坐加重，病处固定不移。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是
- 膈俞
  - 肾俞
  - 膏肓
  - 腰阳关
  - 环跳
96. 某女，36岁，经血淋漓不净30天，血色淡，质稀薄，伴面色萎黄，神疲肢倦，舌淡，苔白，脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外，应加取
- 肾俞、命门
  - 然谷、太溪
  - 百会、脾俞
  - 隐白、血海
  - 隐白、地机
97. 患者，女，21岁。食鱼虾后皮肤出现片状风



团，瘙痒异常。治疗取神阙穴，所用的方法是

- A. 针刺
- B. 隔盐灸
- C. 拔罐
- D. 隔姜灸
- E. 艾条灸

98. 患者，男，37岁，右上腹痛，阵发性加剧，并向右肩部放射，伴有恶心、呕吐，针灸取穴除阳陵泉、日月外，还可用

- A. 胆囊穴、胆俞
- B. 阑尾穴、中脘
- C. 胆囊穴、京门
- D. 中脘、天枢
- E. 梁丘、太冲

99. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

100. 患者，女性，50岁。月经紊乱，潮热出汗，心悸，情绪不稳定，兼头晕耳鸣，失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，口干，小便黄，舌红，苔少，脉数者，治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 行间、侠溪
- B. 太溪、太冲
- C. 膻中、期门
- D. 照海、阴谷
- E. 三阴交、太溪

### 三、A3型选择题（101~108题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例

下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

（101~103题共用题干）

患者，女，28岁，产后小便不通，小腹胀急疼痛，腰膝酸软，面色晦暗；舌淡，脉沉细迟弱。

101. 判断此患者的证型为

- A. 肺脾气虚证
- B. 肾阳亏虚证
- C. 血瘀证
- D. 气滞证
- E. 肾气亏虚证

102. 选用的治法是

- A. 益气生津，宣肺利水
- B. 补肾温阳，化气利水
- C. 养血活血，祛瘀利尿
- D. 理气行滞，行水利尿
- E. 温阳化气，补肾固脬

103. 选用的方剂为

- A. 补气通脬饮
- B. 济生肾气丸
- C. 加味四物汤
- D. 木通散
- E. 肾气丸

（104~106题共用题干）

患者，女，28岁。外阴肿痛瘙痒伴有灼热感，带下增多，色黄质稠，气味秽臭，伴烦躁易怒，口干口苦；舌苔黄腻，脉弦数。

104. 判断此患者的证型为

- A. 湿热下注证
- B. 湿毒浸渍证
- C. 肝肾阴虚证
- D. 热毒蕴结证
- E. 寒凝痰瘀证

105. 选用的治法是

- A. 温经散寒，涤痰化瘀

- B. 清热解毒, 消肿散结
- C. 滋肾降火, 调补肝肾
- D. 清热解毒, 除湿止痒
- E. 清热利湿, 杀虫止痒

106. 其治疗首选方为

- A. 革藓渗湿汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五味消毒饮
- D. 大黄牡丹汤
- E. 仙方活命饮

(107309 题共用题干)

患者, 女, 27 岁, 西医诊断为功能失调性子宫出血。症见经间期少量出血, 血色紫暗, 有块, 小腹疼痛拒按; 舌紫暗, 脉涩有力。

107. 判断此患者的证型为

- A. 血瘀证
- B. 血热证
- C. 肾虚证
- D. 脾虚证
- E. 气虚证

108. 选用的治法是

- A. 滋阴清热, 止血调经
- B. 活血化瘀, 理血归经
- C. 温肾固冲, 止血调经
- D. 补气摄血, 固冲调经
- E. 补气升提, 固冲止血

109. 治疗首选方剂是

- A. 归脾汤
- B. 桃红四物汤合失笑散
- C. 清肝止淋汤
- D. 加减一阴煎
- E. 逐瘀止血汤

(110~112 题共用题干)

患儿, 男, 8 岁, 西医诊断为病毒性心肌炎, 临床可见: 寒热起伏, 全身肌肉酸痛, 恶心呕吐, 腹痛泄泻, 心悸胸闷, 肢体乏力, 舌质红, 苔黄腻, 脉濡数或结代。

110. 中医辨证是

- A. 风热扰心
- B. 湿热侵心
- C. 气阴亏虚
- D. 心阳虚弱
- E. 痰瘀阻络

111. 中医治法是

- A. 清热解毒, 宁心复脉
- B. 清热化湿, 宁心复脉
- C. 益气养阴, 宁心复脉
- D. 温振心阳, 宁心复脉
- E. 豁痰化瘀, 活血通络

112. 中医选方是

- A. 银翘散
- B. 葛根黄芩黄连汤
- C. 炙甘草汤合生脉散
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散

(113315 题共用题干)

患儿, 女, 7 岁, 胃脘部灼痛拒按, 胸腹痞满, 口黏纳呆, 甚则呕吐, 吐物酸臭, 头身重着, 口干尿赤, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数, 西医诊断为胃炎

113. 中医辨证为

- A. 乳食积滞
- B. 寒邪犯胃
- C. 湿热中阻
- D. 肝气犯胃
- E. 脾胃虚寒

114. 中医治法是

- A. 消食消乳, 和胃止痛
- B. 温散寒邪, 和胃止痛
- C. 清热化湿, 理气止痛
- D. 疏肝理气, 和胃止痛
- E. 温中健脾, 益气和胃

115. 中医选方是

- A. 伤食用保和丸加减, 伤乳用消乳丸
- B. 香苏散和良附丸
- C. 黄连温胆汤

- D. 柴胡疏肝散  
E. 黄芩建中汤

(116~118 题共用题干)

足月女婴，25 天，出生后 2 周出现身黄，目黄，其色晦暗，持续不退，精神萎靡，四肢欠温，不欲吮乳，时时啼哭，大便澹薄，或便色灰白，舌苔白腻，指纹色淡。

116. 中医辨病为

- A. 病理性黄疸  
B. 生理性黄疸  
C. 新生儿败血症  
D. 新生儿溶血症  
E. 阻塞性黄疸

117. 中医治法是

- A. 清热利湿退黄  
B. 温中化湿退黄  
C. 行气化瘀消积  
D. 平肝息风，利湿退黄  
E. 大补元气，温阳固脱

118. 中医选方是

- A. 茵陈蒿汤加减  
B. 茵陈理中汤加减  
C. 血府逐瘀汤加减  
D. 羚角钩藤汤加减  
E. 茵陈四苓散加减

#### 四、B1 型选择题 ( 們 9~150 题 )

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(119-120 题共用朝答案)

- A. 血热  
B. 气滞  
C. 痰湿  
D. 肝郁  
E. 血瘀

119. 月经周期提前多为

120. 月经周期先后无定期多为

(121~122 题共用备选答案)

- A. 呕吐、反酸、自汗  
B. 呕吐、盗汗、泄泻  
C. 呕吐、眩晕、盗汗  
D. 病痞、病郁冒、大便难  
E. 冲心、冲胃、冲肺

121. 产后三急是指

122. 产后三病是指

(123-124 题共用紮答案)

- A. 归肾丸合二至丸  
B. 归脾汤  
C. 黑逍遥散  
D. 右归丸  
E. 人参养荣汤

123. 治疗外阴硬化性苔癣血虚化燥证首选

124. 治疗外阴硬化性苔癣脾肾阳虚证首选

(125~126 题共用朝答案)

- A. 完带汤  
B. 内补丸  
C. 龙胆泻肝汤  
D. 黄连解毒汤  
E. 止带方合五味消毒饮

125. 治疗子宫颈炎热毒蕴结证首选

126. 治疗子宫颈炎湿热下注证首选

(127-128 题共用备选答案)

- A. 膈下逐瘀汤  
B. 少腹逐瘀汤  
C. 清热调血汤  
D. 黄芩建中汤  
E. 调肝汤

127. 痛经寒湿凝滞证选用的方剂是

128. 痛经湿热瘀阻证选用的方剂是

(129-130 题共用备选答案)

- A. 清心开窍  
B. 清热解毒，凉血化瘀  
C. 清营解毒，散瘀泄热  
D. 养阴清热，安冲止血  
E. 活血化瘀，调冲止血

129. 产后高热汗出，烦躁不安，皮肤斑疹隐隐，

选用的治法为

130. 产后高热不退，神昏谵语，面色苍白，四肢厥冷，选用的治法为

(131332 题共用备选答案)

- A. 涤痰通络
- B. 泻火涤痰
- C. 涤痰开窍
- D. 化痰通窍
- E. 健脾化痰

131. 病毒性脑炎痰热壅盛证的治法宜选用

132. 病毒性脑炎痰蒙清窍证的治法宜选用

(133-134 题共用备选答案)

- A. 涤痰汤
- B. 镇惊丸
- C. 六君子汤
- D. 指迷茯苓丸
- E. 河车八味丸

133. 脾虚痰盛型癫痫治疗首选方剂是

134. 脾肾两虚型癫痫治疗首选方剂是

(135-136 题共用备选答案)

- A. 清肝泻火，息风镇惊
- B. 泻火涤痰，清心安神
- C. 益气健脾，平肝息风
- D. 滋阴潜阳，柔肝息风
- E. 健脾养心，益气安神

135. 阴虚风动型多发性抽动症的治法为

136. 脾虚肝旺型多发性抽动症的治法为

(137-138 题共用备选答案)

- A. 清肝泻火，息风镇惊
- B. 泻火涤痰，清心安神
- C. 益气健脾，平肝息风
- D. 滋阴潜阳，柔肝息风
- E. 健脾养心，益气安神

137. 儿童多发性抽动症肝亢风动证的治法宜选用

138. 儿童多发性抽动症痰火扰心证的治法宜选

用

(139-140 题共用备选答案)

- A. 清热化痰，宁心安神
- B. 滋水涵木，平肝潜阳
- C. 益气健脾，平肝息风
- D. 滋阴潜阳，柔肝息风
- E. 健脾养心，益气安神

139. 小儿注意力缺陷多动障碍肾虚肝亢证的治法为

140. 小儿注意力缺陷多动障碍心脾两虚证的治法为

(141342 题共用备选答案)

- A. 温补脾肾，益精养血
- B. 健运脾胃，益气养血
- C. 补脾养心，益气生血
- D. 滋养肝肾，益精生血
- E. 滋水涵木，益气生血

141. 营养性缺铁性贫血脾肾阳虚证治法宜选用

142. 营养性缺铁性贫血心脾两虚证治法宜选用

(143-144 题共用备选答案)

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

143. 足三阳经的循行走向规律是

144. 手三阴的循行走向规律是

(145-146 题共用备选答案)

- A. 手阳明大肠经
- B. 足阳明胃经
- C. 足太阳膀胱经
- D. 手太阳小肠经
- E. 足少阳胆经

145. 起于目内眦的经脉是

146. 起于目锐眦的经脉是

(147-148 题共用备选答案)

- A. 胸痛

- B. 落枕
- C. 腕痛
- D. 头痛
- E. 呃逆

147. 在头部,当眉梢与目外眦之间,向后约一横指凹陷处的腧穴善于治疗
148. 在手背侧,当第2、第3掌骨间,掌指关节后约0.5寸处的腧穴善于治疗

(149~150题共用备选答案)

- A. 癰疽、初起的肿疡
  - B. 哮喘、肺痔、癰疽
  - C. 吐泻并作、中风脱证
  - D. 因寒而致的呕吐、腹痛
  - E. 命门火衰而致的阳痿、早泄
149. 隔蒜灸的适应病证是
150. 隔姜灸的适应病证是