

2 0 2 1 中 医 执 业 医 师 考 试

# 模拟密押卷

2021 年

中医执业医师资格

考试专用

## 第一单元

### 一、A1 型选择题 (1 ~ 85 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 小便浑浊、泄泻、下痢、妇女带下，说明了湿邪

- A. 湿性趋下
- B. 湿性黏滞
- C. 湿性重浊
- D. 湿为阴邪
- E. 易阻气机

2. 津液的丢失往往伴有气的损耗，说明二者的关系是

- A. 气能行津
- B. 气能摄津
- C. 气能生津
- D. 津能生气
- E. 津能载气

3. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A. 上午
- B. 中午
- C. 下午
- D. 前半夜
- E. 后半夜

4. 阴液不足，日久不愈，影响阳气化生，引起阳也不足的病理变化是

- A. 阴偏衰
- B. 阳偏衰
- C. 阳损及阴
- D. 阴损及阳
- E. 阴阳互损

5. “阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”，主要说明阴阳之间存在何种关系

- A. 对立制约

- B. 互根互用
- C. 互为消长
- D. 平衡协调
- E. 互相转化

6. 下列情志相胜关系中，哪一项是错误的

- A. 怒胜思
- B. 思胜恐
- C. 恐胜喜
- D. 喜胜悲
- E. 惊胜怒

7. 具有“主治节”功能的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

8. 具有“水之上源”之称的脏是

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

9. 六腑中具有“太仓”之称的是

- A. 小肠
- B. 三焦
- C. 脾
- D. 大肠
- E. 胃

10. 促进机体滋润、宁静、成形和制约阳热功能的物质是

- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴
- D. 肾阳
- E. 肾血

11. 有君相安位关系的两脏是

- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝

12. “中精之腑”指

- A. 胆
- B. 胃

- C. 大肠  
D. 小肠  
E. 三焦
13. 具有“喜润恶燥”生理特性的是  
A. 胆  
B. 胃  
C. 小肠  
D. 大肠  
E. 膀胱
14. 何脏在病理状态下会出现“清气在下，则生飧泄”  
A. 肝  
B. 心  
C. 脾  
D. 肺  
E. 肾
15. 脑主司感觉运动，有赖于  
A. 髓充养  
B. 营血充养  
C. 肾精充养  
D. 肝血充养  
E. 脾精充养
16. 脉象分阴阳，属于阴的脉象是  
A. 浮  
B. 大  
C. 迟  
D. 滑  
E. 洪
17. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是  
A. 精  
B. 气  
C. 血  
D. 津  
E. 液
18. 与生长发育有关的气是  
A. 元气  
B. 宗气  
C. 营气  
D. 卫气  
E. 脏腑之气
19. 体质的构成正确的是  
A. 形态结构、生理机能、心理状态  
B. 社会因素、心理因素、机体状态  
C. 先天因素、后天因素、个人因素  
D. 形态结构、心理机能、后天因素  
E. 社会因素、自然因素、个人因素
20. 经筋的生理功能是  
A. 主蓄积渗灌气血  
B. 主联络机体内外  
C. 主运行气血津液  
D. 主束骨而利机关  
E. 主经气的感应传导
21. 关于体质的特点，说法错误的是  
A. 先天遗传性  
B. 差异多样性  
C. 不稳定性  
D. 群类趋同性  
E. 后天可调性
22. 内生“五邪”包括  
A. 内风、内暑、内湿、内燥、内火  
B. 内风、内寒、内暑、内燥、内火  
C. 内风、内寒、内湿、内燥、内火  
D. 内风、内寒、内湿、内暑、内热  
E. 内风、内寒、内湿、内燥、内暑
23. 疾病发生的发病基础是  
A. 邪气亢盛  
B. 正气受损  
C. 正气虚  
D. 邪气损正  
E. 正气抗邪
24. 《素问·宣明五气》中说法错误的是  
A. 久立伤骨  
B. 久行伤筋  
C. 久卧伤气  
D. 久坐伤精  
E. 久视伤血
25. 风性善动不居，游走不定，体现风性  
A. 为百病之长  
B. 轻扬开泄  
C. 善行而数变  
D. 主动  
E. 以上皆非
26. 《素问·阴阳应象大论》所述“浊阴走五藏”中的“浊阴”是指  
A. 饮食物的糟粕和尿液  
B. 水谷之精气  
C. 藏于五脏的精血津液  
D. 阴液

- E. 痰饮等病理产物
27. 《素问·评热病论》中“劳风”的治法宜
- A. 表里刺之  
B. 以救俯仰  
C. 饮之服汤  
D. 调其虚实  
E. 和其顺逆
28. 下列病证除哪项外，均可用麻黄汤治疗
- A. 太阳与阳明合病，喘而胸满者  
B. 太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在者  
C. 太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者  
D. 伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗  
E. 伤寒脉浮紧，不发汗，因致衄者
29. 当归四逆汤证之“手足寒”，其病机是
- A. 血虚寒厥，气血不畅  
B. 气虚生寒，血脉不畅  
C. 血液不足，血脉不畅  
D. 气滞血瘀，血脉不畅  
E. 阳虚有寒，四肢不温
30. 患者喘息咳唾，胸背痛，短气，右脉沉迟，左脉弦急，治宜
- A. 栝蒌薤白白酒汤  
B. 栝蒌薤白半夏汤  
C. 枳实薤白桂枝汤  
D. 橘枳姜汤  
E. 薏苡附子散
31. 关于越婢汤的主症，以下哪项不确切
- A. 恶风  
B. 身肿  
C. 脉浮  
D. 大热  
E. 汗出
32. 关于桂枝芍药知母汤证的主症，以下哪项不是
- A. 肢节疼痛  
B. 头眩短气  
C. 温温欲吐  
D. 脚肿  
E. 口不能言
33. 若斑出热不解者，以下治疗方法不恰当的为
- A. 主以甘寒  
B. 益胃养津  
C. 玉女煎  
D. 当用开泄  
E. 梨皮、蔗浆
34. 以下哪项最适用于湿热证湿在表分的治法
- A. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、大力子  
B. 藿香、香薷、黄芩、苍术皮、薄荷、射干  
C. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、射干、大力子  
D. 藿香、香薷、羌活、白术、薄荷、大力子  
E. 藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、大豆黄卷
35. 指出“湿热病属阳明太阴经者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”的医家是
- A. 吴又可  
B. 叶天士  
C. 薛生白  
D. 吴鞠通  
E. 王孟英
36. 以下哪项不是寒痰阻肺证的特征
- A. 痰多  
B. 色白  
C. 咳喘  
D. 质稀  
E. 难咯
37. 热极的患者其唇的色泽可表现为
- A. 唇色深红  
B. 唇色青紫  
C. 口唇青黑  
D. 口唇赤肿而干  
E. 口唇呈樱桃红色者
38. 斑与疹的主要区别是
- A. 是否色红成片  
B. 是否时现时隐  
C. 是否抚之碍手  
D. 是否压之褪色

- E. 是否伴有身热
39. 症见胁肋胀痛, 口苦, 阴部瘙痒, 带下色黄臭秽, 脉弦数, 此为
- A. 肝郁气滞证  
B. 肝火炽盛证  
C. 胆郁痰扰证  
D. 肝胆湿热证  
E. 湿热蕴脾证
40. 鼻流浊涕者, 多属
- A. 外感风热  
B. 胆经湿热  
C. 阳气虚弱  
D. 外感风寒  
E. 阴虚肺燥
41. 眼窝凹陷多属
- A. 肺胀  
B. 吐泻伤津  
C. 肝胆火炽  
D. 脾胃虚衰  
E. 肾阴不足
42. 舌苔薄白而干者多见于
- A. 湿浊中阻  
B. 食积内停  
C. 脾肾阳虚  
D. 外感风热  
E. 燥热伤津
43. 症见口苦, 咽干, 寒热往来, 胸胁苦满, 脉弦, 此为
- A. 太阳经证  
B. 太阳腑证  
C. 少阳病证  
D. 阳明经证  
E. 阳明腑证
44. 在 28 脉中, 具有沉、实、大、弦、长特点的脉象是
- A. 紧脉  
B. 革脉  
C. 牢脉  
D. 芤脉  
E. 伏脉
45. 舌苔脱落处舌面不光滑, 仍有新生苔质颗粒者称
- A. 花剥苔  
B. 地图舌  
C. 镜面舌  
D. 光滑舌  
E. 类剥苔
46. 下列不属肾精耗损证表现的是
- A. 手足心热  
B. 消瘦无力  
C. 口燥咽干  
D. 舌绛不鲜  
E. 手指蠕动
47. 下列哪项为下焦病证的临床表现
- A. 身热  
B. 颧红  
C. 手足心热甚于手足背  
D. 心中愴愴大动  
E. 以上均是
48. 下列各项中, 属于病理性舌象表现的是
- A. 肥胖之人舌多胖大而质淡  
B. 老年人舌色较暗红或带紫暗色  
C. 消瘦之人舌体偏瘦而舌色偏红  
D. 儿童的舌质多淡嫩, 舌苔偏少易剥  
E. 以上都不是
49. 常见饭后嗜睡, 其原因多为
- A. 脾气虚弱  
B. 湿邪困脾  
C. 心肾阳虚  
D. 邪闭心神  
E. 以上都不是
50. 大便溏结不调多见于
- A. 脾虚  
B. 肾虚  
C. 脾肾阳虚  
D. 肝郁脾虚  
E. 食滞胃肠
51. 下列关于头痛不同性质的内容叙述错误的是
- A. 头痛连项, 遇风加重者属风寒头痛  
B. 头痛怕热, 面红目赤者属风热头痛  
C. 头痛如裹, 肢体困重者属风湿头痛  
D. 头痛绵绵, 过劳则盛者属肾虚头痛  
E. 头痛眩晕, 面色苍白者属血虚头痛
52. 胁痛与下列哪项无关
- A. 饮停胸胁  
B. 肝郁气滞  
C. 肝胆火盛

- D. 寒滞肝脉  
E. 肝胆湿热
53. 气滞血瘀的痛证可见哪种脉象
- A. 革脉  
B. 紧脉  
C. 滑脉  
D. 实脉  
E. 涩脉
54. 伤寒病凡一经病证未罢，又见他经病证者称为
- A. 传经  
B. 顺传  
C. 直中  
D. 合病  
E. 并病
55. 下列症状哪项不是实证的临床表现
- A. 五心烦热  
B. 大便秘结  
C. 小便不通  
D. 痰涎壅盛  
E. 腹痛拒按
56. 具有清热燥湿作用的药物应具有的药味是
- A. 酸味  
B. 苦味  
C. 甘味  
D. 辛味  
E. 咸味
57. 半夏与陈皮合用可以增强燥湿化痰的作用，属于哪种配伍关系
- A. 相畏  
B. 相杀  
C. 相须  
D. 相使  
E. 相恶
58. 下列配伍中属于“十九畏”配伍的药物是
- A. 大戟与甘草  
B. 贝母与乌头  
C. 乌头与瓜蒌  
D. 官桂与赤石脂  
E. 芍药与藜芦
59. 既能发汗解表，又能利水消肿的药物是
- A. 麻黄、荆芥  
B. 香薷、紫苏  
C. 麻黄、香薷  
D. 紫苏、生姜  
E. 荆芥、防风
60. 下列药物中可用于治疗巅顶头痛的是
- A. 藁本  
B. 防风  
C. 细辛  
D. 辛夷  
E. 荆芥
61. 治疗风热、肝热之目赤肿痛的最佳药对是
- A. 菊花、木贼  
B. 薄荷、柴胡  
C. 桑叶、菊花  
D. 桑叶、牛蒡子  
E. 蝉蜕、乌贼
62. 阴虚火旺、肺肾阴虚所致盗汗、骨蒸潮热、心烦等证，宜选用的药物是
- A. 天花粉、沙参  
B. 生石膏、黄柏  
C. 黄柏、知母  
D. 黄芩、地骨皮  
E. 牡丹皮、桑白皮
63. 治疗怀孕蕴热、胎动不安者，当选用的药物是
- A. 桑寄生  
B. 黄芩  
C. 紫苏  
D. 续断  
E. 砂仁
64. 以下哪项是芦根和淡竹叶共有的功效
- A. 止呕  
B. 利尿  
C. 止血  
D. 凉血  
E. 以上都不是
65. 具有润肺止咳，散结消痈功效的药物是
- A. 川贝母  
B. 旋覆花  
C. 百部  
D. 杏仁  
E. 紫菀
66. 既能清热解毒，又能疏散风热的药对是

- A. 桑叶、菊花  
B. 薄荷、牛蒡子  
C. 牛黄、水牛角  
D. 金银花、连翘  
E. 蒲公英、紫花地丁
67. 治疗风湿日久，累及肝肾的最佳药物组合是  
A. 羌活、独活  
B. 五加皮、桑寄生  
C. 秦艽、薏苡仁  
D. 白术、苍术  
E. 苍术、黄柏
68. 肉桂入煎剂、研末冲服时的剂量分别是  
A. 0.1~0.3g、0.5~1g  
B. 1~2g、0.1~1g  
C. 1~5g、1~2g  
D. 5~15g、3~6g  
E. 以上都不是
69. 下列除哪项外都是主治风湿热痹的药物  
A. 桑枝  
B. 防己  
C. 威灵仙  
D. 薏苡仁  
E. 络石藤
70. 既能凉血止血，又能清热利尿，清肺胃热的药物是  
A. 大蓟  
B. 小蓟  
C. 白茅根  
D. 地榆  
E. 槐花
71. 可用于养血安胎的药物是  
A. 狗脊  
B. 砂仁  
C. 乌梢蛇  
D. 五加皮  
E. 桑寄生
72. 既能化湿行气，又能止泻及安胎的药物是  
A. 藿香  
B. 佩兰  
C. 砂仁  
D. 白豆蔻  
E. 草果
73. 既能化湿，又能解暑的药物是  
A. 藿香、佩兰  
B. 苍术、厚朴  
C. 砂仁、豆蔻  
D. 陈皮、青皮  
E. 茯苓、玉竹
74. 功效活血调经，利水消肿，清热解毒的药物是  
A. 艾叶  
B. 五灵脂  
C. 郁金  
D. 益母草  
E. 没药
75. 发热腹痛，里急后重，大便有脓血，舌质红，脉滑数。治疗宜首选  
A. 黄连、木香  
B. 黄柏、木香  
C. 苦参、木香  
D. 马齿苋、木香  
E. 黄芩、木香
76. 可用于治疗夜盲症的药物是  
A. 砂仁  
B. 苍术  
C. 豆蔻  
D. 草果  
E. 以上都不是
77. 既能温中止痛，又能杀虫，可用于蛔虫腹痛、呕吐或吐蛔的药物是  
A. 干姜  
B. 吴茱萸  
C. 砂仁  
D. 小茴香  
E. 花椒
78. 沉香治疗痰饮喘咳，上盛下虚之证，其作用在于  
A. 温肺化饮  
B. 燥湿化痰  
C. 温肾纳气  
D. 益气健脾  
E. 补益肺肾
79. 功效燥湿化痰，祛风解痉，散结消肿的药物是  
A. 天南星  
B. 蝉蜕

- C. 川乌  
D. 防风  
E. 蕲蛇
80. 川楝子、槟榔皆具有的功效是  
A. 杀虫行气  
B. 杀虫利水  
C. 行气利水  
D. 行气疏肝  
E. 行气健脾
81. 附子的归经为  
A. 心、肝、脾  
B. 心、脾、肾  
C. 心、肝、肾  
D. 心、脾、肺  
E. 心、肾、肺
82. 既能收敛止血，止痢，又能截疟，补虚的药物是  
A. 苦楝皮  
B. 沙苑子  
C. 侧柏叶  
D. 仙鹤草  
E. 三七
83. 桑白皮与葶苈子既能泻肺平喘，又能  
A. 利水渗湿  
B. 利水通淋  
C. 利水消肿  
D. 利水止泻  
E. 利水退黄
84. 具有补气养阴，清热生津作用的药物是  
A. 玄参  
B. 苦参  
C. 丹参  
D. 太子参  
E. 西洋参
85. 下列除哪项外，均具有明目功效  
A. 菟丝子  
B. 金樱子  
C. 沙苑子  
D. 枸杞子  
E. 女贞子

## 二、A2 型选择题 (86 ~ 90 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例

出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

86. 患者，男，59 岁，久病，因精气内伤，肺肾阴虚，虚火灼肺，以致津枯肺损，声音难出，称为  
A. 子暗  
B. 金破不鸣  
C. 金实不鸣  
D. 少气  
E. 短气
87. 患者男性，60 岁。平素眩晕病史，因恼怒而突发头痛而胀，继则昏厥仆倒，呕血，不省人事，肢体强痉，舌红苔黄，脉弦。此证候属  
A. 气结  
B. 气逆  
C. 气郁  
D. 气脱  
E. 气陷
88. 患儿，男，4 岁。因发热，腹泻来诊。脉浮，大小不齐，应考虑为  
A. 痰食  
B. 风痰  
C. 寒湿  
D. 积滞  
E. 风热
89. 患者，男，45 岁，面色浮红如妆，但非满面通红，口渴但不欲饮，小便清长，舌淡，苔白，脉浮大，按之无力。其病证多为  
A. 阴虚火旺  
B. 肝胆湿热  
C. 实热内炽  
D. 真热假寒  
E. 真寒假热
90. 患者男性，38 岁，近日发热微恶寒，口苦，胁痛，尿短黄，大便粘臭，舌红苔薄白，脉数。其证候是  
A. 真寒假热  
B. 真热假寒  
C. 表热里寒  
D. 表寒里热  
E. 表里俱热



### 三、B1 型选择题 (91 ~ 150 题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(91~92 题共用备选答案)

- A. 母病及子
- B. 相乘传变
- C. 子病犯母
- D. 相侮传变
- E. 制化传变

- 91. 水气凌心属于
- 92. 木火刑金属于

(93~94 题共用备选答案)

- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

- 93. “在液为涎”的脏是
- 94. “在液为泪”的脏是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 脾胃
- B. 肝胆
- C. 心肾
- D. 肝肾
- E. 肝肺

- 95. 与气机调节关系密切的是
- 96. 气机升降之枢指的是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 目
- B. 舌
- C. 口
- D. 鼻
- E. 耳

- 97. 脾在窍为
- 98. 肺在窍为

(99~100 题共用备选答案)

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉

- D. 带脉
- E. 阴阳维脉

- 99. 具有约束纵行诸经功能的是
- 100. 称为“十二经经之海”的是  
(101~102 题共用备选答案)

- A. 伏而后发
- B. 徐发
- C. 继发
- D. 感邪即发
- E. 复发

- 101. 感邪后缓慢发病是
- 102. 疠气致病多为

(103~104 题共用备选答案)

- A. 眩晕欲仆
  - B. 目睛上吊
  - C. 手足蠕动
  - D. 手足拘挛不伸
  - E. 咳嗽咽痒
- 103. 肝阳化风可见
  - 104. 阴虚风动可见

(105~106 题共用备选答案)

- A. 塞因塞用
- B. 寒者热之
- C. 热因热用
- D. 寒因寒用
- E. 通因通用

- 105. 适用于脾虚腹胀的治则治法是
- 106. 适用于真热假寒证的治则治法是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 胖大舌
- B. 瘦薄舌
- C. 点刺舌
- D. 老舌
- E. 强硬舌

- 117. 气血两虚的舌象是
- 118. 水湿内停的舌象是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 汗出肤冷，倦卧不语，脉虚和缓
  - B. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉弦而数
  - C. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉象急数
  - D. 肤冷汗出，躁扰不卧，脉虚而缓
  - E. 汗出肤冷，倦卧不语，脉象细数
- 119. 战汗后邪退气虚正安的主要表现为
  - 120. 战汗后气脱的主要表现为

(121~122 题共用备选答案)

- A. 热扰心神
- B. 痰热扰心
- C. 心气不足
- D. 脏气衰微
- E. 宗气大虚

121. 导致自言自语, 见人便止, 首尾不续的病因是

122. 导致语言时有错乱, 语后自知言错的病因是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 心肾不交
- B. 胆郁痰扰
- C. 心脾两虚
- D. 心阳亏虚
- E. 心脉痹阻

123. 睡眠时时惊醒, 不易安卧多见于

124. 不易入睡, 甚至彻夜不眠, 兼心烦不寐多见于

(125~126 题共用备选答案)

- A. 证候相兼
- B. 虚实真假
- C. 寒热真假
- D. 证候错杂
- E. 证候转化

125. 麻疹麻疹外透属于

126. 寒包火证属于

(127~128 题共用备选答案)

- A. 气不摄血证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气血两虚证
- D. 气随血脱证
- E. 气滞血瘀证

127. 症见衄血、面色淡白无华、少气懒言、舌淡白, 脉弱属于

128. 症见突然面色苍白、大汗淋漓、脉微欲绝属于

(129~130 题共用备选答案)

- A. 肾虚水泛证
- B. 肾阳虚证
- C. 肾阴虚证
- D. 肾精不足证
- E. 肾气不固证

129. 以腰膝酸软, 身肿尿少为特征的是

130. 以腰膝酸软, 胎动易滑为特征的是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 妊娠恶阻, 胎动不安证
- B. 妊娠胎漏下血, 胎动欲坠
- C. 妊娠胎热, 胎动不安证
- D. 妊娠肝肾亏虚, 胎动不安证
- E. 妊娠脾虚气弱, 胎动不安证

131. 白术的主治病证是

132. 桑寄生的主治病证是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 开窍醒神, 活血通经, 消肿止痛
- B. 开窍醒神, 清热止痛
- C. 开窍醒神, 清心化痰
- D. 开窍醒神, 化湿和胃, 宁神益智
- E. 开窍醒神, 辟秽止痛

133. 苏合香的功效是

134. 冰片的功效是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 金樱子
- B. 覆盆子
- C. 桑螵蛸
- D. 鸡内金
- E. 海螵蛸

135. 既能固精止带, 又能收敛止血的药物是

136. 既能固精缩尿, 又能涩肠止泻的药物是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 芡实
- B. 赤石脂
- C. 莲子
- D. 浮小麦
- E. 肉豆蔻

137. 可以治疗自汗盗汗, 骨蒸劳热的药物是

138. 可以治疗虚寒气滞, 久泻不止的药物是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 既能收敛固涩, 又能补肾宁心
- B. 既能敛肺止咳, 又能生津安蛔
- C. 既能敛肺止咳, 又能固精缩尿
- D. 既能敛肺止咳, 又能收敛止血
- E. 既能敛肺止咳, 又能利咽开音

139. 五味子的功效是

## 第二单元

### 一、A1 型选择题 (1 ~ 61 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

140. 诃子的功效是  
(141~142 题共用备选答案)

- A. 太子参
- B. 白术
- C. 山药
- D. 人参
- E. 甘草

141. 治疗脾虚水肿宜选用的药物是

142. 治疗心气虚、脉结代，宜选用的药物是  
(143~144 题共用备选答案)

- A. 滋补肝肾，养胃生津
- B. 补脾益气，养胃生津
- C. 滋阴除烦，养胃生津
- D. 养阴润燥，清肺生津
- E. 清肺养阴，益胃生津

143. 北沙参的功效是

144. 天冬的功效是  
(145~146 题共用备选答案)

- A. 龟板
- B. 龙骨
- C. 鳖甲
- D. 牡蛎
- E. 代赭石

145. 功效为平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩的药物是

146. 功效为滋阴潜阳，软坚散结，善于治疗阴虚风动的药物是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 胃热呕吐
- B. 气逆呕吐
- C. 胃虚呕吐
- D. 胃寒呕吐
- E. 食滞内停呕吐

147. 竹茹可以治疗的病证是

148. 旋覆花可以治疗的病证是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 风湿痹痛
- B. 湿热黄疸
- C. 血虚失眠
- D. 肾虚腰痛
- E. 肠燥便秘

149. 川芎可用于治疗的病证是

150. 郁金可用于治疗的病证是

1. 桂枝汤中外可解肌发表，内可调和营卫、调和阴阳的配伍是

- A. 桂枝与生姜
- B. 桂枝与芍药
- C. 大枣与甘草
- D. 生姜与甘草
- E. 芍药与大枣

2. 败毒散中配伍人参的主要用意是

- A. 大补肺脾，以复正气
- B. 补脾益肺，培土生金
- C. 扶助正气，鼓邪外出
- D. 益气生津，以资汗源
- E. 益气和中，温阳止痹

3. 银翘散中体现去其性而取其用之法的配伍是

- A. 银花、连翘
- B. 芦根、芥穗
- C. 竹叶、薄荷
- D. 牛蒡子、苦桔梗
- E. 荆芥穗、淡豆豉

4. 功用为透邪解郁，疏肝理脾的方剂是

- A. 四逆散
- B. 逍遥散
- C. 达原饮
- D. 痛泻要方
- E. 大柴胡汤

5. 麻子仁丸的组成药物中不含

- A. 大黄
- B. 枳实
- C. 当归
- D. 杏仁
- E. 芍药

6. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是
- 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
  - 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
  - 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
  - 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
  - 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
7. 大建中汤和小建中汤二方组成中均含有的药物是
- 附子
  - 饴糖
  - 干姜
  - 人参
  - 蜀椒
8. 阳和汤的组成药物除麻黄、白芥子外，其余是
- 熟地 鹿角霜 炮姜 桂枝 甘草
  - 生地 真阿胶 姜炭 桂枝 细辛
  - 熟地 鹿角胶 姜炭 肉桂 甘草
  - 熟地 龟板胶 干姜 肉桂 川芎
  - 熟地 鹿角胶 炮姜 细辛 甘草
9. 四逆汤与当归四逆汤二方组成中均含有的药物是
- 当归
  - 附子
  - 桂枝
  - 干姜
  - 甘草
10. 防风通圣散的功用是
- 疏风清热，宣肺止咳
  - 疏风解表，清热通便
  - 和解少阳，内泻结热
  - 辛凉宣肺，清热平喘
  - 解表散寒，温肺化饮
11. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- 远志
  - 知母
  - 茯神
  - 柏子仁
  - 龙眼肉
12. 以镇心安神，清热养血为主要功用的方剂是
- 归脾汤
  - 酸枣仁汤
  - 天王补心丹
  - 当归六黄汤
  - 朱砂安神丸
13. 左归丸组成中含有而右归丸组成中不含有的药物是
- 枸杞子
  - 龟板胶
  - 鹿角胶
  - 山茱萸
  - 菟丝子
14. 暖肝煎中配伍当归的用意是
- 养血润燥
  - 化瘀生新
  - 补血和营
  - 养血补肝
  - 下气止逆
15. 苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是
- 温阳散寒
  - 温肾纳气
  - 温通经脉
  - 鼓舞气血
  - 散寒止痛
16. 下列各项中，不属于独活寄生汤组成药物的是
- 杜仲、牛膝、肉桂
  - 白术、羌活、苍术
  - 细辛、防风、秦艽
  - 川芎、当归、生地
  - 人参、芍药、甘草
17. 主治下焦虚寒之膏淋、白浊的方剂为
- 茵陈蒿汤
  - 萆薢分清饮
  - 蒿芩清胆汤
  - 甘露消毒丹
  - 三仁汤
18. 川芎茶调散的组成药物中含有
- 牛蒡
  - 羌活
  - 苍术
  - 当归
  - 蝉蜕
19. 以清宣温燥，润肺止咳为主要功用的方剂是
- 杏苏散

- B. 增液汤  
C. 桑杏汤  
D. 养阴清肺汤  
E. 清燥救肺汤
20. 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有  
A. 白术、茯苓  
B. 泽泻、猪苓  
C. 滑石、甘草  
D. 茯苓、桂枝  
E. 滑石、阿胶
21. 对肺炎链球菌肺炎诊断价值大的是  
A. 起病急，有寒战、高热、胸痛、咳嗽  
B. 血白细胞总数升高  
C. 痰涂片或培养有肺炎球菌  
D. 局部出现明显的湿啰音  
E. X 线检查呈肺叶分布的密度均匀影
22. COPD 急性加重期的重要治疗措施是  
A. 止咳、祛痰  
B. 解痉、平喘  
C. 控制感染  
D. 避免及减少各种诱因  
E. 抗过敏
23. 二尖瓣关闭不全的体征，说法不正确的是  
A. 心尖搏动增强呈抬举性  
B. 偶可触及收缩期震颤  
C. 心浊音界向左下扩大  
D. 心尖区可闻及吹风样杂音  
E. 心浊音界向左扩大，心腰消失而呈梨形心
24. 心绞痛发作的典型部位是  
A. 胸骨下段后  
B. 剑突下  
C. 胸骨上中段之后  
D. 心尖部  
E. 心前区向颈咽部放射
25. 查体闻及“大炮音”，患者最可能发生的心律失常是  
A. 二度房室传导阻滞  
B. 三度房室传导阻滞  
C. 窦房传导阻滞  
D. 窦性停搏  
E. 一度房室传导阻滞
26. 心绞痛发作时心电图 ST 段抬高可能是  
A. 变异型心绞痛  
B. 卧位型心绞痛  
C. 劳累性心绞痛  
D. 稳定型心绞痛  
E. 恶化型心绞痛
27. 支气管哮喘的典型表现主要是  
A. 先兆症状后出现吸气困难  
B. 发作性带有哮鸣音的呼气性呼吸困难  
C. 伴哮鸣音的混合性呼吸困难  
D. 伴哮鸣音的呼吸困难，粉红色泡沫痰  
E. 哮喘发作 24 小时以上，伴咯血
28. 肝硬化最常见的并发症是  
A. 自发性腹膜炎  
B. 肝肺综合征  
C. 急性上消化道出血  
D. 肝性脑病  
E. 肝肾综合征
29. 不属溃疡性结肠炎主要临床表现的是  
A. 里急后重  
B. 腹部包块  
C. 腹痛  
D. 腹泻  
E. 黏液脓血便
30. 慢性胃炎最主要的病因是  
A. 饮食因素  
B. 幽门螺杆菌感染  
C. 自身免疫反应  
D. 十二指肠液反流  
E. 遗传因素
31. 慢性肾衰竭时常有的水与电解质紊乱表现是  
A. 代谢性酸中毒，高钾和低镁血症  
B. 代谢性酸中毒，失水和低钠、低钾血症  
C. 代谢性酸中毒，低血磷和低钙血症  
D. 代谢性碱中毒，低钾和低氮血症  
E. 代谢性酸中毒，高磷和低钙血症
32. 关于急性肾盂肾炎临床表现。说法错误的是  
A. 肉眼血尿  
B. 贫血  
C. 畏寒、发热  
D. 尿频、尿急、尿痛  
E. 腰痛

33. 急性型特发性血小板减少性紫癜的特点是
- A. 多见于女性
  - B. 无感染病史
  - C. 多数病程迁延
  - D. 骨髓幼稚型巨核细胞增多
  - E. 多见于成人
34. 不属类风湿关节炎关节外表现的是
- A. 类风湿结节
  - B. 周围神经病变
  - C. 贫血
  - D. 肺间质病变
  - E. 心脏瓣膜病变
35. 甲亢时最常见的心律失常类型是
- A. 心房颤动
  - B. 房室传导阻滞
  - C. 室性早搏
  - D. 房性心动过速
  - E. 交界性早搏
36. 属感染性发热的疾病是
- A. 风湿热
  - B. 广泛性皮炎
  - C. 肝癌
  - D. 斑疹伤寒
  - E. 白血病
37. 急性心梗患者常有发热，其主要机制是
- A. 变态反应
  - B. 代谢障碍
  - C. 体温调节中枢失常
  - D. 神经功能障碍
  - E. 吸收热
38. 在非感染性发热中，属抗原-抗体反应性疾病的是
- A. 血清病
  - B. 中暑
  - C. 重度安眠药中毒
  - D. 大面积烧伤
  - E. 急性心肌梗死
39. 发热 10 天，每天体温最高达  $39.6^{\circ}\text{C}$  ~  $40.1^{\circ}\text{C}$ ，最低  $37.6^{\circ}\text{C}$ ，试问该热型属于
- A. 波状热
  - B. 稽留热
  - C. 弛张热
  - D. 不规则热
  - E. 间歇热
40. 吸气性呼吸困难表现为
- A. 明显的哮鸣音
  - B. 深大呼吸
  - C. 桶状胸
  - D. 三凹征
  - E. 胸部一侧呼吸减弱
41. 反复发作的呼气性呼吸困难，主要见于
- A. 气道异物
  - B. 支气管哮喘
  - C. 大叶性肺炎
  - D. 肺不张
  - E. 气胸
42. 肺气肿时，呼吸困难的主要特点是
- A. 呼气费力
  - B. 吸气和呼气均感费力
  - C. 呼吸浅快
  - D. 吸气费力
  - E. 呼吸深慢
43. 肾源性水肿常见于
- A. 肝硬化
  - B. 各型肾炎
  - C. 右心衰竭
  - D. 低蛋白血症
  - E. 妊娠高血压综合征
44. 下列可以表现为局部性水肿的是
- A. 创伤
  - B. 丝虫病
  - C. 局部炎症
  - D. 血栓性静脉炎
  - E. 以上都是
45. 幽门梗阻时，呕吐物多为
- A. 咖啡色
  - B. 黄绿色稀薄液
  - C. 含血液
  - D. 隔日食物
  - E. 大量黏液
46. 关于腹痛部位，下列叙述正确的是
- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
  - B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
  - C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
  - D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
  - E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
47. 关于黄疸的特点，下列说法正确的是

- A. 溶血性黄疸以非结合胆红素增多为主  
B. 肝细胞性黄疸尿胆红素阴性  
C. 胆汁淤积性黄疸尿胆原增多  
D. 肝细胞性黄疸尿胆原减少  
E. 胆汁淤积性黄疸尿胆红素阴性
48. 下列不属于个人史的是  
A. 社会经历  
B. 习惯与嗜好  
C. 冶游史  
D. 职业和生活条件  
E. 生育史
49. 下列不符合心包摩擦音特点的是  
A. 收缩期及舒张期均可听到  
B. 通常在胸骨左缘 3、4 肋间易听到  
C. 将听诊器胸件向胸部加压时, 可使摩擦音增强  
D. 屏住呼吸时摩擦音消失  
E. 病人采取坐位稍前倾时, 易于听到
50. 高钾血症见于  
A. 肺心病  
B. 呼吸性酸中毒  
C. 代谢性酸中毒  
D. 代谢性碱中毒  
E. 以上均不是
51. 突感胸骨后疼痛伴有胸闷、憋气, 急查心电图见各导联 ST 段均呈水平型下移达 0.1mV, 伴有 T 波倒置, 以往心电图正常。最可能的诊断是  
A. 变异型心绞痛  
B. 急性心肌梗死  
C. 典型心绞痛发作  
D. 陈旧性心肌梗死  
E. 左心室劳损
52. 不属确立诊断的步骤及原则的是  
A. 调查研究  
B. 搜集资料  
C. 综合分析  
D. 患者签名  
E. 初步诊断
53. 叩诊肝浊音界下移见于  
A. 右肺纤维化  
B. 胃肠穿孔  
C. 气腹  
D. 鼓胀  
E. 右侧张力性气胸
54. 尿中不会出现管型的疾病是  
A. 慢性肾炎  
B. 肾盂肾炎  
C. 肾病综合征  
D. 狼疮性肾炎  
E. 急性膀胱炎
55. 高热 3 天, 体温 39.9℃, 胸痛, 咳嗽, 咯痰。胸片显示肺野出现均匀性密度增高的片状阴影, 病变范围呈大叶性分布, 在大片密实阴影中常可见到透亮的含气支气管影。考虑是  
A. 大叶性肺炎  
B. 支气管肺炎  
C. 右上肺不张  
D. 肺结核  
E. 中心性肺癌
56. 对医学道德的认识不正确的是  
A. 医务人员容易理解、接受  
B. 人道主义精神的集中体现  
C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间  
D. 在内容上具有稳定性、连续性  
E. 在形式上比较具体、生动
57. 医务人员对患者诚信、宽厚, 潜心医学事业, 对医学科学忠诚, 体现了  
A. 仁爱  
B. 严谨  
C. 诚挚  
D. 公正  
E. 奉献
58. 生命质量论的伦理意义在于  
A. 有利于提高人口素质  
B. 有利于控制人口增长  
C. 有利于人类自我认识的飞跃  
D. 为医务人员对不同生命质量人群采取相应的治疗原则、方法和手段提供了理论依据  
E. 以上皆是
59. 患者的基本权利不包括  
A. 基本医疗权  
B. 疾病认知权  
C. 知情同意权  
D. 自主决定权  
E. 社会免责权

60. 人体实验类型中，无需承担道德代价的是

- A. 天然实验
- B. 自愿实验
- C. 欺骗实验
- D. 强迫实验
- E. 自我实验

61. 国家卫生部关于《人类辅助生殖技术和人类精子库伦理原则》的制定时间是

- A. 1990 年
- B. 1995 年
- C. 2000 年
- D. 2003 年
- E. 2005 年

## 二、A2 型选择题 (62 ~ 90 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

62. 患者，女，38 岁，脘腹绵绵作痛，喜温喜按，呕吐便溏，脘痞食少，畏寒肢冷，口不渴，舌淡苔白润，脉沉细。治宜选用

- A. 小建中汤
- B. 吴茱萸汤
- C. 参苓白术散
- D. 补中益气汤
- E. 理中丸

63. 患者，男，58 岁，近日生气后胸膈痞闷，脘腹胀痛，噎腐吞酸，恶心呕吐，饮食不消，治疗应首选

- A. 藿香正气散
- B. 平胃散
- C. 半夏厚朴汤
- D. 半夏泻心汤
- E. 越鞠丸

64. 患者素有水饮，复感风寒，水寒相搏，以致肺寒气逆，喘咳痰多而稀，恶寒发热无汗，面部与四肢浮肿，身体重痛，舌苔白滑，脉浮。治疗应选用

- A. 小青龙汤
- B. 五苓散

C. 苓桂术甘汤

D. 麻黄汤

E. 藿香正气散

65. 患者，男，48 岁。近日寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕黄涎而粘，舌红苔白腻，脉弦滑数。治疗应首选

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 半夏泻心汤
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 逍遥散

66. 张某，60 岁，干咳、胸痛、发热、消瘦 1 个月，经检查诊断为小细胞肺癌，其治疗首选

- A. 化疗
- B. 手术治疗
- C. 放射治疗
- D. 干扰素
- E. 集落刺激因子

67. 女性，26 岁，支气管哮喘病史 13 年，今晨上班途中因吸入汽车尾气突然发作，以喘憋、呼吸困难为主，伴心悸、乏力，遂急诊，为控制发作应首选的药物是

- A. 沙丁胺醇气雾剂
- B. 溴化异丙托品气雾剂
- C. 泼尼松口服
- D. 色甘酸钠
- E. 茶碱缓释片

68. 患者节律性上腹痛伴有恶心、呕吐、反酸等，胃镜检查诊断为胃溃疡，提示处于活动期的内镜下表现是

- A. 溃疡基底有白色厚苔
- B. 溃疡表浅苔变薄
- C. 黏膜皱襞向溃疡集中
- D. 溃疡基底呈现红色瘢痕
- E. 溃疡基底呈现白色瘢痕

69. 男性，52 岁，胃溃疡病史 10 年，近 1 个月来疼痛的节律性消失，食欲减退，体重减轻，粪便隐血试验持续(+++)，应首先考虑的诊断是

- A. Hp 感染
- B. 消化道出血
- C. 癌变
- D. 慢性穿孔



- E. 幽门梗阻
70. 男性, 37 岁, 十二指肠溃疡病史 6 年余, 近日劳累后频发上腹痛, 食欲不振, 乏力, 2 小时前突感恶心, 随后呕吐暗红色血性液体, 量较大而急诊, 应立即应用的止血药物是
- A. 止血环酸 B. 垂体后叶素  
C. 安络血  
D. 奥美拉唑 E. 血小板悬液
71. 女性, 30 岁, 风湿热病史 6 年, 现呼吸困难、咳嗽、咯血, 查体心尖部闻及舒张中晚期杂音, 心电图显示左房增大, 该患者的诊断是
- A. 主动脉瓣关闭不全  
B. 联合瓣膜病变  
C. 二尖瓣狭窄  
D. 二尖瓣关闭不全  
E. 主动脉瓣狭窄
72. 患者, 男, 65 岁, 临床诊断为急性心肌梗死, 入院第 2 天出现三度房室传导阻滞, 最恰当的治疗措施是
- A. 静注阿托品  
B. 静注异丙肾上腺素  
C. 口服阿托品  
D. 安装临时心脏起搏器  
E. 安装永久性心脏起搏器
73. 患者男性, 60 岁, 由于情绪激动, 突然剧烈头痛、头晕、呕吐, 随之出现“三偏征”, 诊断为脑出血, 其最主要的病因是
- A. 高血压性动脉硬化  
B. 血液病  
C. 动脉瘤  
D. 脑血管畸形  
E. 脑动脉炎
74. 患者胃溃疡病史 12 年, 因上腹痛、呕吐、消瘦就诊, 经胃镜检查确诊为进展期胃癌, 治疗最好的方法是
- A. 免疫疗法  
B. 放射治疗  
C. 手术治疗  
D. 内镜下治疗  
E. 化疗
75. 患者十二指肠溃疡病史 7 年, 饮酒后突发上腹剧痛, 查体呈板状腹, 拟诊为急性穿孔, 确诊最重要的检查是
- A. 粪便隐血试验  
B. 腹腔穿刺  
C. 腹部 X 线透视  
D. 钡餐透视  
E. 血常规
76. 患者男性, 65 岁, 高血压病史 10 年, 今晨起床突然发现右侧肢体瘫痪、感觉障碍、失语, 经检查诊断为动脉血栓性脑梗死, 最常见的病因是
- A. 动脉粥样硬化  
B. 细菌性血管炎  
C. 心脏病  
D. 糖尿病  
E. 高血压病
77. 患者王某, 因水肿、高血压、蛋白尿就诊, 经查拟诊为慢性肾炎, 需与慢性肾盂肾炎鉴别, 需要做何检查
- A. 肾功能检测  
B. 静脉肾盂造影  
C. 尿细菌培养  
D. 尿常规  
E. 血常规
78. 患者男性, 24 岁, 服毒物后昏迷、呼吸衰竭、呼气有特殊的大蒜臭味, 毒物可能是
- A. 安眠药  
B. 麻醉剂  
C. 一氧化碳  
D. 砷  
E. 有机磷杀虫药
79. 男性患者, 25 岁, 慢性肾炎病史 7 年, 近日来恶心、呕吐、气喘, 血压 175/100mmHg, 颈静脉怒张, 双肺底闻及湿啰音, 血尿素氮 30mmol/L, 血肌酐 752 $\mu$ mol/L, 血钾 7.2mmol/L, 最宜采用的治疗是
- A. 5%碳酸氢钠静滴  
B. 硝普钠静滴  
C. 葡萄糖酸钙静推  
D. 血液透析  
E. 50%葡萄糖静滴

80. 女性, 29 岁, 因月经量多 2 年, 出现贫血表现, 拟诊断为缺铁性贫血, 可作为缺铁依据的检查结果是
- 转铁蛋白饱和度 $<15\%$
  - FEP $>4.5\mu\text{g/g}$
  - 血清铁蛋白 $<12\mu\text{g/L}$
  - 总铁结合力 $>64.4\mu\text{mol/L}$
  - 血清铁 $<8.9\mu\text{mol/L}$
81. 男性, 55 岁, 患有慢性肾炎, 水肿明显, 血压 160/95mmHg, 控制血压应首选的药物是
- 利血平
  - 降压灵
  - 苯那普利
  - 硝苯地平
  - 呋塞米
82. 某男, 12 岁。发热伴鼻出血 1 周。检查皮肤出血点, 胸骨中下段有压痛。Hb90g/L, WBC $10\times 10^9/\text{L}$ , PLT $50\times 10^9/\text{L}$ , 血涂片可见幼稚细胞。下列哪项检查对诊断最有意义
- 胸片检查
  - 尿液检查
  - 骨髓检查
  - 酸化血清溶血试验
  - 网织红细胞计数
83. 某男, 50 岁, 确诊为慢性髓细胞白血病慢性期。首选治疗是
- 骨髓移植
  - 泼尼松
  - 长春新碱
  - 羟基脲
  - 环磷酰胺
84. 某男, 40 岁。牙龈出血、发热半月。检查: Hb50g/L, WBC $12\times 10^9/\text{L}$ , 原始粒细胞 0.30, Plt $7\times 10^9/\text{L}$ , 患者贫血的主要原因是
- 出血
  - 红细胞寿命缩短
  - 造血原料缺乏
  - 红细胞生成受到异常增生细胞的干扰
  - 无效性红细胞生成
85. 首选糖皮质激素治疗的疾病是
- 白细胞减少症
  - 原发免疫性血小板减少症
  - 缺铁性贫血
  - 再生障碍性贫血
  - 急性白血病
86. 1 型糖尿病患者, 近期由于肺部感染, 原有症状明显加重, 诊断并发酮症酸中毒, 其首要的治疗措施是
- 纠正电解质紊乱
  - 应用胰岛素
  - 补液
  - 纠正酸中毒
  - 控制感染
87. 女性患者, 29 岁, 因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是
- 轻度贫血
  - 血沉增快
  - 反应蛋白升高
  - 心脏超声示少量心包积液
  - 手部 X 线检查未见骨质改变
88. 女性患者, 21 岁, 四肢关节痛 6 个月, 近 2 个月出现面颊部对称性红斑, 口腔溃疡反复发作, 检查白细胞  $2.7\times 10^9/\text{L}$ , 血沉 67mm/h, 该患者最可能的诊断是
- 类风湿关节炎
  - 系统性红斑狼疮
  - 干燥综合征
  - 白塞病
  - 风湿性关节炎
89. 女性患者, 56 岁, 身高 155cm, 体重 55kg, 体检发现空腹血糖  $6.4\text{mmol/L}$ , 下列正确的是
- 可诊断糖尿病
  - 应进行口服葡萄糖耐量试验
  - 可排除糖尿病
  - 应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验
  - 应做 24 小时尿糖定量
90. 女性患者, 28 岁, 对抗甲状腺药物有过过敏反应。治疗宜选择的是
- 放射性质碘治疗
  - 甲状腺次全切除术
  - 抗甲状腺药联合糖皮质激素
  - 复方碘液
  - 普萘洛尔

### 三、A3 型选择题 (91 ~ 100 题)

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设 3 道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(91~92 题共用题干)

患者张某，77 岁，患慢性支气管炎 35 年，两周前因受凉出现胸闷、咳嗽、喘憋加重，咳白色黏痰，经治疗咳嗽减轻，但出现烦躁，昼睡夜醒，精神恍惚。动脉血气分析示 PaO<sub>2</sub>45mmHg，PaCO<sub>2</sub> 为 70mmHg，血象：白细胞 12×10<sup>9</sup>/L，中性粒细胞 0.88。

91. 患者的诊断哪项根据不足

- A. 肺部感染
- B. 呼吸衰竭
- C. 肺性脑病
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

92. 目前的治疗，哪项措施欠妥

- A. 吸氧
- B. 氨茶碱
- C. 抗菌药物
- D. 呼吸机治疗
- E. 氨溴索

(93~94 题共用题干)

女性患者，38 岁。心慌气短十余年，加重伴不能平卧 2 小时。查体：心率 142 次/分，心音强弱不等，心律绝对不齐，心尖区闻及收缩期杂音和舒张期隆隆样杂音，双肺底闻及细小湿啰音，心界向左侧扩大，肝大，肋下 5cm，肝颈静脉反流征阳性，双下肢水肿。

93. 此患者的诊断为

- A. 二尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭
- C. 二尖瓣狭窄、房颤、左心衰竭
- D. 三尖瓣狭窄、房颤、右心衰竭
- E. 三尖瓣关闭不全、房颤、右心衰竭

94. 治疗应首选

- A. 口服地高辛
- B. 静注西地兰

C. 肌注呋塞米

D. 皮下注射吗啡

E. 静注普萘洛尔

(95~96 题共用题干)

男性患者，38 岁，间歇性左下腹痛 5 个月，解脓血便 2 个月，反复抗菌药物治疗无效。查体：腹平软，左下腹轻压痛，未扪及包块。

95. 根据以上资料，最有可能的诊断是

- A. 克隆病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 结肠癌
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 慢性阿米巴痢疾

96. 为明确诊断，最有价值的诊断方法是

- A. 临床症状及体征
- B. 大便常规与培养
- C. X 线钡剂灌肠
- D. 结肠镜检查
- E. 血清免疫球蛋白测定

(97~98 题共用题干)

患者张某，男，31 岁。无明显诱因面部浮肿、头晕，已 1 年余，未就医，近两周出现恶心，食欲差。查体：血压 175/100mmHg，心率 90 次/分，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心律齐，腹平软，无压痛及反跳痛，双肾区无叩痛。实验室检查：Hb90g/L，BUN29mmol/L，Cr753mmol/L。尿液：蛋白

(++)，红细胞(++)，管型(+)。

97. 最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 高血压肾病
- E. 慢性肾炎急性发作

98. 患者饮食中蛋白质的摄入量哪项为宜

- A. 0.5g/kg
- B. 0.7g/kg
- C. 1.0g/kg
- D. 1.2g/kg
- E. 1.4g/kg

(99~100 题共用题干)

某男患者，1 年前出现低热、出汗，逐渐消瘦，左肋下有包块，常伴有左上腹坠痛，餐后饱胀感，近 1 月发热，伴牙龈出血。

Hb90g/L, WBC $25 \times 10^9$ /L, PLT $70 \times 10^9$ /L,  
血涂片原始粒细胞占 0.50。

99. 此患者最有可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 慢性髓细胞白血病
- C. 急性粒细胞白血病
- D. 甲状腺功能亢进
- E. 慢性乙型肝炎

100. 此患者最有可能用的药物是

- A. 伊马替尼
- B. 环磷酰胺
- C. 顺铂
- D. 长春新碱
- E. 阿糖胞苷

#### 四、B1 型选择题 (101 ~ 150 题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(101~102 题共用备选答案)

- A. 保和丸
- B. 健脾丸
- C. 枳实消痞丸
- D. 枳实导滞丸
- E. 木香槟榔丸

101. 饮食不节，脘腹胀满，噎腐吞酸，恶食呕吐，大便泄泻，舌苔厚腻，脉滑者，治宜选用

102. 食积内停，脘腹胀痛，下痢泄泻，小便短赤，舌苔黄腻，脉沉而有力者，治宜选用

(103~104 题共用备选答案)

- A. 归脾汤
- B. 健脾丸
- C. 黄土汤
- D. 槐花散
- E. 十灰散

103. 脾阳不足，统摄无权所致之便血，宜选用

104. 风热客于肠中，损伤脉络所致之便血，宜选用

(105~106 题共用备选答案)

- A. 宣畅气机，清利湿热
- B. 清热化湿，理气和中
- C. 清热泻火，利水通淋
- D. 利湿化浊，清热解毒
- E. 利水渗湿，温阳化气

105. 八正散的功用

106. 三仁汤的功用

(107~108 题共用备选答案)

- A. 玉液汤
- B. 炙甘草汤
- C. 麦门冬汤
- D. 养阴清肺汤
- E. 清燥救肺汤

107. 治疗肺胃阴虚之肺痿，宜用

108. 治疗气阴两亏之肺痿，宜用

(109~110 题共用备选答案)

- A. 龙骨、牡蛎、鳖甲
- B. 龙骨、龟板、鳖甲
- C. 牡蛎、鳖甲、石决明
- D. 龙骨、牡蛎、龟板
- E. 鳖甲、牡蛎、龟板

109. 大定风珠的组成中含有的药物是

110. 镇肝息风汤组成中含有的药物是

(111~112 题共用备选答案)

- A. 丹参饮
- B. 温经汤
- C. 生化汤
- D. 失笑散
- E. 桂枝茯苓丸

111. 具有活血祛瘀，散结止痛功用的方剂是

112. 具有养血祛瘀，温经止痛功用的方剂是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 风中经络，气血痹阻
- B. 湿痰瘀血，痹阻经络
- C. 风痰阻络，筋肉失养
- D. 肝阳偏亢，化风上扰
- E. 热灼真阴，筋脉失濡

113. 小活络丹所主证候病因病机是

114. 大秦苳汤所主证候病因病机是

(115~116 题共用备选答案)

- A. 大黄、芒硝、赤芍
- B. 桃仁、丹皮、芒硝
- C. 大黄、桃仁、甘草
- D. 赤芍、丹皮、甘草
- E. 大黄、赤芍、丹皮

115. 大黄牡丹汤的组成中含有药物是

116. 桃核承气汤的组成中含有药物是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 铁锈色痰
- B. 粉红色乳样或脓性痰
- C. 大量脓臭痰
- D. 粉红色泡沫痰
- E. 红棕色胶冻样痰

117. 肺炎链球菌肺炎的特征性痰液是

118. 急性肺脓肿的典型痰液是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 下垂性压迫性水肿
- B. 脾肿大
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 咳嗽、咳痰
- E. 咯血

119. 左心衰竭时最早出现的症状是

120. 右心衰竭时典型的体征是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 淋巴转移
- B. 种植转移
- C. 直接蔓延
- D. 血行转移
- E. 上行转移

121. 胃癌最早、最常见的转移方式是

122. 原发性肝癌最常见的转移方式是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 颗粒管型
- B. 透明管型
- C. 少量白细胞
- D. 畸形红细胞
- E. 白细胞管型

123. 尿沉渣检查, 肾盂肾炎多见

124. 尿沉渣检查, 慢性肾衰竭多见

(125~126 题共用备选答案)

- A. 结核病
- B. 急性喉炎
- C. 疟疾

D. 败血症

E. 伤寒

125. 稽留热可见于

126. 弛张热可见于

(127~128 题共用备选答案)

- A. 白血病
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 急性胆囊炎
- D. 钩端螺旋体病
- E. 流行性感冒

127. 发热伴寒战常见于

128. 发热伴结膜充血常见于

(129~130 题共用备选答案)

- A. 高血压脑病
- B. 有机磷中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 脑外伤
- E. 尿毒症

129. 意识障碍伴发热见于

130. 意识障碍伴高血压见于

(131~132 题共用备选答案)

- A. 水肿
- B. 甲状腺肿
- C. 反甲
- D. 爪形手
- E. 梭状关节

131. 类风湿性关节炎时出现

132. 贫血时出现

(133~134 题共用备选答案)

- A. 全身性水肿
- B. 双下肢非凹陷性水肿
- C. 单侧肢体水肿
- D. 下肢静脉曲张
- E. 足内翻、足外翻

133. 脊髓灰质炎后遗症可见

134. 下肢浅静脉血液回流受阻可见

(135~136 题共用备选答案)

- A. 脓血便
- B. 鲜血便
- C. 柏油样便
- D. 灰白色便
- E. 稀糊状便

135. 阻塞性黄疸为

136. 上消化道出血为

(137~138 题共用备选答案)

- A. 高糖血症
  - B. 尿糖阳性
  - C. 血糖减低
  - D. 低糖血症
  - E. 空腹血糖过高
137. FBG >9.0mmol/L 时为

138. FBG <3.9mmol/L 时为

(139~140 题共用备选答案)

- A. 黄色痰
- B. 红色痰
- C. 黄绿色痰
- D. 铁锈色痰
- E. 棕褐色痰

139. 呼吸道化脓性感染多见

140. 肺炎链球菌肺炎多见

(141~142 题共用备选答案)

- A. 实变区密度较低呈毛玻璃样
- B. 左上缘影呈直线状斜向外下方
- C. 右上肺与肺门部形成“S”状影
- D. 肺内有多发的薄壁空腔
- E. 肺内有多发的肿块影

141. 弥漫性肺癌的征象为

142. 右上中心型肺癌的 X 线表现为

(143~144 题共用备选答案)

- A. 骨骼
- B. 软组织与液体
- C. 脂肪
- D. 气体
- E. 胸膜

143. 密度最低, X 线片上呈黑色的是

144. 密度最高, X 线片上呈白色的是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 神灵主义医学模式
- B. 自然哲学医学模式
- C. 机械论医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物~心理~社会医学模式

145. 把人比作机器, 疾病是机器某部分零件失灵, 用机械观解释一切人体现象的医学模式是

146. 认为心理, 社会因素与疾病的发生、发展、转化有着密切的联系的医学模式是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 对服务对象实施有利的医学行为
- B. 善待生命, 同情、关心、体贴患者
- C. 在医护实践中尊重能够自主的病人的自主性
- D. 在医学服务中公平、正直地对待每一位病人的伦理原则
- E. 在诊治, 护理过程中努力避免病人不应有的医疗伤害

147. 尊重原则的含义是

148. 无伤原则的含义是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 要有急病人所急的紧迫感
  - B. 要有敢担风险团结协作的使命感
  - C. 要有深厚的同情感
  - D. 抢救前了解诊疗经过
  - E. 要有经济头脑, 保证少花钱多办事
149. 在抢救危重病人时, 保证抢救成功的前提条件是
150. 不属于抢救危重病人时优先考虑的是

## 第三单元

### 一、A1 型选择题 (1~60 题)

答题说明: 每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列哪项不是流行感冒的特征

- A. 传染性大
  - B. 病情较重
  - C. 发病急
  - D. 易于流行
  - E. 不传变
2. 咳嗽初起, 忌用
- A. 黄芩、冬花
  - B. 沙参、麦冬
  - C. 双花、连翘
  - D. 诃子、五味子
  - E. 半夏、陈皮

3. 哮喘病的宿根
- 寒
  - 热
  - 痰
  - 气
  - 火
4. 喘咳气急，胸部胀闷，不得卧，痰稀白量多，恶寒发热，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。其治疗应首选
- 麻黄汤
  - 木防己汤
  - 苓桂术甘汤
  - 越婢加半夏汤
  - 葶苈大枣泻肺汤
5. 《千金》苇茎汤用于治疗下列哪个病最为适合
- 肺痈
  - 肺痿
  - 肺胀
  - 肺消
  - 肺癆
6. 肺癆虚火灼肺，咳血较著者，在辨证方中宜加入
- 当归、三七
  - 泽兰、红花
  - 黑山栀、紫珠草
  - 冬虫夏草、蛤蚧
  - 木蝴蝶、诃子
7. 小青龙汤治疗肺胀哪一型
- 外寒内饮
  - 痰热郁肺
  - 痰蒙神窍
  - 肺肾气虚
  - 阳虚水泛
8. 下列关于肺痿治疗的各项叙述中，错误的是
- 重视调理肝肾
  - 以补肺生津为原则
  - 不可妄投燥热，以免助火伤津
  - 忌苦寒滋腻碍胃
  - 慎用祛痰峻剂
9. 下列哪项不是惊悸与怔忡的鉴别要点
- 致病多由外因或内因引起
  - 诱因常与惊恐、恼怒或劳累有关
  - 全身情况较好或较差
  - 病性属实或属虚
  - 病位在肝或在心
10. 胸痹心痛发作时，疼痛可以放射到
- 右胸
  - 肩背
  - 左肋下
  - 右肋下
  - 背正中
11. 不寐的辨证，应首辨的要点是
- 寒热
  - 久暂
  - 病位
  - 虚实
  - 标本
12. 下列哪项不是外感头痛的特征
- 灼痛
  - 掣痛
  - 重痛
  - 胀痛
  - 空痛
13. 眩晕的病变脏腑为
- 心、肝、肾
  - 肺、脾、肾
  - 肝、脾、肾
  - 心、肺、脾
  - 心、肝、肺
14. 补阳还五汤适用于中风何证型
- 气血亏虚
  - 肝肾阴虚
  - 气虚络瘀
  - 风痰阻络
  - 肾虚精亏
15. 狂证痰火扰神证治疗方剂宜选
- 滚痰丸
  - 生铁落饮
  - 清气化痰丸
  - 顺气导痰汤
  - 温胆汤
16. 痫病发生的主要病理基础为何脏的损伤
- 肺、脾、肾
  - 心、肝、肾
  - 肝、脾、肾
  - 肺、肝、肾

- E. 心、肝、脾
17. 痴呆痰浊蒙窍证，若风痰瘀阻，应选用的方剂是
- A. 二陈汤  
B. 黄连温胆汤  
C. 半夏厚朴汤  
D. 半夏白术天麻汤  
E. 天麻钩藤饮
18. 胃痛的治疗，主要是
- A. 调肝理气止痛  
B. 调肝和胃止痛  
C. 理气和胃止痛  
D. 调理脾胃止痛  
E. 调肝理脾止痛
19. 胃痞与鼓胀的相同症状是
- A. 胀满之苦  
B. 外有胀大之形  
C. 触之无形  
D. 按之无痛  
E. 心下痞塞
20. 下列哪项不是实证呕吐的特点
- A. 发病较急  
B. 病程较短  
C. 多由外邪及饮食所伤而发  
D. 有邪实之象  
E. 时发时止
21. 下列关于噎膈的预防调护叙述中，错误的是
- A. 避免食用发霉的食物  
B. 每餐进食后不宜立即喝水  
C. 多食新鲜蔬菜、水果  
D. 戒烟酒  
E. 及时治疗食管慢性炎症
22. 呃逆的病位在
- A. 食管  
B. 膈  
C. 胃  
D. 脾  
E. 肝
23. 以腹痛的部位辨证，胁痛、少腹疼痛者，多属
- A. 肝胆病  
B. 虫证  
C. 肠痈  
D. 胃痛  
E. 膀胱病
24. 从下列泻下粪便中辨出何为湿热泄泻的特点
- A. 泄泻清稀甚至如水样  
B. 泄下粪色黄褐而臭  
C. 泄泻如水  
D. 泻下粪便臭如败卵，伴有不消化之物  
E. 时溇时泄，水谷不化
25. 寒湿痢的表现是
- A. 痢下赤白脓血，不甚臭秽  
B. 痢下鲜紫脓血  
C. 痢下纯为白冻  
D. 痢下赤多白少  
E. 痢下脓血黏稠
26. 大便干，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，舌淡苔白，脉沉迟。此属
- A. 气秘  
B. 冷秘  
C. 气虚秘  
D. 血虚秘  
E. 阳虚秘
27. 下列哪一项不是肝郁气滞胁痛的特点
- A. 胁肋胀痛  
B. 走窜不定  
C. 入夜痛甚  
D. 胸闷暖气  
E. 疼痛每因情志变化而增减
28. 黄疸脾虚湿滞证的治法是
- A. 温中化湿，健脾和胃  
B. 调和肝脾，理气助运  
C. 利湿化浊运脾，佐以清热  
D. 疏肝泄热，利胆退黄  
E. 健脾养血，利湿退黄
29. 下列哪项不是积证的特征
- A. 结块有形  
B. 结块固定不移  
C. 痛有定处  
D. 病在气分  
E. 是为脏病
30. 下列哪项是血鼓的特征
- A. 腹部胀满膨大  
B. 暖气或矢气则舒  
C. 腹臌大如蛙腹



- D. 按之如囊裹水  
E. 常伴下肢浮肿
31. 三焦经在上肢的循行部位是
- A. 外侧前缘  
B. 内侧中线  
C. 外侧后缘  
D. 内侧前缘  
E. 外侧中线
32. 下列哪组经脉没有按照气血循行流注顺序排列
- A. 胆经、肝经、肺经  
B. 心经、小肠经、肾经  
C. 大肠经、胃经、脾经  
D. 肾经、心包经、三焦经  
E. 三焦经、胆经、肝经
33. 手足三阴经在四肢肘膝关节以上的分布规律是
- A. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后  
B. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后  
C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后  
D. 少阴在前，厥阴在中，太阴在后  
E. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
34. 手阳明大肠经的主治特点是
- A. 后头. 神志病  
B. 侧头. 肋肋病  
C. 侧头. 耳病. 肋肋病侧  
D. 前头. 鼻. 口. 齿病  
E. 气喘. 咽喉病. 胃肠病
35. 八脉交会穴中通于阴维脉的腧穴是
- A. 列缺  
B. 内关  
C. 照海  
D. 公孙  
E. 大陵
36. 六阴经中，与原穴为同一腧穴的是
- A. 井穴  
B. 荥穴  
C. 输穴  
D. 经穴  
E. 合穴
37. 病在胃者及以饮食不节得病者，适用的特定穴为
- A. 井穴  
B. 荥穴  
C. 输穴  
D. 经穴  
E. 合穴
38. 肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线的骨度分寸是
- A. 1.5 寸  
B. 3 寸  
C. 4 寸  
D. 6 寸  
E. 8 寸
39. 循行“入下齿中”的经脉是
- A. 小肠经  
B. 大肠经  
C. 胃经  
D. 脾经  
E. 肝经
40. 经脉循行中，不与目内眦或目外眦发生联系的是
- A. 手少阳三焦经  
B. 手太阳小肠经  
C. 手阳明大肠经  
D. 足太阳膀胱经  
E. 足少阳胆经
41. 在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是
- A. 足太阴脾经  
B. 手厥阴心包经  
C. 足少阴肾经  
D. 足阳明胃经  
E. 手太阴肺经
42. 以下哪项不是三阴交穴的主治病证
- A. 脾胃虚弱证  
B. 妇产科病证  
C. 生殖泌尿系统病证  
D. 心悸、失眠  
E. 阳虚诸证
43. 下列腧穴中，治疗便秘效果较好的是
- A. 关冲  
B. 中渚  
C. 阳池  
D. 支沟  
E. 外关
44. 以下哪项不是得气的感觉或反应
- A. 针刺部位有酸胀、麻重感

- B. 针刺部位出现热、凉、痒、痛、抽搐、蚁行等感觉
- C. 患者出现循经性肌肤瞤动、震颤
- D. 医者刺手体会到针下空松、虚滑
- E. 医者刺手体会到针体颤动
45. 仰靠坐位适宜取哪些部位的腧穴
- A. 头、面、胸背部腧穴和上、下肢部分腧穴
- B. 身体侧面腧穴和上、下肢部分腧穴
- C. 头、项、脊背、腰骶部的腧穴
- D. 前头、颜面和颈前等部位的腧穴
- E. 后头和项、背部的腧穴
46. 有关提插法叙述不正确的是
- A. 将针刺入腧穴一定深度后，施以上提下插的操作
- B. 幅度不宜过大，一般以 3~5 分为宜
- C. 指力一定要均匀一致
- D. 频率应较快，每分钟 100 次左右
- E. 保持针身垂直
47. 有关灸法的注意事项，叙述不正确的是
- A. 先灸上部，后灸下部
- B. 先灸阴部，后灸阳部
- C. 壮数应先少后多
- D. 艾炷应先小后大
- E. 施灸也应注意补泻的操作方法
48. 留罐法的留置时间一般为
- A. 3~5 分钟
- B. 5~10 分钟
- C. 5~15 分钟
- D. 15~20 分钟
- E. 20~30 分钟
49. 下列哪项不是三棱针的常用操作方法
- A. 点刺法
- B. 散刺法
- C. 透刺法
- D. 刺络法
- E. 挑刺法
50. 位于耳垂正面中央部，即耳垂 5 区的耳穴是
- A. 舌
- B. 颌
- C. 牙
- D. 眼
- E. 内耳
51. 下列哪项不属于同名经配穴
- A. 耳鸣取中渚、足临泣
- B. 头痛取外关、阳陵泉
- C. 失眠取神门、三阴交
- D. 牙痛取合谷、内庭
- E. 便秘取天枢、合谷
52. 治疗郁证的主穴是
- A. 内关、水沟、丰隆、后溪、百会、印堂
- B. 内关、水沟、太冲、神门、百会、印堂
- C. 四神聪透百会、神庭透上星
- D. 照海、申脉、神门、印堂、百会
- E. 内关、郄门、神门、巨阙、印堂
53. 属于艾炷灸的是
- A. 温针灸
- B. 隔盐灸
- C. 回旋灸
- D. 温和灸
- E. 蒜泥灸
54. 以下腧穴中，治疗痢证有较好作用的是
- A. 长强
- B. 腰阳关
- C. 命门
- D. 秩边
- E. 志室
55. 华佗夹脊穴位于后正中线旁开 0.5 寸
- A. 第 1 颈椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- B. 第 7 颈椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- C. 第 1 胸椎至第 5 腰椎棘突下两侧
- D. 第 1 胸椎至第 12 胸椎棘突下两侧
- E. 第 1 胸椎至骶管裂孔棘突下两侧
56. 针灸治疗绝经前后诸症的主穴，除气海、三阴交外，还包括
- A. 肝俞、脾俞、太冲
- B. 肾俞、肝俞、太溪
- C. 脾俞、带脉、中极
- D. 肝俞、地机、足三里
- E. 肾俞、归来、命门
57. 后溪穴是手太阳小肠经的
- A. 荥穴
- B. 输穴
- C. 经穴
- D. 络穴

- E. 郄穴
58. 治疗产后乳少，或见乳房胀满疼痛，或见乳房柔软无胀感，针灸治疗应选用
- A. 乳根、太冲、期门  
B. 乳根、膻中、少泽  
C. 肝俞、太冲、期门  
D. 乳根、脾俞、足三里  
E. 中脘、天枢、期门
59. 日月的定位是
- A. 乳头直下，第 5 肋间隙，前正中线旁开 4 寸  
B. 乳头直下，第 6 肋间隙，前正中线旁开 4 寸  
C. 乳头直下，第 7 肋间隙，前正中线旁开 4 寸  
D. 第 11 肋游离端下际  
E. 侧腰部，第 12 肋游离端下际处
60. 落枕病在少阳经者，针灸治疗配
- A. 风池、肩井  
B. 大椎、束骨  
C. 风池、合谷  
D. 内关、合谷  
E. 肩髃、天宗

## 二、A2 型选择题 (61~102 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

61. 一患者男性，久居岭南，寒战，壮热，发作时热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘尿赤，舌红苔黄，脉弦数。治法宜
- A. 解毒除瘴，芳化湿浊  
B. 祛邪截疟，和解表里  
C. 清热解表，和解祛邪  
D. 和解表里，温阳达邪  
E. 解毒除瘴，清热保津
62. 患者因皮肤疮痍破溃而引发水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，恶风发热，咽红，舌红苔薄黄，脉滑数。治疗应首选
- A. 越婢加术汤合桑白皮汤  
B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮  
C. 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散  
D. 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤  
E. 实脾饮合五味消毒饮
63. 患者小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是
- A. 热淋  
B. 石淋  
C. 气淋  
D. 血淋  
E. 劳淋
64. 患者男性，65 岁，排尿不畅 3 年，加重 1 个月，小便点滴而出，小腹胀痛，腰膝酸痛，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉沉细无力，应诊为
- A. 淋证  
B. 关格  
C. 少尿  
D. 腰痛  
E. 癃闭
65. 患者精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸，舌淡苔薄白，脉弦细。其治法是
- A. 益气养血  
B. 补肾宁心  
C. 养心安神  
D. 解郁化痰  
E. 疏肝解郁
66. 患者男，65 岁，患痰饮病，症见喘促，动则尤甚，气短，咳而痰多，食少胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，小便不利，足跗浮肿，舌体胖大，质淡，苔白润，脉沉细而滑，辨证应属
- A. 支饮寒饮伏肺证  
B. 溢饮表寒里饮证  
C. 痰饮脾阳虚弱证  
D. 支饮脾肾阳虚证  
E. 悬饮饮停胸胁证
67. 患者烦渴多饮半月余，口干舌燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉洪数有力。治则宜用
- A. 清热润肺，生津止渴  
B. 养阴润肺，生津止渴  
C. 清胃泻火，养阴保津

- D. 滋阴固肾，生津止渴  
E. 滋养胃阴，生津止渴
68. 患者午后或夜间发热，自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不欲多饮，肢体疼痛，面色萎黄，舌有瘀点，脉弦。辨证应属
- A. 阴虚发热证  
B. 气虚发热证  
C. 血虚发热证  
D. 血瘀发热证  
E. 气郁发热证
69. 患者午后或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥，舌质红，苔少，脉细数。辨证应属
- A. 阴虚发热证  
B. 气虚发热证  
C. 血虚发热证  
D. 血瘀发热证  
E. 气郁发热证
70. 患者，女，60岁。年老体虚，近1年来，心悸气短，劳则尤甚，自汗面色晄白，头昏神疲，肢体无力，舌苔淡白，脉细软弱。治疗本病的首选方剂是
- A. 天王补心丹  
B. 养心汤  
C. 大补元煎  
D. 七福饮  
E. 加味四君子汤
71. 某患者，肢体关节疼痛较剧，部位固定，遇寒痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，舌质淡，苔薄白，脉弦紧，治疗方剂宜选
- A. 防风汤  
B. 双合汤  
C. 薏苡仁汤  
D. 乌头汤  
E. 宣痹汤
72. 患者肢体关节酸楚，重着，疼痛，关节活动不利，麻木不仁，舌苔白腻，脉濡缓。治疗应首选
- A. 独活寄生汤  
B. 蠲痹汤  
C. 薏苡仁汤  
D. 乌头汤  
E. 白虎加桂枝汤
73. 李某，女性，75岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是
- A. 地黄饮子  
B. 黄连温胆汤  
C. 龟鹿二仙膏合大定风珠  
D. 导痰汤合羚角钩藤汤  
E. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加減
74. 腰痛患者，腰部冷痛重着，转侧不利，静卧痛不减，遇阴雨天疼痛加重，舌苔白腻，脉沉缓。其证候是
- A. 寒湿腰痛  
B. 风寒腰痛  
C. 瘀血腰痛  
D. 湿热腰痛  
E. 肾虚腰痛
75. 患者大便不干硬，虽有便意，临厕努挣无力，挣则汗出短气，便后疲乏，面色苍白，舌淡嫩苔薄，脉虚。其治法是
- A. 补脾和胃  
B. 温阳通便  
C. 益气补肺  
D. 温中健脾  
E. 益气润肠
76. 李某，女，78岁。头摇不止，肢麻震颤，头晕目眩，胸脘痞闷，口苦口黏，舌体胖大，有齿痕，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑数。治疗此病证首选的方剂是
- A. 地黄饮子  
B. 黄连温胆汤  
C. 龟鹿二仙膏合大定风珠  
D. 导痰汤合羚角钩藤汤  
E. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加減
76. 某男，60岁，咳喘胸满，但坐不得卧，喉间痰鸣如拽锯，咯痰黏腻难出，舌苔厚浊，脉象滑实。治疗方剂宜首选
- A. 小青龙汤  
B. 射干麻黄汤  
C. 三子养亲汤  
D. 定喘汤  
E. 以上都不是
77. 患者呃声沉缓，膈间及胃脘不舒，遇寒加剧，得热则减，舌苔白润，脉沉缓，证属

- A. 胃寒呃逆
- B. 阴虚呃逆
- C. 阳虚呃逆
- D. 胃热呃逆
- E. 以上都不是

78 患者肺胀病史 20 年，呼吸浅促难续，声低气怯，倚息不能平卧，胸闷如窒，心慌，咳痰不爽，脉沉数无力。治疗应首选

- A. 金匱肾气丸
- B. 平喘固本汤
- C. 真武汤
- D. 大补元煎
- E. 七味都气丸

79 王某，男性，75 岁。反复咳喘 30 年多。现症：咳吐涎沫，其质清稀量多，不渴，短气不足以息，头眩，神疲乏力，食少，形寒，小便数，舌质淡，脉虚弱。其治疗应首选

- A. 麻黄升麻汤
- B. 生姜甘草汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 七味都气丸
- E. 麦门冬汤

80 患者突发眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳、郁怒而加重，甚则仆倒，颜面潮红，急躁易怒，肢麻震颤，舌红苔黄，脉弦或数。证属

- A. 肝肾亏虚
- B. 痰火上扰
- C. 痰瘀阻窍
- D. 肝阳上亢
- E. 气血亏虚

81 刘某，女，34 岁。有痫证病史 16 年。近 1 年来，痫证发作日益频繁，自觉发作后神疲乏力，平素头晕目眩，心悸，失眠多梦，纳呆，大便溏薄，舌苔腻，脉细弱无力。治法当为

- A. 补益气血，健脾宁心
- B. 补益心肾，健脾化痰
- C. 健脾补肾，健脑宁神
- D. 平肝健脾，补肾宁神
- E. 平肝息风，健脾补肾

82 患者突然跌倒，神志不清，口吐涎沫，

两目上视，四肢抽搐，口中如作猪羊叫声，移时苏醒，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 导痰汤
- C. 二阴煎
- D. 涤痰汤
- E. 控涎丹

83 某男，70 岁，大便艰涩，排出困难，腹中冷痛，面色晄白，四肢不温，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗本病，除主穴外，还应加用

- A. 合谷、内庭
- B. 太冲、中脘
- C. 脾俞、气海
- D. 神阙、关元
- E. 足三里、三阴交

83 某男，70 岁，大便艰涩，排出困难，腹中冷痛，面色晄白，四肢不温，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗本病，除主穴外，还应加用

- A. 合谷、内庭
- B. 太冲、中脘
- C. 脾俞、气海
- D. 神阙、关元
- E. 足三里、三阴交

84 某男，50 岁，腹泻 2 年。晨起即腹痛，泻后痛减，腹冷喜暖，精神疲乏，腰酸腿软，四肢发冷，舌淡，苔白，脉沉细。治疗除神阙、天枢、足三里、公孙外，应加用

- A. 阴陵泉、命门
- B. 阴陵泉、脾俞
- C. 脾俞、太白
- D. 肾俞、关元
- E. 下脘、关元

85 某男，63 岁，头晕目眩，甚则昏眩欲仆，伴耳鸣，腰膝酸软，遗精，舌淡，脉沉细。除风池、百会外，应加用

- A. 内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B. 内关、太冲、头维、丰隆、中脘
- C. 肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D. 肝俞、肾俞、足三里、太溪、悬钟、三阴交
- E. 头维、血海、膈俞、内关、足三里、太溪

86. 某男, 37 岁, 最近工作压力较大, 出现心慌心跳, 头晕目眩, 少寐, 腰酸, 盗汗, 舌红, 脉细数。治疗除主穴外, 宜加取
- A. 肾俞、太溪  
B. 肾俞、中渚  
C. 肾俞、大陵  
D. 膻中、气海  
E. 膻中、大陵
87. 患者, 男, 37 岁, 右上腹痛, 阵发性加剧, 并向右肩部放射, 伴有恶心、呕吐, 针灸取穴除阳陵泉、日月外, 还可用
- A. 胆囊穴、胆俞  
B. 阑尾穴、中脘  
C. 胆囊穴、京门  
D. 中脘、天枢  
E. 梁丘、太冲
88. 某女, 36 岁, 经血淋漓不净 30 天, 血色淡, 质稀薄, 伴面色萎黄, 神疲肢倦, 舌淡, 苔白, 脉沉细无力。除气海、三阴交、足三里、肾俞外, 应加取
- A. 肾俞、命门  
B. 然谷、太溪  
C. 百会、脾俞  
D. 隐白、血海  
E. 隐白、地机
89. 某女, 20 岁, 食海鲜后皮肤出现大小不等, 形状不一的风团, 高起皮肤, 边界清楚, 色红, 瘙痒, 伴恶心, 肠鸣泄泻, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。除曲池、合谷、血海、膈俞、三阴交外, 应加取
- A. 外关、风池  
B. 足三里、天枢  
C. 三阴交、天枢  
D. 足三里、大横  
E. 三阴交、风池
90. 某男, 75 岁, 咽喉微感疼痛, 色暗红, 入夜尤甚。针灸治疗主穴选取
- A. 尺泽、合谷、少商、照海  
B. 关冲、合谷、少商、列缺  
C. 关冲、厉兑、鱼际、内庭  
D. 太溪、照海、鱼际、列缺  
E. 太溪、曲池、鱼际、合谷
91. 某女, 53 岁, 右上齿痛半年, 隐隐作痛, 时作时止, 脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上, 应加取
- A. 外关、风池  
B. 内庭、二间  
C. 太溪、行间  
D. 风池、侠溪  
E. 风池、太冲
92. 某男, 40 岁, 阑尾手术后, 出现小便闭塞不通, 努责无效, 小腹满痛, 舌紫暗, 脉涩。除秩边、阴陵泉、三阴交、中极、膀胱俞外, 应加取
- A. 委阳、曲骨  
B. 太冲、大敦  
C. 次髎、血海  
D. 曲骨、太冲  
E. 次髎、太冲
93. 患儿, 男, 8 岁。平时注意力不集中、冲动任性, 急躁易怒, 五心烦热, 潮热盗汗, 舌红苔黄脉细数。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是
- A. 心俞、脾俞  
B. 阴郄、复溜  
C. 照海、神庭  
D. 中脘、足三里  
E. 三阴交、太冲
94. 患者, 男, 24 岁。长期在电脑前工作, 近来出现颈项强痛, 活动受限, 昨日因感受风寒后, 症状加重, 疼痛更加明显。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是
- A. 膈俞、合谷  
B. 合谷、列缺  
C. 合谷、手三里  
D. 百会、四神聪  
E. 肝俞、肾俞
95. 患者, 男, 50 岁。腰部疼痛 10 余年, 有劳伤史, 久坐加重, 病处固定不移。治疗除取主穴外, 还应选用的穴位是
- A. 膈俞  
B. 肾俞  
C. 膏肓  
D. 腰阳关  
E. 环跳
96. 患者, 女性, 50 岁。月经紊乱, 潮热出汗, 心悸, 情绪不稳定, 兼头晕耳鸣,

失眠多梦，心烦易怒，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸软，口干，小便黄，舌红，苔少，脉数者，治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 行间、侠溪
- B. 太溪、太冲
- C. 膻中、期门
- D. 照海、阴谷
- E. 三阴交、太溪

97. 患者，女，23岁。痛经9个月，经行不畅，小腹胀痛，拒按，经色紫红，夹有血块，血块下后痛即缓解，脉沉涩。治疗应首选A. 足三里、太冲、三阴交

- B. 中极、次髎、地机
- C. 合谷、三阴交
- D. 曲池、内庭
- E. 合谷、归来

98. 患儿，男，10岁。上课时小动作多，注意力涣散，自我控制能力差，情绪不稳定。针灸治疗应选取的经脉是

- A. 督脉、手少阴、手厥阴经
- B. 任脉、手少阴、足少阴经
- C. 任脉、手少阴、手厥阴经
- D. 督脉、足少阴、足厥阴经
- E. 手少阴、足少阴经

99. 患者，男，45岁。关节肌肉疼痛，屈伸不利，疼痛较剧，痛有定处，遇寒痛增，得热痛减，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。治疗除选用阿是穴、局部经穴外，还应选用的穴位是

- A. 肾俞、关元
- B. 阴陵泉、足三里
- C. 大椎、曲池
- D. 膈俞、关元
- E. 膈俞、血海

100. 患者，女，30岁，今日发现乳房胀痛，有肿块。伴有急躁易怒，肿块和胀痛随喜怒消长，舌红，苔黄，脉弦滑。治疗除主穴外，还应选择配穴

- A. 足三里、丰隆
- B. 肝俞、肾俞
- C. 关元、肾俞
- D. 肝俞、内关
- E. 丰隆、中脘

101. 患者，男性，35岁，咽喉红肿疼痛，吞咽困难，口渴喜饮，大便秘结，舌红苔黄，脉数。针灸治疗应选取

- A. 鱼际、合谷、少商、照海
- B. 关冲、合谷、尺泽、列缺
- C. 关冲、少商、鱼际、内庭
- D. 太溪、照海、鱼际、列缺
- E. 少商、曲池、鱼际、尺泽

102. 患者，男，45岁。大便秘结不通，排便艰难，伴腹胀痛，身热，口干口臭，喜冷饮，舌红，苔黄，脉滑数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 中脘、太冲
- B. 神阙、关元
- C. 足三里、脾俞
- D. 合谷、曲池
- E. 气海、脾俞

### 三、A3型选择题（103~120题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（103~105题共用题干）

患者，男，37岁，阳痿不举，心悸，失眠多梦，神疲乏力，面色萎黄，食少纳呆，腹胀便溏，舌淡，苔薄白，脉细弱。

103. 该病诊断为阳痿什么证型

- A. 心脾亏虚
- B. 肝郁不舒
- C. 命门火衰
- D. 肺肾亏虚
- E. 脾肾亏虚

104. 治法是

- A. 温肾壮阳
- B. 补脾益肾
- C. 益肾宁神
- D. 疏肝解郁
- E. 补益心脾

105. 代表方剂是

- A. 赞育丸
- B. 归脾汤

- C. 启阳娱心丹
- D. 济生肾气丸
- E. 无比山药丸

(106~108 题共用题干)

患者常出现心悸气短，头晕目眩，平时失眠健忘，现面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

106. 该病病机分析是

- A. 气血亏损，心虚胆怯，心神失养
- B. 心血亏耗，心失所养，心神不宁
- C. 脾肾阳虚，水饮内停，上凌于心，扰乱心神
- D. 心阳虚衰，无以温养心神
- E. 肝肾阴虚，水不济火，心火内动，扰动心神

107. 该病选方为

- A. 炙甘草汤
- B. 桃仁红花煎
- C. 安神定志丸
- D. 苓桂术甘汤
- E. 归脾汤

108. 若热病后期损及心阴而心悸者，以

- A. 生脉散
- B. 炙甘草汤
- C. 清燥救肺汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 苓桂术甘汤

(109~111 题共用题干)

患者女，呃声低长无力，气不得续，自觉脘腹不舒，喜温喜按，面色皤白，食少乏力，大便溏薄，舌质淡，苔薄白，脉细弱。109. 该病诊断为

- A. 呃逆
- B. 反胃
- C. 暖气
- D. 胃痞
- E. 干呕

110. 治法应为

- A. 温中散寒，降逆止呃
- B. 温补脾胃，降逆止呃
- C. 清胃泄热，降逆止呃
- D. 顺气解郁，和胃降逆
- E. 养胃生津，降逆止呃

111. 若呃声难续，气短乏力，中气大亏者，可改用

- A. 参苓白术散
- B. 理中丸
- C. 生脉散
- D. 人参养荣汤
- E. 补中益气汤

(112~114 题共用题干)

患者，女，35岁，偶然发现结块肿大，质软不痛，颈部觉胀，胸闷，喜太息，或兼胸胁窜痛，病情常随情志波动，苔薄白，脉弦。

112. 属中医的

- A. 梅核气
- B. 癭病
- C. 癥瘕
- D. 郁证
- E. 失荣

113. 辨证为

- A. 肝郁气滞证
- B. 肝肾不足证
- C. 痰结血瘀证
- D. 气郁痰阻证
- E. 冲任失调证

114. 治疗应选代表方剂为

- A. 一贯煎
- B. 栀子清肝汤
- C. 海藻玉壶汤
- D. 开郁散
- E. 四海舒郁丸

(115~118 题共用题干)

患者，女，65岁。咳嗽5天。咳嗽声重，气急，咽痒，咳痰稀薄色白，鼻塞，流清涕，头痛，肢体酸楚，舌苔薄白，脉浮。

115. 其病证候是

- A. 风燥伤肺证
- B. 痰热伤肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 风寒袭肺证
- E. 风热犯肺证

116. 其治法是

- A. 疏风清肺，润燥止咳
- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清热，宣肺止咳
- D. 清肺泻肝，顺气降火



- E. 清热肃肺，豁痰止咳
117. 治疗应首选
- A. 三拗汤合止嗽散加减  
B. 黛蛤散合黄芩泻白散加减  
C. 桑杏汤加减  
D. 清金化痰汤加减  
E. 桑菊饮加减
118. 若素有寒饮伏肺，兼见咳嗽上气，痰液清稀，胸闷气急，舌淡红，苔白而滑，脉浮紧者，可改投
- A. 沙参麦冬汤  
B. 二陈平胃散  
C. 桑杏汤  
D. 清金化痰汤加减  
E. 小青龙汤
- (119~120 题共用题干)
- 患者，女，43 岁。小便不畅或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌红，苔薄黄，脉数。
119. 该病治法为
- A. 升清降浊，化气行水  
B. 清泄肺热，通利水道  
C. 疏利气机，通利小便  
D. 行瘀散结，通利水道  
E. 清利湿热，通利小便
120. 若出现肺阴不足者，可加哪些药
- A. 生地黄、车前子、牛膝  
B. 黄芪、丹参、当归  
C. 丹皮、山栀  
D. 沙参、黄精、石斛  
E. 车前子、通草、制大黄

#### 四、B1 型选择题 (121~150 题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用 在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~123 题共用备选答案)

- A. 玉屏风散  
B. 补中益气汤

- C. 再造散  
D. 参苏饮  
E. 加减葶藶汤
121. 气虚感冒的代表方宜首选  
122. 阳虚感冒的代表方宜首选  
123. 阴虚感冒的代表方宜首选  
(124~125 题共用备选答案)
- A. 二陈汤合三子养亲汤  
B. 清金化痰汤  
C. 桑杏汤  
D. 黛蛤散合黄芩泻白散  
E. 三拗汤合止嗽散
124. 治疗肝火犯肺型咳嗽的代表方剂是  
125. 治疗痰湿蕴肺型咳嗽的代表方剂是  
(126~128 题共用备选答案)
- A. 养血祛风通络  
B. 平肝潜阳，活血通络  
C. 息风化痰，活血通络  
D. 化痰息风，宣郁开窍  
E. 回阳救阴，益气固脱
126. 中风中脏腑脱证的治法是  
127. 中风中脏腑风痰瘀阻证的治法是  
128. 中经络风阳上扰证的治法是  
(129~130 题共用备选答案)
- A. 千金苇茎汤合如金解毒散  
B. 银翘散  
C. 葶苈大枣泻肺汤  
D. 沙参麦冬汤或桔梗杏仁煎  
E. 加味桔梗汤
129. 肺痈初期应选  
130. 肺痈成痈期应选  
(131~132 题共用备选答案)
- A. 痫病  
B. 眩晕  
C. 厥证  
D. 昏迷  
E. 中风
131. 突然昏仆，并伴有口眼喎斜、偏瘫等症，神昏时间较长，苏醒后有偏瘫、口眼喎斜及失语等后遗症。此为  
132. 头晕目眩，视物旋转不定，甚则不能站立，耳鸣，但无神志异常的表现。此为  
133. 突然昏仆，不省人事，但发作时间短

暂，且发作时常伴有号叫、抽搐、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等。常反复发作，每次症状均相类似，苏醒缓解后可如常人。此为

(134~135 题共用备选答案)

- A. 肺卫不固证
- B. 心血不足证
- C. 阴虚火旺证
- D. 邪热郁蒸证
- E. 脾胃虚弱证

134. 汗证，汗出恶风，稍劳汗出尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华，苔薄白，脉细弱。辨证应属

135. 汗证，自汗或盗汗，神疲气短，面色不华，舌质淡，脉细。辨证应属

(136~137 题共用备选答案)

- A. 心阳虚证
- B. 心气虚证
- C. 肾气虚证
- D. 肾阳虚证
- E. 阴虚证

136. 七福饮治疗虚劳的证型为

137. 大补元煎治疗虚劳的证型为

(138~140 题共用备选答案)

- A. 病起发热，皮肤干燥，咳呛少痰
- B. 肢体困重，手足麻木，喜凉恶热
- C. 神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言
- D. 腰膝酸软，眩晕耳鸣，舌咽干燥
- E. 手足麻木不仁，四肢青筋显露，舌痿不能伸缩

138. 痿证之湿热浸淫证症见

139. 痿证之脉络瘀阻证症见

140. 痿证之脾胃虚弱证症见

(141~142 题共用备选答案)

- A. 从胸走手
- B. 从手走胸
- C. 从手走头
- D. 从头走足
- E. 从胸腹走足

141. 足三阳经的循行走向规律是

142. 手三阴的循行走向规律是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 下脘
- B. 建里

- C. 中极
- D. 上脘
- E. 关元

143. 位于前正中线上，脐上 3 寸的腧穴是

144. 位于前正中线上，脐上 5 寸的腧穴是  
(145~146 题共用备选答案)

A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长

B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短

C. 病人吸气时进针，呼气时出针

D. 出针时摇大针孔而不按压

E. 出针后迅速按压针孔

145. 属于提插补法操作的是

146. 属于开阖补法操作的是  
(147~148 题共用备选答案)

A. 手太阴. 手太阳经穴

B. 手太阴. 足太阴经穴

C. 手太阴. 手阳明经穴

D. 手太阴. 足太阳经穴

E. 手太阴. 手少阳经穴

147. 外感咳嗽，宜选用

148. 内伤咳嗽，宜选用

(149~150 题共用备选答案)

A. 陷下则灸之

B. 热则疾之

C. 寒则留之

D. 标本同治

E. 三因制宜

149. 以上哪项属于补虚泻实的治疗原则

150. 以上哪项属于治病求本的治疗原则

## 第四单元

### 一、A1 型选择题 (1~54 题)

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 产后浆液性恶露的持续天数是

- A. 3~4

- B. 5~6  
C. 7~10  
D. 10~12  
E. 12~14
2. 下列哪项不属于月经病的临床表现
- A. 月经周期缩短, 不及 20 天  
B. 月经周期正常, 经量明显增多  
C. 月经 40~60 天一行, 或 3~5 个月一行  
D. 行经期不足 2 天或超过 7 天以上  
E. 月经常每两月来潮一次, 无不适
3. 半夏白术天麻汤用于治疗经行头痛的证型为
- A. 血瘀证  
B. 肝火证  
C. 痰火上扰证  
D. 痰湿中阻证  
E. 肝阳上亢证
4. 经行泄泻主要责之于
- A. 肝脾虚弱  
B. 脾胃虚弱  
C. 脾肾虚弱  
D. 肝胃虚弱  
E. 肝肾虚弱
5. 下列各项, 属产后三病的是
- A. 产后血晕、产后发热、产后腹痛  
B. 产后痉病、产后大便难、产后郁冒  
C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛  
D. 产后呕吐、泄泻、盗汗  
E. 产后冲心、冲肺、冲胃
6. 痛经气滞血瘀证的腹痛特点是
- A. 冷痛拒按  
B. 灼痛不适  
C. 隐隐作痛  
D. 胀痛拒按  
E. 绵绵作痛
7. 经行乳房胀痛胃虚痰滞证治法为
- A. 健胃祛痰, 和胃通络  
B. 健胃祛痰, 活血止痛  
C. 燥湿化痰, 和胃通络  
D. 理气化痰, 化瘀止痛  
E. 养胃益阴, 活血止痛
8. 妊娠病的常见发病机理除外哪一项
- A. 阴血虚  
B. 脾肾虚  
C. 冲气上逆  
D. 气滞  
E. 瘀血内阻
9. 导致崩漏的常见病因病机是
- A. 肾虚. 脾虚. 血热. 血瘀  
B. 肾虚. 脾虚. 血热. 血寒  
C. 肾虚. 脾虚. 肝郁. 血瘀  
D. 肾虚. 脾虚. 肝郁. 血热  
E. 肾虚. 脾虚. 湿热. 血瘀
10. 下列各项, 不属于癥瘕主要病因的是
- A. 气滞血瘀  
B. 气虚血瘀  
C. 痰湿瘀结  
D. 湿热瘀阻  
E. 肾虚血瘀
11. 产后三急是指
- A. 产后血晕、产后痉病、产后腹痛  
B. 产后病痉、产后大便难、产后郁冒  
C. 产后小便不通、产后恶露不绝、产后小便淋痛  
D. 产后呕吐、泄泻、盗汗  
E. 产后冲心、冲肺、冲胃
12. 子门是指
- A. 外阴  
B. 阴道口  
C. 阴道  
D. 宫颈口  
E. 子宫
13. 胎儿期易发生先天畸形的是
- A. 妊娠早期 4 周  
B. 妊娠早期 12 周  
C. 妊娠中期 10 周  
D. 妊娠中期 15 周  
E. 妊娠晚期 13 周
14. 小儿易产生感冒、咳嗽, 原因主要是
- A. 脾常不足  
B. 肺脏娇嫩  
C. 肾常虚  
D. 稚阳未充  
E. 稚阴未长
15. 新生儿中药用量应为成人量的
- A. 1 / 6  
B. 1 / 3

- C. 1/2  
D. 2/3  
E. 等量
16. 前囟关闭的时间为出生后  
A. 2~4 个月  
B. 4~6 个月  
C. 6~12 个月  
D. 12~18 个月  
E. 18~24 个月
17. 下列属于病理性黄疸的是  
A. 生后 24h 以内出现黄疸  
B. 生后第 2~3 日出现黄疸, 第 4~6 日达高峰  
C. 足月儿在生后 2 周消退, 早产儿可延迟至 3~4 周消退  
D. 足月儿血清总胆红素  $\leq 221 \mu\text{mol/L}$ , 早产儿  $\leq 257 \mu\text{mol/L}$   
E. 小儿一般情况良好, 除偶有轻微食欲不振外, 不伴有其他临床症状
18. 反复呼吸道感染, 营卫失调证的主治方  
A. 桂枝汤  
B. 麻黄汤  
C. 小青龙汤  
D. 黄芪桂枝五物汤  
E. 玉屏风散
19. 治疗脾虚泻的首选方是  
A. 保和丸  
B. 平胃散  
C. 参苓白术散  
D. 藿香正气散  
E. 附子理中汤
20. 患儿, 1 岁 6 个月。体重 9kg, 纳呆, 面色少华, 性急易怒, 大便干稀不调, 舌质淡, 苔薄微腻, 指纹淡。其诊断是  
A. 厌食  
B. 疳气  
C. 疳积  
D. 干疳  
E. 积滞
21. 病毒性心肌炎急性期应卧床休息的时间为  
周  
A. 1~3 周  
C. 3~6 周  
D. 6~12 周  
E. 6~12 个月
22. 下列哪项不属于五迟的范畴  
A. 坐迟  
B. 立迟  
C. 行迟  
D. 齿迟  
E. 语迟
23. 治疗麻疹逆证邪毒攻喉证的首选方剂是  
A. 定喘汤  
B. 清咽下痰汤  
C. 银翘散  
D. 黄连解毒汤  
E. 麻杏石甘汤
24. 治疗蛲虫病首选方剂为  
A. 化虫丸  
B. 驱虫粉  
C. 使君子散  
D. 追虫丸  
E. 贯众汤
25. 下列各项中不属劳伤虚损的是  
A. 过度劳力  
B. 食伤  
C. 过度劳神  
D. 妇女生育过多  
E. 房事过度
26. 阳证的皮肤颜色主要是  
A. 红赤  
B. 晦暗  
C. 青紫  
D. 苍白  
E. 皮色不变
27. 痒的常见病因是  
A. 风胜. 湿胜. 热胜. 虫淫. 血虚  
B. 风胜. 热胜. 湿胜. 阴虚. 血虚  
C. 风胜. 湿胜. 热胜. 燥胜. 阴虚  
D. 风胜. 热胜. 湿胜. 虫淫. 阴虚  
E. 风胜. 湿胜. 热胜. 血虚. 火胜
28. 具有腐蚀性的膏药是  
A. 千捶膏  
B. 太乙膏  
C. 咬头膏  
D. 阳和解凝膏

- E. 红油膏
29. 生于下列哪一部位的有头疽易致内陷
- A. 项后  
B. 四肢  
C. 颜面  
D. 少腹部  
E. 臁中
30. 对单发的乳核宜采用何种治疗方法
- A. 手术切除  
B. 中药治疗  
C. 放射治疗  
D. 抗癆治疗  
E. 以上都不是
31. 脂瘤痰气凝结证选用的方剂为
- A. 柴胡疏肝汤  
B. 逍遥散  
C. 开郁散  
D. 海藻玉壶汤  
E. 二陈汤合四七汤
32. 以下哪一项为淋病临床特点
- A. 龟头红肿，包皮内有多量脓性分泌物  
B. 外生殖器有多个痛性溃疡，表面有脓性分泌物，尿道口红肿  
C. 尿道分泌物少，为黏液状  
D. 尿道口刺痛，尿道口排出脓性分泌物  
E. 外生殖器多为单个无痛性溃疡
33. 白秃疮的西医病名是
- A. 黄癣  
B. 白癣  
C. 手癣  
D. 脚癣  
E. 股癣
34. 下列哪种疾病无脱垂症状
- A. II期内痔  
B. 肛裂  
C. 混合痔  
D. 息肉痔  
E. 脱肛
35. 精浊之气滞血瘀证的代表方剂是
- A. 前列腺汤  
B. 八正散  
C. 龙胆泻肝汤  
D. 抵当丸  
E. 知柏地黄汤
36. 破伤风前驱期不应有的症状是
- A. 头痛、头晕  
B. 乏力、多汗  
C. 烦躁、打呵欠  
D. 咀嚼无力  
E. 张口困难
37. 某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为
- A. 散发  
B. 暴发  
C. 流行  
D. 流行性  
E. 大流行
38. 传染病病原学诊断的“金指标”是
- A. 血常规检查  
B. 大便常规检查  
C. 分子杂交技术  
D. 聚合酶链反应  
E. 病原体分离培养
39. 慢性乙型肝炎的治疗关键是
- A. 休息  
B. 保肝  
C. 降酶  
D. 抗病毒  
E. 调节免疫
40. 流行性出血热的“三痛”是
- A. 头痛、全身痛和腰痛  
B. 头痛、关节痛和腰痛  
C. 头痛、腓肠肌痛和腰痛  
D. 头痛、眼眶痛和腰痛  
E. 头痛、腹痛和腰痛
41. 狂犬病的传播途径不包括
- A. 眼结膜  
B. 肛门粘膜  
C. 胃肠粘膜  
D. 角膜移植  
E. 呼吸道
42. 霍乱的典型临床表现是
- A. 先泻后吐  
B. 先吐后泻  
C. 只泻不吐  
D. 腹泻伴腹痛  
E. 吐泻同时发生
43. 流感的症状最主要的是

- A. 全身中毒症状  
B. 发热  
C. 呼吸道症状  
D. 消化道症状  
E. 循环系统症状
44. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期  
A. 潜伏期  
B. 初期  
C. 极期  
D. 缓解期  
E. 恢复期
45. 慢性乙型肝炎的治疗关键是  
A. 休息  
B. 保肝  
C. 降酶  
D. 抗病毒  
E. 调节免疫
46. 伤寒第一次菌血症相当于临床上的哪一期  
A. 潜伏期  
B. 初期  
C. 极期  
D. 缓解期  
E. 恢复期
47. 有关隔离的描述，错误的是  
A. 是控制传染病流行的重要措施  
B. 便于管理传染源  
C. 可防止病原体向外扩散给他人  
D. 根据传染病的平均传染期来确定隔离期限  
E. 某些传染病患者解除隔离后尚应进行追踪观察
48. 有关医院感染的概念，错误的是  
A. 是指在医院内获得的感染  
B. 出院之后的感染有可能是医院感染  
C. 与上次住院有关的感染是医院感染  
D. 入院时处于潜伏期的感染不一定是医院感染  
E. 婴幼儿经胎盘获得的感染属医院感染
49. 下列各项中，在整个卫生法律体系中享有最高法律效力的规范性文件是  
A. 《中华人民共和国刑法》  
B. 《中华人民共和国宪法》  
C. 《中华人民共和国民法通则》  
D. 《中华人民共和国食品安全法》  
E. 以上均不是
50. 下列关于卫生民事责任的特征叙述错误的是  
A. 主要是财产责任  
B. 是补偿当事人的损失  
C. 是一方当事人对另一方的责任  
D. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系  
E. 在法律允许的条件下，民事责任可以由当事人协商解决
51. 《中华人民共和国药品管理法》规定的药品是指用于  
A. 防病、治病的特殊商品  
B. 预防、治疗人的疾病的物质  
C. 预防、诊断人的疾病的物质  
D. 预防、治疗、诊断人的疾病的物质  
E. 预防、治疗、诊断人及动物疾病的物质
52. 下列关于假药的情形叙述正确的是  
A. 变质的药品  
B. 被污染的药品  
C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品  
D. 所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的药品  
E. 以上均是
53. 关于突发公共卫生事件的应急预案措施中，有关部门及医疗卫生机构应当对传染病做到下列哪“四早”  
A. 早发现、早报告、早隔离、早治疗  
B. 早发现、早隔离、早诊断、早治疗  
C. 早发现、早报告、早诊断、早治疗  
D. 早发现、早报告、早诊断、早治疗  
E. 早发现、早报告、早观察、早治疗
54. 下列各项中，属于发生医疗事故争议时，应在医患双方在场的情况下封存和启封的材料是  
A. 会诊意见  
B. 手术同意书  
C. 特殊检查同意书  
D. 手术及麻醉记录单  
E. 医学影像检查资料

## 二、A2 型选择题 (55~87 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

55. 患者，女，26 岁。多次发生经间期出血，此次阴道出血量稍多，色深红，质粘腻，无血块，平素带下量多色黄，时现异味，小腹隐痛，神疲乏力，胸闷烦躁，纳呆腹胀，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数辨属何证
- A. 脾虚证  
B. 血瘀证  
C. 肝郁证  
D. 血热证  
E. 湿热证
56. 患者经行量多，色淡红，质清稀，神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色㿔白，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法为
- A. 益气清热，固冲止血  
B. 清热凉血，固冲止血  
C. 养阴清热止血  
D. 活血化瘀止血  
E. 补气摄血固冲
57. 田某，女，27 岁。结婚三年，孕 3 产 0，自然流产 3 次，均在孕 50 天时自然殒堕。现停经 7 周，尿妊娠试验阳性，伴有恶心，呕吐，夜尿频多等早孕反应，2 天前出现阴道少量流血，但无腰酸腹痛。B 超提示：宫内早孕。妇科检查：宫口未开，子宫增大，符合停经月份。此病案诊断为
- A. 堕胎  
B. 小产  
C. 胎堕不全  
D. 滑胎  
E. 胎动难留
58. 一孕妇，孕 6 月余，小便频数，艰涩刺痛，尿少色黄，伴面赤心烦，喜冷饮，舌上溃疡，舌红欠润，少苔，脉细数，治疗首选
- A. 五苓散  
B. 导赤散  
C. 保阴煎  
D. 龙胆泻肝汤  
E. 知柏地黄丸
59. 妊娠 8 个月，腹部异常增大，胸膈满闷，呼吸短促，神疲倦怠，小便短少，喘不得卧，舌质淡苔白，脉沉滑动。最佳治法是
- A. 逐水消肿，养血安胎  
B. 疏肝健脾，逐水消肿  
C. 滋肾健脾，温阳利水  
D. 温肾健脾，泻肺利水  
E. 健脾利水，养血安胎
60. 某患者停经 50 天，阴道少量出血 3 天；伴小腹隐痛，腰酸，恶心，纳差；舌淡红，苔白，脉细滑；妊娠试验阳性。应诊断为
- A. 胎漏  
B. 胎动不安  
C. 胎死不下  
D. 胎堕难留  
E. 激经
61. 患者，女，25 岁，自诉 3 天来带下量多，赤白相兼，质黏腻，臭秽难闻，小腹疼痛，腰酸腹痛，烦热头晕，口苦咽干，小便短赤，大便干结；舌红，苔黄，脉滑数。治疗首选方剂是
- A. 五味消毒饮  
B. 完带汤  
C. 易黄汤  
D. 知柏地黄丸  
E. 止带方
62. 一产妇分娩数日后，肢体关节疼痛，屈伸不利或痛无定处或冷痛剧烈，宛如针刺，得热则舒，伴恶寒怕风，脉濡细。最佳选方是
- A. 黄芪桂枝五物汤  
B. 独活寄生汤  
C. 生化汤  
D. 身痛逐瘀汤  
E. 养荣壮肾汤
63. 急性盆腔炎患者，下腹部疼痛拒按，寒热往来，带下量多、色黄、质稠、味臭秽，经量增多，经期延长，淋漓不止，大便燥结，小便短赤；舌红有瘀点，苔黄厚，脉弦滑。治疗首选

- A. 五味消毒饮  
B. 清营汤  
C. 大黄牡丹汤  
D. 仙方活命饮  
E. 犀角地黄汤
64. 一妇人产后遍身关节酸楚，疼痛，肢体麻木，面色萎黄，头晕，心悸，舌淡，苔薄，脉细弱。最佳治法是
- A. 养血活血，温阳通络  
B. 疏肝养血，通络止痛  
C. 养血益气，温经通络  
D. 养血温中，通络止痛  
E. 养血滋阴，通络止痛
65. 某妇人月经错后，经血量少，色淡红，质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按；腰酸无力，小便清长，大便稀溏；舌淡，苔白，脉沉迟。应选方
- A. 生化汤  
B. 《金匱》温经汤  
C. 《良方》温经汤  
D. 乌药汤  
E. 大补元煎
66. 患儿，2岁。发热3~4天出疹，疹形细小，状如麻粒，口腔黏膜出现“麻疹黏膜斑”者，为
- A. 口疮  
B. 鹅口疮  
C. 麻疹  
D. 疔腮  
E. 发颐
67. 患儿，出生32天。症见面目皮肤发黄，色泽晦暗，持久不退，精神萎靡，四肢欠温，纳呆，大便溏薄色灰白，小便短少，舌质淡，苔白腻。其证候是
- A. 寒湿阻滞  
B. 气滞血瘀  
C. 湿热郁蒸  
D. 胎黄动风  
E. 胎黄虚脱
68. 患儿，3岁。平素反复外感。面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。其治法是
- A. 调和营卫，益气固表  
B. 温补肾阳，健脾益气  
C. 养阴润肺，益气健脾  
D. 补肺固表，健脾益气  
E. 健脾益气，养阴益胃
69. 患儿，5岁。咳嗽喘促半天。证见气喘，喉间哮鸣，咳嗽，胸闷，痰稀色白有泡沫，喷嚏鼻塞，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌质淡红，苔薄白，脉浮紧，指纹红。其治法是
- A. 温肺散寒，涤痰定喘  
B. 清肺涤痰，止咳平喘  
C. 解表清里，定喘止咳  
D. 泻肺补肾，标本兼顾  
E. 健脾温肾，固摄纳气
70. 患儿，7岁。反复咳嗽喘促3年余。证见咳嗽喘促，动则喘甚，胸闷气短，面色欠华，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白，脉细弱。治疗首选方
- A. 苏葶九  
B. 华盖散  
C. 苏子降气汤  
D. 小青龙汤  
E. 金匱肾气丸
71. 痫证患儿，发作时突然仆倒，神志不清，颈项及全身强直，继而四肢抽搐，两目上视，牙关紧闭，口吐白沫，口唇及面部色青，舌苔白，脉弦滑。治疗应首选方剂是
- A. 定痫丸  
B. 远志丸  
C. 定魄丸  
D. 镇惊丸  
E. 涤痰汤
72. 患儿，7岁。面红耳赤，烦躁易怒，皱眉眨眼，张口歪嘴，摇头耸肩，发作频繁，抽动有力，日出异声秽语，大便秘结，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。应诊断为
- A. 惊风  
B. 癫痫  
C. 抽动障碍



- D. 注意力缺陷多动症
- E. 痉挛症
73. 患儿，女，5岁。因右侧腮部肿痛5天就诊。现证见腮部漫肿，灼热疼痛，咀嚼时尤甚，精神倦怠，高热头痛，咽喉红肿，大便干结，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治疗首选方剂是
- A. 仙方活命饮
- B. 普济消毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 三仁汤
- E. 荆防败毒散
74. 患儿，女，5岁。发热1天，颜面、躯干见丘疹及水疱疹。现低热，恶寒，鼻塞流涕，疹色红润，疱浆清亮，疹粒稀疏，舌质红，苔薄白，脉浮数。其病证诊断为
- A. 幼儿急疹，邪郁肌表
- B. 风疹，邪犯肺卫证
- C. 麻疹，邪犯肺卫证
- D. 水痘，毒炽气营证
- E. 水痘，邪伤肺卫证
75. 患儿，1岁，能抬头，不能独坐及站立，牙齿萌出4颗，头颅呈方形，凶门宽大，发稀而黄，目无神采，反应迟钝，夜卧不安，易倦懒动，肢体无力，睡眠不实，面色不华，形体瘦弱，舌淡苔少，指纹淡。治疗应首选
- A. 加味六味地黄丸
- B. 调元散
- C. 虎潜丸
- D. 调元散合二陈汤
- E. 通窍活血汤合二陈汤
75. 患儿，1岁，能抬头，不能独坐及站立，牙齿萌出4颗，头颅呈方形，凶门宽大，发稀而黄，目无神采，反应迟钝，夜卧不安，易倦懒动，肢体无力，睡眠不实，面色不华，形体瘦弱，舌淡苔少，指纹淡。治疗应首选
- A. 加味六味地黄丸
- B. 调元散
- C. 虎潜丸
- D. 调元散合二陈汤
- E. 通窍活血汤合二陈汤
75. 患儿，2岁。高热7天，昼轻夜重，咽红目赤，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹，手足硬肿，随后指趾端脱皮，舌质红绛，状如草莓，苔薄黄，脉数有力。治疗应首选的方剂是
- A. 桑杏汤
- B. 银翘散
- C. 桃花煎
- D. 清瘟败毒饮
- E. 沙参麦冬汤
76. 患儿，男，7岁。诊断为猩红热。现身热渐退，咽喉糜烂，疼痛减轻，皮疹渐消，唇干口燥，食欲不振，舌红少津，脉细。治疗首选方为
- A. 养阴清肺汤
- B. 益胃汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 竹叶石膏汤
- E. 增液承气汤
77. 患者一侧臀部结块，肿胀疼痛，皮肤灼热，红肿以中心为著，边界不清，步行困难，身热头痛，病前有局部肌肉注射史。应诊断为
- A. 丹毒
- B. 流注
- C. 臀痈
- D. 环跳疽
- E. 附骨疽
78. 患者女性，26岁，产后第三周出现恶寒发热，右乳肿胀疼痛，体温38.7℃，检查见右乳红肿，无波动感，口渴，舌红，苔薄黄，脉数。此时的治疗方法是
- A. 切开引流
- B. 疏肝理气，化痰散结
- C. 疏肝清胃，通乳消肿
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 泻火解毒利湿
79. 患者白疮初起，皮损遍身，多呈点滴状，颜色鲜红，层层银屑，瘙痒剧烈，抓之有点状出血，伴口干舌燥，便干溲黄，舌质红，苔薄黄，脉弦滑。证属
- A. 火毒炽盛证
- B. 湿毒蕴阻证
- C. 气血瘀滞证
- D. 血热内蕴证
- E. 以上均不是

80. 患者，女，40岁，慢性肾病，病程日久，平素头发焦黄，发病时呈大片均匀脱落；伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软；舌质淡，舌苔薄，脉细。治疗宜选用
- A. 八珍汤  
B. 大补阴丸  
C. 通窍活血汤  
D. 六味地黄汤  
E. 七宝美髯丹
81. 患者女性，30岁，自觉肛门部不适，排便时因粪便压迫肛隐窝，可感觉肛门疼痛，一般不甚剧烈，数分钟内消失。其最可能的诊断是
- A. 直肠息肉  
B. 肛裂  
C. 肛瘘  
D. 肛窦炎  
E. 内痔
82. 患者肛旁肿痛1周，近3天加重，伴发热恶寒，坐卧不宁。检查肛门左侧饱满，高于右侧，压痛明显，有波动感，最可能的诊断是
- A. 直肠后间隙脓肿  
B. 骨盆直肠间隙脓肿  
C. 肛门旁皮下脓肿  
D. 坐骨直肠间隙脓肿  
E. 坐骨直肠间隙脓肿传向肛提肌
83. 患者，男，38岁。患急性子痛2天，恶寒发热，左侧睾丸肿大疼痛，疼痛引及子系（精索），舌红苔黄腻，脉滑数。证属湿热下注，气血壅滞，经络阻隔为患。治宜清热解毒，利湿消肿，应首选
- A. 透脓散  
B. 滋阴除湿汤  
C. 萆薢化毒汤  
D. 柴胡疏肝散  
E. 枸橘汤加减
84. 某男，32岁。右下肢麻木、发凉、怕冷2年，每行走约1km需停下休息。体格检查：右下肢皮温较对侧低，色泽苍白，右足背动脉搏动减弱。诊断考虑为
- A. 血栓闭塞性脉管炎  
B. 大动脉炎  
C. 右下肢动脉硬化性闭塞症  
D. 右下肢深静脉血栓形成  
E. 右下肢血栓性浅静脉炎
85. 患者，女，45岁，甲状腺肿大20年，呈漫肿，无痛，随喜怒而消长，属中医 A. 石瘰
- B. 肉瘰  
C. 瘰疬  
D. 气瘰  
E. 失荣
86. 8月上旬，一男性儿童前额部出现2个红肿结块，约2cm×2cm，中央有一个脓头未溃，疼痛拒按，伴口渴便秘，尿短赤。应选用
- A. 五味消毒饮  
B. 仙方活命饮  
C. 清暑汤  
D. 防风通圣散  
E. 黄连解毒汤
87. 患者，女，40岁。双乳肿胀疼痛，月经前加重，经后缓减，肿块大小不等，形态不一，伴乳头溢液，月经不调，腰酸乏力，舌淡苔白，脉弦细。其证候是
- A. 肝郁痰凝  
B. 肝气郁结  
C. 冲任失调  
D. 肝郁火旺  
E. 肝郁脾虚

### 三、A3型选择题（88~114题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设多道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

（88~90题共用题干）

患者经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，经量少，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长。舌淡胖，苔白润，脉沉。

88. 其证是
- A. 寒凝血瘀证  
B. 阳虚内寒证  
C. 脾肾阳虚证  
D. 气血虚弱证

E. 肾气亏损证

89. 其治法是

- A. 理气行滞, 化瘀止痛
- B. 温经散寒, 化瘀止痛
- C. 益气养血, 调经止痛
- D. 温经扶阳, 暖宫止痛
- E. 补肾益精, 养血止痛

90. 治疗应选的方剂是

- A. 温经汤 (《金匱要略》)
- B. 艾附暖宫丸
- C. 温经汤 (《妇人大全良方》)
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤

(91~93 题共用题干)

患者产后血性恶露 13 天不尽, 量多, 色淡, 质稀, 无气味, 神疲懒言, 小腹空坠, 食少便溏, 舌淡苔薄白, 脉细弱。

91. 其证是

- A. 肾虚
- B. 气虚
- C. 血虚
- D. 血热
- E. 血瘀

92. 其治法是

- A. 养阴清热止血
- B. 健脾补气止血
- C. 活血化瘀止血
- D. 补气摄血固冲
- E. 补肾益气止血

93. 治疗应选的方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 归脾汤
- C. 八珍汤
- D. 举元煎
- E. 保阴煎

(94~96 题共用题干)

李某, 新产后, 突然出现高热寒战, T39.5℃, 伴小腹疼痛, 拒按, 恶露量多, 色紫暗如败酱, 气臭秽, 心烦口渴, 大便秘结, 小便黄; 舌红, 苔黄, 脉数有力。

94. 其证是

- A. 感染邪毒证
- B. 外感证
- C. 血瘀证

D. 血虚证

E. 肾虚证

95. 其治法是

- A. 清热解毒, 化瘀止血
- B. 清热解毒, 凉血化瘀
- C. 清热解毒, 泻下逐攻
- D. 清热解毒, 凉血养阴
- E. 清热解毒, 清心开窍

96. 治疗应选的方剂是

- A. 荆防四物汤
- B. 血府逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 大黄牡丹皮汤
- E. 五味消毒饮

(97~99 题共用题干)

患儿, 3 岁。体重 10kg, 身高 80cm。其形体消瘦, 面色无华, 毛发干枯, 精神萎靡不振, 不思饮食, 腹膨如鼓, 一身浮肿, 双踝肿甚, 按之凹陷, 舌质淡, 苔薄白, 指纹淡。97. 其治法是

- A. 补益气血, 佐以运脾
- B. 养血柔肝, 活血化瘀
- C. 滋阴生津, 养血安神
- D. 健脾温阳, 利水消肿
- E. 调脾健运, 开胃进食

98. 其选方是

- A. 防己黄芪汤合五苓散
- B. 黄芪桂枝五物汤合真武汤
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 实脾饮合五苓散
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

99. 根据材料分析, 判断该患儿的生长发育状况

- A. 体重正常, 身高正常
- B. 体重偏低, 身高偏低
- C. 体重偏低, 身高正常
- D. 体重偏高, 身高偏低
- E. 体重偏低, 身高偏高

(100~102 题共用题干)

患者, 男, 3 岁。症见: 多动难静, 急躁易怒, 冲动任性, 难以自控, 神思涣散, 注意力不集中, 难以静坐, 学习成绩低下, 腰酸乏力, 大便秘结, 舌质红, 舌苔薄, 脉细弦。100. 根据题干内容进行分析, 其证型是

- A. 心肾阴虚证
- B. 气郁化火证
- C. 阴虚风动证
- D. 心肝阴虚证
- E. 肝肾阴虚证

101. 其首选的方剂是

- A. 大定风珠
- B. 清肝达郁汤
- C. 杞菊地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 羚角钩藤汤

102. 以下有关该病的预防与调护说法错误的是

- A. 孕妇应保持心情愉快
- B. 不责骂不体罚
- C. 保证患儿营养
- D. 食用兴奋性食物
- E. 加强管理, 及时疏导

(103~105 题共用题干)

患儿, 6 岁。有明显的骨骼改变症状, 如头颅方大, 肋软骨沟, 肋串珠, 手镯, 足镯, 鸡胸, 漏斗胸等, O 形或 X 形腿, 出牙、坐立、行走迟缓, 并有面白虚烦, 多汗肢软, 舌淡苔少, 脉细无力

103. 其证型是

- A. 肺脾气虚证
- B. 脾虚肝旺证
- C. 肾精亏损证
- D. 气阴两伤证
- E. 肝肾不足证

104. 其治法是

- A. 补肾填精, 佐以健脾
- B. 健脾助运, 平肝息风
- C. 益气养阴, 清解余热
- D. 补益肝肾
- E. 健脾补肺

105. 治疗应首选

- A. 人参五味子
- B. 益脾镇惊散
- C. 补肾地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 杞菊地黄丸

(106~108 题共用题干)

患者, 女, 43 岁。颈部呈弥漫性肿大 3 年,

表面平坦, 质软不痛, 边缘不清, 随喜怒消长, 皮色如常, 肿块随吞咽上下移动; 伴急躁易怒, 善太息。舌质淡红, 苔薄白, 脉沉弦。

106. 根据题干分析, 其诊断是

- A. 肉瘰
- B. 瘰疬
- C. 石瘰
- D. 肉瘤
- E. 气瘰

107. 根据题干分析, 该病治法是

- A. 解郁安神, 化痰软坚
- B. 补益气血, 解毒化瘀
- C. 清肝泻火, 祛瘀解毒
- D. 益气养阴, 软坚散结
- E. 疏肝解郁, 化痰软坚

108. 在 107 题的基础上, 其首选方剂是

- A. 四海舒郁丸
- B. 逍遥散
- C. 柴胡疏肝散
- D. 四七汤
- E. 逍遥散合海藻玉壶汤

(109~111 题共用题干)

患儿, 男。右下肢出现局限性柔软肿块, 局部色泽鲜红, 触之如海绵状, 大小不一, 边界不清, 不痛不痒, 伴五心烦热, 面赤口渴, 尿黄便干, 易口舌生疮。舌质红, 苔薄黄, 脉细数。

109. 诊断为

- A. 脂瘤
- B. 血管瘤
- C. 血瘤
- D. 肉瘤
- E. 脂肪瘤

110. 其首选方剂是

- A. 五味消毒饮合化坚二陈丸
- B. 阳和汤
- C. 顺气归脾丸
- D. 芩连二母丸合凉血地黄汤
- E. 丹栀逍遥散合清肝芦荟丸

111. 根据第 110 题, 该病的治则是

- A. 健脾益气, 化湿解毒
- B. 温阳散寒, 化痰散结
- C. 清心泻火, 凉血解毒

- D. 清肝泻火，祛瘀解毒  
E. 清热解毒，化痰散瘀

(112~114 题共用题干)

男，31岁。突发剑突下疼痛，6小时后疼痛转移到右下腹，恶心纳差，轻度发热。右下腹有压痛，无反跳痛，舌苔白腻，脉弦滑。

112. 根据题干分析，该证型首选方剂是

- A. 复方大柴胡汤  
B. 阑尾化瘀汤  
C. 藿香正气散加减  
D. 大承气汤加减  
E. 大黄牡丹汤合红藤煎

113. 根据题目分析，其治则是

- A. 行气活血，通腑泄热  
B. 通腑泻热，利湿透脓  
C. 通腑排脓，养阴清热  
D. 温阳散寒，活血通络  
E. 清热利湿，解毒活血

114. 根据题干分析，关于该病的外治法说法正确的是

- A. 无论脓已成或未成，均可选用金黄散、玉露散或双柏散  
B. 脓已未成者可选用冲和膏、红灵丹油膏外敷  
C. 早期直接采取手术治疗  
D. 用6%~8%的明矾溶液入直肠黏膜下层  
E. 以上说法均属于正确

#### 四、B1型选择题(115~150题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用 在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(115~116 题共用备选答案)

- A. 痛经  
B. 带下过少  
C. 胎动不安  
D. 子晕  
E. 滑胎

115. 肝气郁结，血为气滞，冲任不畅，可发生

116. 肝阴不足，肝阳偏亢，可发生  
(117~118 题共用备选答案)

- A. 异位妊娠已破损稳定型  
B. 异位妊娠已破损休克型  
C. 异位妊娠已破损不稳定型  
D. 异位妊娠已破损包块型  
E. 异位妊娠已破损腑实证

117. 哪种类型首选宫外孕 I 号方

118. 哪种类型首选宫外孕 II 号方

(119~120 题共用备选答案)

- A. 胎元饮  
B. 寿胎丸  
C. 温土毓麟汤  
D. 长胎白术散  
E. 四君子汤

119. 气血虚弱胎萎不长的首选方是

120. 血寒宫冷胎萎不长的首选方是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 补肾祛瘀方  
B. 桂枝茯苓丸  
C. 香棱丸  
D. 大黄牡丹汤  
E. 桃核承气汤

121. 气滞血瘀癥瘕的首选方是

122. 湿热瘀阻癥瘕的首选方是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 脾  
B. 肝  
C. 肺  
D. 大肠  
E. 肾

123. 感冒夹滞的病位在肺和

124. 感冒夹惊的病位在肺和

(125~126 题共用备选答案)

- A. 黄芪桂枝五物汤  
B. 生脉散  
C. 玉屏风散合牡蛎散  
D. 清营汤  
E. 桂枝汤

125. 治疗肺卫不固型汗证的首选方为

126. 治疗营卫失调型汗证的首选方为

(127~128 题共用备选答案)

- A. 虚证  
B. 实证

- C. 寒证
- D. 热证
- E. 虚实夹杂证

127. 紫癜起病急，病程短，紫癜颜色鲜明者  
辨证属

128. 紫癜起病缓，病程长，紫癜颜色暗淡者  
辨证属

(129~130 题共用备选答案)

- A. 厌恶进食，多食饱胀，精神尚可
- B. 不欲饮食，脘腹胀满，烦躁多啼
- C. 不思进食，食而不化，形瘦肢倦
- D. 不思进食，食少饮多，便干烦躁
- E. 食欲不振，大便稀溏，完谷不化

129. 厌食脾胃气虚证证见

130. 厌食脾胃阴虚证证见

(131~132 题共用备选答案)

- A. 热肿
- B. 寒肿
- C. 风肿
- D. 湿肿
- E. 痰肿

131. 发病急骤，漫肿宣浮的是

132. 皮肉重垂胀急，深按凹陷的是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 内发丹毒
- B. 赤游风
- C. 流火
- D. 抱头火丹
- E. 类丹毒

133. 患者躯干部皮肤突然发红成片，色如丹涂的急性感染性疾病称

134. 患者头面部皮肤突然发红成片，色如涂丹的急性感染性疾病称

(135~136 题共用备选答案)

- A. 脓疱疮
- B. 疥疮
- C. 蛇串疮
- D. 湿疹
- E. 以上均不是

135. 侧腰部皮肤有成簇状的丘疱疹，呈带状分布，疼痛剧烈。应诊断为

136. 皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，易转为慢性。诊断为

(137~138 题共用备选答案)

A. 三金排石汤加减

B. 八正散加减

C. 知柏地黄汤加减

D. 济生肾气丸加减

E. 金铃子散合石苇散加减

137. 尿石症之气血瘀滞证的主治方剂是

138. 尿石症之肾气不足证的主治方剂是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 体液传播
- B. 土壤传播
- C. 飞沫传播
- D. 水、食物、苍蝇传播
- E. 蚊虫传播

139. 流感传播途径主要是

140. 流脑传播途径主要是

(141~142 题共用备选答案)

- A. 病程超过 2 周
- B. 病程超过 1 月
- C. 病程超过 2 月
- D. 病程超过半年
- E. 病程超过 1 年

141. 慢性肝炎

142. 慢性菌痢

(143~144 题共用备选答案)

- A. 发热，腹痛，腹泻，洗肉水样大便
- B. 发热，腹痛，腹泻，脓血便，里急后重
- C. 腹泻，呕吐，水样大便
- D. 发热，腹痛，腹泻，水样大便
- E. 低热，腹痛，腹泻，果酱样大便

143. 急性菌痢典型表现为

144. 霍乱典型表现为

(145~146 题共用备选答案)

- A. 超声波
- B. 洗手
- C. 碘类消毒
- D. 电离辐射
- E. 紫外线

145. 属高效消毒法的是

146. 属灭菌法的是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 新药
- B. 麻醉药
- C. 进口药
- D. 处方药

E. 非处方药

147. 必须持有医师开具的处方才能进行销售、调剂和使用的药品是

148. 消费者可根据自行判断并进行购买和使用的药品是

(149~150 题共用备选答案)

A. 以人为本，践行宗旨

B. 遵纪守法，依法执业

C. 尊重患者，关爱生命

D. 廉洁自律，恪守医德

E. 优质服务，医患和谐

149. 弘扬高尚医德，严格自律，不索取和非法收受患者财物所属的行为规范范畴是

150. 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨，以病人为中心，全心全意为人民健康服务所属的行为规范范畴是