

麻醉（中级）

〔专业代码:347〕

-
- 1、咯血的麻醉是使用双腔气管导管的指征
 - 2、频率在 8 ~ 13Hz 范围的脑电波反映 α 活动
 - 3、脉搏氧饱和度仪的测定原理是比尔定律
 - 4、呼吸道阻力小不是循环紧闭式呼吸环路系统特点
 - 5、电凝不造成心室纤颤的主要原因是高频率
 - 6、磁共振成像(MRI)手术间可安全使用的麻醉器械是普通喉罩
 - 7、麻醉蒸发器其室内吸液芯的作用是增加麻醉药液的蒸发面积
 - 8、顺磁分析技术可以用来测量 O₂ 的浓度
 - 9、定时通气周期起动原理是呼气时间达到预定值转为吸气
 - 10、为保证氧的安全输送，根据气体流向，流量计合理的排列顺序是空气-笑气-氧气
 - 11、喉罩通常是盲探插入
 - 12、无储气囊面罩吸氧，氧流量 5L/min 时的吸入氧浓度大约是 40%
 - 13、气管导管上的 IT 字样表示已完成组织毒性试验
 - 14、旁流式挥发罐（蒸发器）倒置后输出浓度会升高
 - 15、增加动脉血二氧化碳分压与呼吸末二氧化碳分压间差别的因素是单肺通气
 - 16、接受肝切除手术的 59 岁男性患者，麻醉后桡动脉 20G 套管针穿刺置管。传感器位于患者心脏水平下 20cm，患者仰卧手臂外展，在手腕水平三通校零。监护仪显示的血压水平与真实血压水平的关系是两者相同
 - 17、右冠状动脉缺血在心电图 II 导联表现明显
 - 18、蒸发器能交换使用而不明显影响输出浓度的麻醉药是异氟烷、氟烷
 - 19、体外无创电极不能完成临时心房起搏
 - 20、轴针安全指示系统(PISS)的作用是防止不同气体的小型储气瓶错误连接

-
- 21、旁流式肺通气监测仪器不能监测肺活量指标
 - 22、碱石灰在添加硅酸盐后硬度增加
 - 23、左肺根前方有左膈神经
 - 24、盆腔内脏的副交感神经支配来自盆内脏神经
 - 25、关于腹主动脉毗邻，腹主动脉的后面为第 1 ~ 4 腰椎及椎间盘
 - 26、与小隐静脉下段伴行的神经是腓肠神经
 - 27、胸膜顶体表投影的位置是高出锁骨内侧 1/3 上缘 2 ~ 3cm
 - 28、骶丛的组成是腰骶干以及全部骶神经和尾神经的前支
 - 29、关于副神经，出颅后分为内、外两支
 - 30、腰交感干位于脊柱与腰大肌之间，为椎前筋膜所覆盖
 - 31、解剖学“鼻咽壶”的边界是桡侧为拇长展肌腱和拇短伸肌腱，尺侧为拇长伸肌腱，近侧为桡骨茎突
 - 32、脊髓表面的被膜由内向外，依次为软脊膜、脊髓蛛网膜、硬脊膜
 - 33、小腿外侧的皮肤不是腰丛分支的分布范围
 - 34、参与咽峡构成的是两侧腭舌弓
 - 35、小儿喉腔最狭窄的部位是环状软骨水平
 - 36、分布于脐平面的皮神经来自第 10 胸神经
 - 37、冠状动脉起自升主动脉的主动脉窦
 - 38、大隐静脉的末端接受 5 条属支
 - 39、腹腔神经节位于两肾上腺内侧
 - 40、臂丛神经上、中干的前股合成外侧束
 - 41、组成腰骶干的神经是 L4、L5

-
- 42、颞孔的体表位置是**下颌第二前磨牙根下方**
- 43、椎动脉入颅的位置是**枕骨大孔**
- 44、通过斜角肌间隙的结构是**臂丛的根**
- 45、**鼻中隔**是鼻腔内侧壁的结构
- 46、供应窦房结和房室结的动脉来源于**右冠状动脉**
- 47、股三角内血管神经的排列由外侧向内侧依次为**股神经、股动脉、股静脉**
- 48、桡神经浅支损伤，**手背外侧皮肤**感觉丧失
- 49、前室间支又称前降支，是**左冠状动脉**的分支
- 50、决定心排血量的主要因素为**心率与每搏输出量**
- 51、血管半径缩小一半，血流量将减少到原值的 $1/16$
- 52、关于意识障碍，谵妄者表现为**定向力障碍，躁动不安，注意力显著缺失**
- 53、下丘脑病变累及视上核时，排尿的改变是**尿量增加，尿液稀释**
- 54、低温(30°C)时的生理变化是**肾小球滤过率减少**
- 55、受神经-体液因素调节的小气道，是气道阻力调节的活跃部分，也是小气道阻力增高性疾病的常发部位，这类小气道一般是指**内径 $<2\text{mm}$ 非呼吸性细支气管**
- 56、在麻醉过程中，过度通气可降低颅内压，其生理学基础为**动脉血 CO_2 下降使脑血管收缩，颅内压下降**
- 57、**前负荷减少**为心排血量减少的原因
- 58、麻醉期间被动性过度通气最常见于**控制呼吸**
- 59、颅内高压时可因脑血流减少而引起脑缺血反应，使动脉压增高，这种反射称为 **Cushing 反射**
- 60、正常情况下，成人的肾小球滤过率为 **125ml/min**

-
- 61、安静时，产热最多的器官是**内脏**
 - 62、喉罩对人体的影响有**减少解剖无效腔**
 - 63、肝细胞损害越严重，凝血因子的异常越多见，其中首先减少的是**维生素 K 依赖性凝血因子**
 - 64、**老年**患者的肌松药反应异常与接头后受体变化无关
 - 65、引起肾脏产生功能性变化的缺血时限是 **2h 之内**
 - 66、时间肺活量第一秒末的正常值是肺活量的 **83%**
 - 67、心肌的电生理特性是指**兴奋性、自律性、传导性**
 - 68、患者在全身麻醉后肺通气的改变是**自主呼吸和控制呼吸时都是上肺好于下肺**
 - 69、1 秒用力呼出量占用力肺活量的百分比(FEV1 / FVC)，可反映受试者通气功能，当该值小于 **60%**时，对患者实施麻醉需谨慎
 - 70、闭合容积等于**闭合气量+残气量**
 - 71、**肝**不具备血流自身调节功能
 - 72、充血性心力衰竭时血流动力学异常，其中心泵功能减退的表现**为心室舒张末压增高，心排量降低**
 - 73、中枢神经系统中，抑制性突触传递的主要递质是**甘氨酸**
 - 74、交感神经节后纤维的递质是**去甲肾上腺素或乙酰胆碱**
 - 75、射血分数等于**搏出量**占某个容积的百分数，这个容积是**心室舒张末期容积**
 - 76、席汉(Sheehan)综合征的病因是**肾上腺皮质功能降低**
 - 77、**母体氧储备增加**的变化不是妊娠期生理改变
 - 78、**二尖瓣关闭不全**引起左室舒张期负荷加重
 - 79、药物的治疗指数是指 **LD50/ED50**
 - 80、吸入麻醉剂的血 / 气分配系数最接近笑气的是**地氟烷**

-
- 81、苯巴比妥中毒解救时，能促使其快速排泄的是**碱化尿液**，解离度增加，减少肾小管再吸收
 - 82、慢性肾衰竭患者肾移植时，最理想的肌松药是**阿曲库铵**
 - 83、治疗过敏性休克首选**肾上腺素**
 - 84、较易引起变态反应的局麻药是**普鲁卡因**
 - 85、气脑造影后患者需行全身麻醉，应避免应用**氧化亚氮**
 - 86、阿托品不宜用于**青光眼**
 - 87、咪达唑仑的主要优点是**易溶于水、消除半衰期短**
 - 88、诱导期吸入麻醉药的血液浓度高于维持期，其主要目的是**加快诱导**
 - 89、单用一种吸入麻醉药维持麻醉时临床常用浓度为 **1.3MAC**
 - 90、心脏毒性较大的局麻药是**布比卡因**
 - 91、临床上常用多巴胺治疗低心排综合征的患者，常用治疗剂量为 **2 ~ 10 μ g/(kg·min)**
 - 92、氯丙嗪不能阻断**运动终板突触后膜 M 受体**
 - 93、影响吸入麻醉药排出快慢的主要因素是**通气量**
 - 94、可诱发恶性高热的药物是**琥珀胆碱**
 - 95、吸入麻醉药的 MAC 苏醒为 **0.4MAC**
 - 96、用强心苷治疗心力衰竭的患者，麻醉时使用琥珀胆碱可产生**严重的室性心律失常**
 - 97、能产生"分离麻醉"作用的麻醉药是**氯胺酮**
 - 98、东莨菪碱属于**中枢性抗胆碱药**
 - 99、神经肌肉接头后膜的 N₂ 胆碱受体被阻断 **95%**时，肌颤搐才完全抑制
 - 100、导致神经肌肉接头后膜 N₂ 胆碱受体蛋白发生变化和离子通道开放必须有 **2** 个 α 蛋白亚基与激动剂分子相结合
 - 101、强心苷治疗心衰的药理学基础是**加强心肌收缩力而不增加耗氧量**

-
- 102、常用吸入麻醉药 MAC 的大小顺序依次为氧化亚氮 > 七氟烷 > 恩氟烷 > 异氟烷 > 氟烷
- 103、米库溴铵可迅速被假性胆碱酯酶水解
- 104、消除半衰期最短的β受体阻滞药为艾司洛尔
- 105、受体激动剂的特点是有亲和力，有内在活性
- 106、氯胺酮产生全身麻醉作用的主要机制是阻断 NMDA 受体
- 107、恩氟烷不宜用于癫痫患者
- 108、同时吸入 80% 的 N₂O 和 1% 的氟烷时，氟烷在血中浓度升高的速度明显加快
- 109、氟马西尼本身无明显药理作用
- 110、强心苷中毒引起的窦性心动过缓可选用阿托品
- 111、N₂O 的禁忌证有机械性肠梗阻
- 112、肾功能障碍患者，作用时间不会延长的药物是阿曲库铵
- 113、吗啡禁用于分娩止痛及哺乳妇女止痛的原因是抑制呼吸、对抗催产素作用
- 114、地氟烷的特点是血 / 气分配系数低
- 115、对于心动过缓的患者，新斯的明正确的用法是先用阿托品的稀释液使心率加快到 80 次 / 分，然后将剩余的阿托品与新斯的明混合应用
- 116、术中结扎胆囊时，血压 70/40mmHg，心率 40 次 / 分，首先应立即暂停手术
- 117、β受体阻断剂一般不用于支气管哮喘
- 118、酚妥拉明可使血压下降
- 119、医务人员职业行为通过法律监督来约束
- 120、“医疗机构不准使用无生产批准文号的自制药品与制剂”属于《卫生部关于加强卫生行业作风建设的意见》提出的八项行业纪律之一
- 121、在临床诊疗活动中，医务人员收受药品、医用设备、医用耗材等生产、经营企业或经销

人员以各种名义给予的财物或提成的，医德考评结果应记为**较差**

122、医学行为是否有利于医学科学发展和揭示人类的生命奥秘是**医德评价的科学标准**

123、医务人员医德考评的首要标准是**救死扶伤，全心全意为人民服务**

124、“不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了**廉洁自律，恪守医德基本行为规范**

125、遵守医学伦理道德，尊重患者的知情**同意权**和**隐私权**，为患者保守医疗秘密和健康隐私维护患者合法权益

126、《中华人民共和国执业医师法》明确规定，医师是指依法取得执业医师资格或者**执业助理医师资格**，**经注册在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员**

127、实验性临床医疗应充分保障患者本人或其家属的**知情同意权**

128、上腔静脉综合征最常见的病因是**胸内恶性肿瘤**

129、阵发性室性心动过速伴晕厥者，首选的治疗是**同步直流电复律**

130、风湿性心脏炎和病毒性心肌炎表现的区别为前者可出现**病理性杂音**

131、心肺复苏时胸外按压：成人按压速率为至少每分钟 **100 次**，胸骨按压幅度为至少 **5cm**

132、**急性下壁心肌梗死伴完全性房室传导阻滞**不适宜使用洋地黄类药物

133、心力衰竭的概念是**心输出量不能满足机体代谢需要**

134、目前老年高血压患者的治疗目标为**收缩压 < 150mmHg**

135、麻醉中降低外周血管阻力对**二尖瓣关闭不全**患者更有利

136、动脉粥样硬化的次要易患因素是**肥胖**

137、心尖区触及舒张期震颤，提示是**二尖瓣狭窄**

138、左心衰发展至全心衰时不出现**呼吸困难加重**

-
- 139、根据高血压的诊断标准，成人的正常血压是 $SBP < 120\text{mmHg}$, $DBP < 80\text{mmHg}$
- 140、高动力循环状态常见于慢性贫血
- 141、心肌梗死急性期患者，一旦出现室性期前收缩，应首选利多卡因
- 142、不能反映心功能状态的检查是心电图
- 143、对肺动脉高压最可靠的诊断方法是右心导管检查
- 144、从理论上说治疗充血性心力衰竭和低心排的最佳药物是正性肌力性血管扩张剂
- 145、慢性高血压的治疗目的是将血压降至目标水平
- 146、右心衰竭较早出现的体征是肝大
- 147、针对高血压患者，麻醉重点是防治高血压和低血压，使血压波动最小化
- 148、引起心肌收缩力下降的主要原因是急性心肌梗死
- 149、正常二尖瓣口面积为 $4.0 \sim 6.0\text{cm}^2$
- 150、硝酸甘油常不能解除主动脉瓣狭窄患者心内膜下缺血所致的心绞痛
- 151、WHO 推荐的一线降压药选择顺序是利尿剂、 β 受体阻滞剂、ACEI、钙拮抗剂、 α 受体阻滞剂
- 152、肥厚型心肌病最常见的心电图表现为左室肥大和继发性 ST-T 改变
- 153、行胃部手术时，给予连续硬膜外麻醉，阻滞平面不宜超过 T3
- 154、最应采取急诊手术治疗的情况是急性腹膜炎无局限趋势而原因不明者
- 155、患者，男，65岁，肠梗阻10天，剧烈呕吐3天，拟行剖腹探查术。患者一般情况差，血压 $80/60\text{mmHg}$ ，心率 120 次/分，血气分析示代谢性酸中毒，此患者麻醉选择应是全麻
- 156、胆总管结石最典型的临床表现是 Charcot 征
- 157、胰腺外分泌每日为 $700 \sim 1500\text{ml}$
- 158、小肠梗阻的常见原因为疝的嵌闭或粘连

159、患者，女性，33岁，溃疡病史十余年，突发上腹剧痛，迅速波及全腹。查体：腹部板状强直，广泛压痛，反跳痛，肝肺浊音界消失。腹部X线透视：右膈下新月状透亮影，首先考虑的是**胃十二指肠急性穿孔**



160、继发性化脓性腹膜炎的病原菌感染，最常见的是**混合感染**

161、绞窄性肠梗阻具体表现：①腹痛发作**急骤**，起始即为**持续性剧烈疼痛**，或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛。呕吐出现**早**、**剧烈而频繁**。②病情发展**迅速**，早期出现**休克**。③有**明显腹膜刺激征**，体温上升、脉率增快、白细胞计数**增高**。④**腹胀不对称**。⑤**呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性**，或腹腔穿刺抽出血性液体。⑥**经积极非手术治疗而症状、体征无明显改善**。⑦腹部X线检查见**孤立、突出胀大**的肠袢、**不因时间而改变位置**，或有**假肿瘤状阴影**或肠间隙增宽，提示有**腹腔积液**

162、急性胰腺炎的基本病理改变是**水肿、出血、坏死**

163、胆囊动脉多源于**肝右动脉**

164、消化道溃疡出血的患者行手术，血红蛋白应至少保持在**100g/L以上**

165、肠梗阻的全身病理生理变化是**梗阻肠管内细菌分泌毒素入腹腔引起毒血症**

166、肝功能受损患者手术时，吸入麻醉药应避免使用**氟烷**

167、最常见的上消化道出血的原因是**胃十二指肠溃疡**

168、肠梗阻时，若盲肠扩张的直径达**13cm**，则发生破裂的危险性高，应立即手术

169、上消化道出血的鉴别诊断中，以呕血为主，还是以便血为主，主要取决于**出血速度+出血量**


170、老年男性，突然呕吐新鲜血液1000ml急诊入院。近一年来常有上腹部不适，血压85/60mmHg，巩膜轻度黄染，考虑出血部位为**门静脉高压症**

171、肠梗阻的主要共同表现是**腹痛、呕吐、腹胀、便秘**

-
- 172、急性全胰腺炎症主要临床表现是**上腹部剧痛，并向腰部放射**
- 173、肝硬化门静脉高压症最典型的临床表现是**脾大、脾亢、呕血、腹水**
- 174、断流手术术式多样，其中**脾切除加贲门周围血管离断术**最为有效
- 175、胆囊炎、胆石症患者术前用药禁用**吗啡**
- 176、出血性坏死性胰腺炎最严重的临床表现是**感染性休克、失血性休克**
- 177、肝外胆管结石的临床表现为**反复发作的腹痛、寒战高热和黄疸**，称为夏科三联症
- 178、在行胃部手术时，突然发生血压下降，应考虑是牵拉**腹腔神经丛**
- 179、急性胰腺炎出现**腹胀明显，或腹穿液为血性或脓性**最应考虑剖腹探查
- 180、急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的诱因是**胆石或蛔虫阻塞胆管**
- 181、急性肾炎的免疫病理检查可以见到粗颗粒沿毛细血管壁和系膜沉积的主要是 **IgG C3**
- 182、肾皮质血流正常时占肾血流的 **90%~95%**
- 183、**PaO₂ 降至 60mmHg** 不引起肾血流减少
- 184、患者男，18岁。近年来腰酸乏力，双下肢**出现凹陷性水肿**，尿检查蛋白(+++)，白细胞3个/HP，红细胞1个/HP，血浆白蛋白28g/L，尿蛋白定量4g/d，肾功能正常，治疗首选**泼尼松**
- 185、前列腺增生症最重要的症状是**进行性排尿困难**
- 186、当灌注压**低于 80mmHg** 时，肾血流明显随灌注压变化
- 187、患者男，26岁。1个月前患上感，近日浮肿，持续少尿，肾功能进行性恶化，血压150/90mmHg，尿蛋白(+++)，红细胞15~20个/HP，血红蛋白100g/L，肾病理特点最可能是**广泛肾小球腔内新月体形成**
- 188、能够引起肾素分泌增加的因素是**肾动脉低血压、肾小管远端低钠**
- 189、肾素为主导所致的高血压，表现为**血容量减少和血管痉挛**

-
- 190、尿石症不可能出现的症状是**多尿**
- 191、肾功能急骤恶化，血尿素氮及血肌酐呈进行性升高，符合**急进性肾炎**的表现
- 192、血中尿素氮的波动受下列因素影响，其中影响最大的是**蛋白质饮食**
- 193、**肾**的动静脉血氧含量差最小
- 194、急性肾衰竭的最常见类型为**急性肾小管坏死**
- 195、血浆清除率是指**肾在单位时间内能将多少毫升血浆中所含的某物质完全清除出去的血浆毫升数**
- 196、患者女，16岁。双下肢反复出现瘀点、瘀斑2年，脾刚可触及。Hb 90g/L，WBC $6 \times 10^9/L$ ，PLC $40 \times 10^9/L$ ；出血时间5min，凝血时间正常。最可能的诊断为**特发性血小板减少性紫癜**
- 197、满足手术止血要求的最低血小板数是 **$30 \times 10^9/L$**
- 198、甲型血友病患者，围术期为提高因子VIII水平，**凝血酶原复合物**制剂无效
- 199、凝血因子中半衰期最短的是因子VII
- 200、一孕妇因胎盘早剥诱发DIC，阴道失血约500ml，P 100次/分，血压90/60mmHg，PLC $55 \times 10^9/L$ ，首要的治疗是**终止妊娠**
- 201、患者男，50岁。发热流涕3天，继以恶心呕吐、少尿、乏力、血压160/100mmHg，血红蛋白70g/L，血肌酐 $707.2 \mu\text{mol/L}$ ，尿素氮 57mmol/L 、血浆总蛋白48g/L，B超双肾长轴约8cm，最可能诊断为**慢性肾功能衰竭急性加剧**
- 202、**阿司匹林**影响血小板功能
- 203、按照Cushing综合症的病因分类，Cushing综合症的最常见病因是依赖垂体**ACTH**的**Cushing病**
- 204、患者女，28岁。因摔伤骨折入院，皮肤菲薄，肢体有散在性瘀斑，腹下侧可见紫纹，

尿 17-羟及血皮质醇均高于正常，这些临床表现，应首先考虑的病理生理现象是**蛋白质代谢障碍**

205、原发性醛固酮增多症最多见的病因是**醛固酮瘤** 

206、原发性甲状旁腺功能亢进症最常见的病因是**甲状旁腺单个腺瘤**

207、Addison 病抢救的主要措施是**静脉输注糖皮质激素**

208、甲亢危象多发生在**甲状腺手术后 6~18 小时**

209、放射性碘(¹³¹I)治疗甲亢，最常见的并发症是**甲状腺功能减退**

210、成人原发性甲状腺功能减退症最常见的原因是**自身免疫性甲状腺炎**


211、甲状腺功能亢进症最常见的病因是 **Graves 病**

212、异位 ACTH 综合征最常见于**燕麦细胞支气管肺癌**

213、治疗甲状腺危象时应避免使用的药物是**乙酰水杨酸类药物**

214、皮下注射后起效最快的胰岛素是**门冬胰岛素**

215、目前认为，组织选择性好的磺脲类口服降糖药是**格列美脲**

216、糖尿病患者，使用中性鱼精蛋白胰岛素控制血糖，出现头晕、心悸、手颤、饥饿、出冷汗，最可能的原因是**低血糖症** 

217、代谢综合征发生的重要环节是**胰岛素抵抗**

218、对于营养不良的营养治疗，应首先纠正的是**水、电解质紊乱**

219、糖尿病患者若行择期手术，空腹血糖最宜控制在 **8.3mmol / L** 以下

220、对狼疮性肾炎具有诊断性价值的形态特征是**苏木素小体**

221、肌萎缩性侧索硬化病变部位在**脊髓的前角**（出现下运动神经元瘫）和侧索（出现上运动神经元瘫），不波及**感觉神经**

222、病毒性脑炎的确诊主要依据是**脑组织或脑脊液病毒分离**

-
- 223、诊断系统性红斑狼疮，阳性率可能最高的抗体是**抗核抗体**
- 224、患者男，58岁。突然头痛呕吐，伴意识丧失30分钟。查体神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性。右侧眼睑下垂，右侧瞳孔4mm，光反射消失。此时最好的诊断措施是**头颅CT**
- 225、在全麻下，急性溶血反应唯一体征是**血红蛋白尿**，**出血倾向或低血压**
- 226、诊断系统性红斑狼疮，特异性最高的抗体是**抗Sm抗体**
- 227、临床上硫酸鱼精蛋白常见的超敏反应为**Ⅲ型变态反应**
- 228、帕金森病患者常见步态为**慌张步态**
- 229、闭锁综合征见于**双侧脑桥基底部梗死**
- 230、正常成人颅内压为**70~200mmH₂O**
- 231、脑出血最常见的病因是**高血压和脑动脉硬化**
- 232、治疗晕厥最有效的措施是**病因治疗**
- 233、颈内动脉系统动脉占颅内动脉瘤的**90%**
- 234、颈内动脉缺血的临床表现是**突然感觉和运动障碍**
- 235、重症肌无力的主要诊断依据为：**肌力弱**，易疲劳；低频重复电刺激神经肌肉接头出现**递减现象**；对抗胆碱酯酶的反应性良好；血清胆碱酯酶抗体**高于正常**；患者可能合并胸腺瘤或胸腺肥大
- 236、椎底动脉系统动脉瘤占颅内动脉瘤的**10%**
- 237、在临床上，脑疝最为凶险的是**枕骨大孔疝急性疝出**
- 238、小脑幕切迹疝早期，动眼神经麻痹导致**同侧瞳孔散大**
- 239、脑血流自身调节功能是指**颅脑灌注压**在一定范围内波动，脑血流保持相对恒定
- 240、颈动脉内膜剥脱术应注意在暴露颈动脉后，应常规使用局麻药在颈动脉窦附近进行浸润阻滞

-
- 241、颅内压增高进一步发展通常不会出现**脑出血**
- 242、**听觉系统**病变不会导致眩晕
- 243、儿童颅内压正常值范围为 **0.5 ~ 1kPa(50 ~ 100mmH₂O)**
- 244、重症肌无力一般不选用的药物为**阿托品**
- 245、颅内压增高患者进行脱水治疗时，20%的甘露醇是临床常用的**渗透性脱水剂**
- 246、怀疑高血压脑出血时，应首先考虑 **CT** 检查
- 247、蛛网膜下腔出血的首位病因是**颅内动脉瘤破裂**
- 248、脑动脉瘤手术最大的危险是**颅内出血**
- 249、**前庭中枢性**眩晕会导致持续性进行性 侧耳鸣和听力下降
- 250、据吸烟、低热、咳嗽 2 个月，痰中带血 1 周，双侧颈后可触及多个可活动的淋巴结，右上肺可闻及支气管肺泡音，胸片示右上肺云雾状阴影，考虑是**浸润型肺结核**