

微笑计划口腔高端班测评诊断试题（口解）

本次试卷为国家执业医师资格考试口腔执业专业**口腔解剖生理学**模拟测试题。

本次试卷以金英杰口腔执业医师**王牌直播课程**（口腔解剖生理学）为考试内容。

 本套试卷共 100 题-

- ①每个人务必实名制，非实名制不计入成绩，只能作答一次，请慎重填写；
- ②答卷期间不可中途退出，一旦退出需重新作答；
- ③提交答案后，即可查看错题，不要退出，一旦退出，错题会消失。

您的真实姓名： [填空题] *

-
- 1. “解剖牙冠”是指（） [单选题] *
 - A.暴露于口腔的牙体部分
 - B.牙体被牙龈覆盖的部分
 - C.牙体发挥咀嚼功能的部分
 - D.被牙本质覆盖的牙体部分
 - E.被牙釉质所覆盖的牙体部分

 - 2. 可引起牙龈废用性萎缩的是（） [单选题] *
 - A.牙冠轴面无突度
 - B.牙冠轴面突度过大
 - C.牙冠牙合面副沟排溢道不明显
 - D.牙冠牙合外展隙不明显
 - E.牙冠轴面突度过小

 - 3.以下对“嵴”的描述哪项是错误的（） [单选题] *
 - A.嵴为切缘长条形的牙釉质隆起
 - B.轴嵴为轴面上从牙尖顶分别伸向牙颈的纵形隆起
 - C.位于后牙颊面的轴嵴称为颊轴嵴
 - D.牙尖嵴为从牙尖顶分别斜向近、远中的嵴
 - E.三角嵴为牙合面牙尖两斜面汇合成的细长形釉质隆起

 - 4.按照牙体形态特点及功能性，牙体可以分为（） [单选题] *
 - A.前牙和后牙

- B. 上颌牙体与下颌牙体
- C. 切牙、尖牙、前磨牙、磨牙
- D. 乳牙与恒牙
- E. 正常牙体与多生牙

5. 右侧下颌第二前磨牙依照国际牙科联合会系统记录牙位的方法应该记录为（） [单选题] *

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 35
- E. 45

6. 某 10 岁男童下颌一牙体特点是：颊面近似为一以近中缘为底的三角形；两颊尖之间有颊沟；颊颈嵴近中部分最突出，呈明显的结节状；近中面近似一以颈缘为底的三角形；咬合面近似为一以选中缘为底的三角形。该牙是（） [单选题] *

- A. 下颌第一磨牙
- B. 下颌第二磨牙
- C. 下颌第三磨牙
- D. 下颌第一乳磨牙
- E. 下颌第二乳磨牙

7. 牙的功能不包括（） [单选题] *

- A. 切割食物的功能
- B. 捣碎和磨细食物
- C. 发音和言语功能
- D. 保持面部的协调美观
- E. 保持口腔清洁

8. 磨牙的叙述，错误的是（） [单选题] *

- A. 第一磨牙萌出早，沟裂点隙多，容易龋坏
- B. 第二乳磨牙形态与第一恒磨牙相似
- C. 第三磨牙因阻生或错位常发生冠周炎
- D. 腮腺导管口位于上颌第三磨牙牙冠相对颊黏膜上
- E. 上颌第三磨牙可作为寻找腭大孔的标志

9. 宜用旋转力拔除的切牙是（） [单选题] *

- A. 上颌中切牙
- B. 上颌侧切牙
- C. 下颌侧切牙
- D. 下颌中切牙
- E. 以上都可以

10. 上颌第一磨牙舌面近中舌尖与远中舌尖之间的沟称为（） [单选题] *

- A.近中舌沟
- B.舌沟
- C.远中舌沟
- D.近中沟
- E.远中沟

11.最多出现畸形中央尖的牙齿是（） [单选题] *

- A.上颌第一前磨牙
- B.下颌第一前磨牙
- C.上颌第二前磨牙
- D.下颌第二前磨牙
- E.上颌侧切牙

12.一个 7 岁的女孩，口内检查发现下颌后部牙槽骨上有两个形态似磨牙的牙齿存在，为鉴别是否有恒磨牙，下列哪种说法是正确的（） [单选题] *

- A.恒牙的牙颈嵴突出，与牙根分界清楚
- B.恒牙牙冠颜色偏白
- C.下颌第二乳磨牙的近中颊尖、远中颊尖及远中尖的大小基本相等
- D.下颌第一恒磨牙的外形呈斜方形
- E.以上都不是

13.裂隙的定义（） [单选题] *

- A.龋病的好发部位
- B.副沟相交而成凹陷部位
- C.牙冠上不规则的凹陷部位
- D.三条或三条以上发育沟相交处的凹陷
- E.钙化不良而形成的凹

14.牙的尖顶偏远中，其牙是（） [单选题] *

- A.上颌乳尖牙
- B.下颌乳尖牙
- C.上颌第一前磨牙
- D.上颌第一乳磨牙
- E.下颌第一乳磨牙

15.牙的颊尖偏远中，其牙是（） [单选题] *

- A.上颌乳尖牙
- B.下颌乳尖牙
- C.上颌第一前磨牙
- D.上颌第一乳磨牙
- E.下颌第一乳磨牙

16.牙合面有一个中央窝，一个近中窝的牙是（） [单选题] *

- A. 上颌侧切牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌尖牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 下颌第一磨牙

17. 牙合面有一个中央窝，一个远中窝的牙是（） [单选题] *

- A. 上颌侧切牙
- B. 下颌第二前磨牙
- C. 上颌尖牙
- D. 上颌第一磨牙
- E. 下颌第一磨牙

18. 上颌尖牙冠唇面形态中哪一点是错误的（） [单选题] *

- A. 圆五边形
- B. 两牙尖嵴相交成 90 度
- C. 牙尖偏远中
- D. 外形高点在颈 1/3 与中 1/3 交界处
- E. 发育沟不明显

19. 下列关于乳、恒牙区别的描述，正确的是（） [单选题] *

- A. 乳牙体积小，牙冠呈淡黄色
- B. 乳牙颈嵴不突出，冠根不分明
- C. 下颌乳切牙舌面边缘嵴比下颌恒切牙明显
- D. 乳磨牙的形态与相应的恒磨牙形态相似
- E. 乳磨牙根干短，根分叉小

20. 上颌第一恒磨牙髓室颊舌径、近远中径和髓腔高度大小顺序正确的是（） [单选题] *

- A. 颊舌径>近远中径>髓腔高度
- B. 近远中径>颊舌径>髓腔高度
- C. 髓腔高度>颊舌径>近远中径
- D. 颊舌径>髓腔高度>近远中径
- E. 近远中径>髓腔高度>颊舌径

21. 髓腔解剖的描述中，错误的是（） [单选题] *

- A. 青少年恒牙的髓腔比老年人大
- B. 青少年恒牙的髓角高
- C. 青少年恒牙的根管粗
- D. 老年人有时发生髓腔部分或全部钙化堵塞
- E. 乳牙的髓腔绝对比恒牙大

22. 第二乳磨牙与第一恒磨牙的区别要点中哪一点是错误的（） [单选题] *

- A. 第二乳磨牙的牙冠较小、色白
- B. 第二乳磨牙的牙冠颈部明显缩小，颈嵴较突

- C. 第二乳磨牙的牙冠面尖窝清晰
- D. 第二乳磨牙的近中颊尖、远中颊尖、远中尖大小约相等
- E. 第二乳磨牙干短，牙根向外张开

23. 上颌第一磨牙髓室底位于颈缘（） [单选题] *

- A. 冠方 0.5mm 处
- B. 冠方 1.0mm 处
- C. 舁方 1.0mm 处
- D. 舁方 2.0mm 处
- E. 冠方 2.0mm 处

24. 髓腔形态的生理和病理变化中哪一点是错误的（） [单选题] *

- A. 髓腔的大小随着年龄的增长而不断缩小
- B. 乳牙髓腔比恒牙大
- C. 青少年的恒牙髓腔比老年者大
- D. 髓室顶、髓角随着牙的不断磨耗而降低
- E. 外伤、龋病对牙体的侵袭使髓腔缩小

25. 双根管型相邻根管之间的交通支称为（） [单选题] *

- A. 管间侧支
- B. 根管侧支
- C. 根尖分歧
- D. 根尖分叉
- E. 侧孔

26. 主根管存在，根管在根尖部细小的分支称为（） [单选题] *

- A. 管间侧支
- B. 根管侧支
- C. 根尖分歧
- D. 根尖分叉
- E. 侧孔

27. 发自根管的细小分支，与根管成垂直角度，贯穿牙本质和牙骨质通向牙周膜的结构称为（）
[单选题] *

- A. 管间侧支
- B. 根管侧支
- C. 根尖分歧
- D. 根尖分叉
- E. 侧孔

28. 下列哪项乳牙的外形特征是错误的（） [单选题] *

- A. 乳牙体积小，呈白垩色
- B. 乳牙颈嵴突出，冠根分明
- C. 第一乳磨牙体积最大，第二乳磨牙次之

- D.乳磨牙根短，分叉大
- E.上颌乳尖牙的牙尖偏向远中

29.不属于替牙期间牙合特点的是（） [单选题] *

- A.上颌侧切牙牙根向远中倾斜
- B.前牙轻度深覆牙合关系
- C.可能显示前牙拥挤
- D.磨牙轻度远中关系
- E.中切牙间有间隙

30.横牙合曲线由哪些牙尖的连线所构成（） [单选题] *

- A.左右两侧磨牙舌尖的连线
- B.左右两侧前磨牙的颊舌尖的连线
- C.左右两侧磨牙颊舌尖的连线
- D.左右两侧磨牙颊尖的连线
- E.左右两侧前磨牙舌尖的连线

31.补偿曲线为连接上颌（） [单选题] *

- A.切牙的切缘至最后磨牙的近远中颊尖的连线
- B.切牙的切缘至第一磨牙的近中颊尖的连线
- C.后牙近远中颊尖的连线
- D.切牙的切缘至前磨牙的颊尖的近颊连线
- E.第一磨牙的近颊尖至最后磨牙的远颊尖的连线

32.上颌磨牙近远中倾斜程度（） [单选题] *

- A.纵牙合曲线
- B.切道斜度
- C.髁道斜度
- D.横牙合曲线
- E.补偿曲线

33.磨牙颊舌向倾斜程度（） [单选题] *

- A.纵牙合曲线
- B.切道斜度
- C.髁道斜度
- D.横牙合曲线
- E.补偿曲线

34.尖牙保护牙合的牙合型特点是（） [单选题] *

- A.侧方牙合运动时，工作侧只有尖牙形成接触
- B.侧方牙合运动时，工作侧只有尖牙脱离接触
- C.侧方牙合运动时，非工作侧只有尖牙脱离接触
- D.侧方牙合运动时非工作侧只有尖牙形成接触
- E.非正中牙合时，双侧尖牙形成均匀接触

35. 生理牙列前伸合时接触的牙体是（） [单选题] *

- A. 双侧前磨牙
- B. 双侧磨牙
- C. 一侧前磨牙
- D. 一侧磨牙
- E. 前牙

36. 铰链运动开始的位置是（） [单选题] *

- A. 牙尖交错位
- B. 后退接触位
- C. 下颌姿势位
- D. 前伸位
- E. 肌接触位

37. 后退接触位滑至牙尖交错位的生理偏斜不超过（） [单选题] *

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 1.5mm
- D. 2mm
- E. 3mm

38. 后退接触位滑至牙尖交错位的距离不超过（） [单选题] *

- A. 0.5mm
- B. 1mm
- C. 1.5mm
- D. 2mm
- E. 3mm

39. 能够发挥切割功能的颌位是（） [单选题] *

- A. 后退接触位
- B. 侧颌位
- C. 下颌姿势位
- D. 前伸牙合位
- E. 牙尖交错位

40. 后退接触位形成时主要机制是（） [单选题] *

- A. 颞下颌关节韧带的可让性
- B. 髁状突在关节窝中的位置
- C. 咬合关系
- D. 升颌肌的牵张反射
- E. 覆牙合与覆盖

41. 咀嚼肌肌力闭合道的终点颌位是（） [单选题] *

- A. 后退接触位
- B. 侧颌位

- C. 下颌姿势位
- D. 前伸颌位
- E. 牙尖交错位

42. 位于上颌骨的是（） [单选题] *

- A. 锥突
- B. 颧突
- C. 翼突
- D. 颞突
- E. 额突

43. 位于上颌骨体的是（） [单选题] *

- A. 切牙孔
- B. 腭大孔
- C. 破裂孔
- D. 眶下孔
- E. 眶上孔

44. 眶下孔通入下管的方向是（） [单选题] *

- A. 后、下、外
- B. 后、上、外
- C. 后、下、内
- D. 后、上、内
- E. 以上都不是

45. 上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志是（） [单选题] *

- A. 上颌结节
- B. 颧牙槽嵴
- C. 牙槽孔
- D. 尖牙窝
- E. 颊棘

46. 颧牙槽嵴是（） [单选题] *

- A. 位于上颌骨后部
- B. 起自颧突，伸向上颌第二磨牙
- C. 是上牙槽后神经阻滞麻醉的重要标志
- D. 为翼外肌浅头的附着点
- E. 在面部或口腔前庭不易触及

47. 翼突支柱将咀嚼压力传导至颅底是通过（） [单选题] *

- A. 蝶骨翼突，上颌牙槽突的后端
- B. 上颌骨腭突，腭骨垂直部
- C. 颧牙槽嵴，上颌牙槽突的后端

- D. 腮骨垂直部，颧牙槽嵴
- E. 蝶骨翼突，上颌骨聘突

48. 同时麻醉颊神经、舌神经和下牙槽神经的穿刺部位是（） [单选题] *

- A. 下颌孔
- B. 下颌神经沟
- C. 下颌舌骨沟
- D. 下颌隆突
- E. 下颌小舌

49. 不属于下颌骨薄弱部位的是（） [单选题] *

- A. 正中联合
- B. 下颌支喙突部
- C. 颊孔区
- D. 下颌角
- E. 髁突颈部

50. 以下哪个解剖结构不位于下颌骨体部外侧面（） [单选题] *

- A. 外斜线
- B. 颊孔
- C. 正中联合
- D. 颊棘
- E. 颊结节

51. 颞下颌关节的组成部分，不包括（） [单选题] *

- A. 髁突
- B. 颞骨关节面
- C. 关节囊
- D. 喙突
- E. 关节韧带

52. 起于下颌棘的肌肉是（） [单选题] *

- A. 颊舌肌
- B. 颊舌骨肌
- C. 茎突舌骨肌
- D. 下颌舌骨肌
- E. 以上都不是

53. 喙突上附着的肌肉为（） [单选题] *

- A. 咬肌和颞肌
- B. 颞肌和颊肌
- C. 颊肌和唆肌

- D.翼内肌和咬肌
- E.翼外肌和咬肌

54.舌骨上肌群不包括（） [单选题] *

- A.翼外肌
- B.二腹肌
- C.下颌舌骨肌
- D.颏舌骨肌
- E.茎突舌骨肌

55.不参与下颌开颌运动的肌肉是（） [单选题] *

- A.翼外肌
- B.二腹肌
- C.翼内肌
- D.下颌舌骨肌
- E.颏舌骨肌

56.口周围肌群上组不包括（） [单选题] *

- A.降口角肌
- B.提上唇肌
- C.笑肌
- D.颤肌
- E.提口角肌

57.使下唇靠近牙龈并前伸下唇的表情肌是（） [单选题] *

- A.降口角肌
- B.降下唇肌
- C.提上唇肌下头
- D.笑肌
- E.颤肌

58.翼外肌下头的起点为（） [单选题] *

- A.蝶骨大翼的颞下面和颞下嵴
- B.翼外板的外侧面
- C.蝶骨翼外板的颞面
- D.关节翼肌窝
- E.颞窝及颞深筋膜

59.二腹肌中间腱附着于（） [单选题] *

- A.颌骨乳突切迹
- B.舌骨体下缘
- C.舌骨体上缘
- D.舌骨体与舌骨大角交界处

E. 舌骨体与舌骨小角交界处

60. 在大开口运动时，运动下颌的主要肌肉是（） [单选题] *

- A. 颞肌
- B. 翼外肌
- C. 翼内肌
- D. 下颌舌骨肌
- E. 咬肌

61. 咬肌的起始部位为（） [单选题] *

- A. 颞窝
- B. 翼外板内侧
- C. 腭骨锥突
- D. 蝶骨大翼
- E. 上颌骨颧突及颧弓下缘的前 2/3 和颧弓深面

62. 舌动脉在舌骨肌前缘处分成哪两条终支（） [单选题] *

- A. 舌深动脉和舌背动脉
- B. 颈下动脉和舌背动脉
- C. 舌背动脉和舌下动脉
- D. 颈动脉和舌下动脉
- E. 舌下动脉和舌深动脉

63. 颈总动脉分叉处约平于（） [单选题] *

- A. 舌骨大角
- B. 环状软骨上缘
- C. 环状软骨下缘
- D. 甲状软骨上缘
- E. 甲状软骨下缘

64. 颈外动脉的两终支为（） [单选题] *

- A. 甲状腺上动脉及舌动脉
- B. 舌动脉及面动脉
- C. 面动脉及上颌动脉
- D. 上颌动脉及颞浅动脉
- E. 颞浅动脉及枕动脉

65. 翼静脉丛与颅内交通的通道是（） [单选题] *

- A. 眼静脉、卵圆孔网、颈内静脉
- B. 眼静脉、破裂孔导血管、卵圆孔网
- C. 上颌静脉、破裂孔导血管、颈内静脉
- D. 颈内静脉、破裂孔导血管、卵圆孔网
- E. 眼静脉、上颌静脉、卵圆孔网

66.汇合形成下颌后静脉的是（） [单选题] *

- A.面静脉、颞浅静脉
- B.颞浅静脉、上颌静脉
- C.面静脉、耳后静脉
- D.翼静脉丛、上颌静脉
- E.翼静脉丛、耳后静脉

67.患者，35岁，在行左上颌结节麻醉时出现左颊面部血肿。其原因是（） [单选题] *

- A.注射针头污染
- B.刺破了翼静脉丛
- C.注射深度过浅，麻醉药存于黏膜下
- D.局部麻醉药中未加入肾上腺素
- E.损伤了上牙槽后神经

68.属于运动神经的是（） [单选题] *

- A.颞神经
- B.颞深神经
- C.耳颞神经
- D.颞神经(颞长神经)
- E.舌神经

69.下颌神经分支中属于感觉神经的是（） [单选题] *

- A.咬肌神经
- B.翼外肌神经
- C.翼内肌神经
- D.颞深神经
- E.耳颞神经

70.上颌神经出颅的部位是（） [单选题] *

- A.眶上孔
- B.卵圆孔
- C.圆孔
- D.茎乳孔
- E.棘孔

71.面神经颅外段及分支不包括（） [单选题] *

- A.颞支
- B.颧支
- C.颊支
- D.下颌缘支
- E.上颌缘支

72.面神经主干与乳突前缘的关系较为恒定，一般在（） [单选题] *

- A.乳突尖平面处，距皮肤 2~3cm
- B.距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 3~4cm
- C.距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm
- D.距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm
- E.距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 3~4cm

73.导致眼睑不能闭合，可能损伤的神经是（） [单选题] *

- A.面神经颞支
- B.面神经颧支
- C.面神经下颌缘支
- D.面神经颊支
- E.面神经颈支

74.面神经管段的分支有（） [单选题] *

- A.岩大神经、镫骨肌神经、鼓索
- B.镫骨肌神经、茎突舌肌神经、耳后神经
- C.鼓膜张肌神经、腭帆张肌神经、二腹肌神经
- D.耳后神经、茎突舌骨肌神经、二腹肌神经
- E.鼓膜张肌神经、茎突舌肌神经、腭帆张肌神经

75.下牙槽神经阻滞麻醉的主要标志为（） [单选题] *

- A.下后牙咬合平面
- B.口腔前庭
- C.颊垫尖
- D.翼下颌韧带
- E.腮腺导管开口

76.口角的正常位置约相当于（） [单选题] *

- A.尖牙
- B.尖牙和第一前磨牙之间
- C.第一前磨牙
- D.第一前磨牙和第二前磨牙之间
- E.第二前磨牙

77.下述关于口腔前庭沟的叙述中哪项是错误的（） [单选题] *

- A.又称唇颊龈沟
- B.为口腔前庭的上、下界
- C.为唇、颊黏膜移行于牙槽黏膜的沟槽
- D.前庭沟黏膜下组织致密
- E.是口腔局麻常用的穿刺及手术切口的部位

78. 舌前 2/3 的边缘及外侧淋巴管一部分引流至下颌下淋巴结，另一部分引流至（） [单选题] *

- A. 颏下淋巴结
- B. 肩胛舌骨肌淋巴结
- C. 颈深上淋巴结
- D. 锁骨上窝淋巴结
- E. 耳后淋巴结

79. 舌后 1/3 黏膜无乳头，有许多结节状淋巴组织，称为（） [单选题] *

- A. 舌根滤泡
- B. 舌根乳头
- C. 舌根淋巴结
- D. 舌扁桃体
- E. 腭扁桃体

80. 腮腺导管的体表投影是（） [单选题] *

- A. 耳屏至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 处
- B. 外耳孔至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 处
- C. 耳垂至鼻翼与口角之间中点连线的中 1/3 处
- D. 外耳孔至鼻翼连线的中 1/3 处
- E. 耳垂至鼻翼连线的中 1/3 处

81. 腮腺咬肌区的前界是（） [单选题] *

- A. 胸锁乳突肌的前缘
- B. 胸锁乳突肌的后缘
- C. 下颌支的后缘
- D. 咬肌的前缘
- E. 咬肌的后缘

82. 临幊上分腮腺为浅、深叶的依据是（） [单选题] *

- A. 颈外动脉穿经的平面
- B. 下颌后静脉穿行的平面
- C. 面神经主干及其分支的平面
- D. 咬肌的前缘
- E. 下颌支的后缘

83. 腮腺床的结构不包括（） [单选题] *

- A. 颈内动脉
- B. 颈内静脉
- C. 颈外动脉
- D. 迷走神经
- E. 舌咽神经

84.腮腺浅叶上缘，神经血管排列由后向前依次为（） [单选题] *

- A. 颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、面神经颞支、颧支
- B. 颞浅动脉、耳颞神经、颞浅静脉、面神经颞支、| 颧支
- C. 耳颞神经、颞浅静脉、颞浅动脉、面神经颞支、颧支
- D. 面神经颞支、颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、颧支
- E. 面神经颞支、颞浅动脉、耳颞神经、颞浅静脉、颧支

85.临床某患者因面部肿瘤行手术治疗，术中打开面侧深区，可以看见从翼外肌两头之间穿出的神经为（） [单选题] *

- A. 翼内肌神经
- B. 咬肌神经
- C. 下牙槽神经
- D. 颊神经
- E. 耳颞神经

86.在腮腺浅叶前缘由上到下依次为（） [单选题] *

- A. 面神经颤支，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支
- B. 面神经颤支，面神经上颊支，腮腺导管，面神经颤支，下颌缘支
- C. 面动脉，面横动脉，面神经颤支，腮腺导管
- D. 面横动脉，面神经颤支,面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支，面神经下颌缘支
- E. 面神经颤支，面横动脉，面神经上颊支，腮腺导管，面神经下颊支

87.关于面神经的论述哪项是错误的（） [单选题] *

- A. 为混合性神经
- B. 含运动纤维
- C. 含交感纤维
- D. 含味觉纤维
- E. 含副交感纤

88.舌系带与伞襞之间的三角区域内，清晰可见的结构是（） [单选题] *

- A. 舌深静脉
- B. 舌深动脉
- C. 舌神经
- D. 舌下神经
- E. 舌下神经伴行静脉

89.测定咀嚼效率最常用的方法是（） [单选题] *

- A. 称重法
- B. 吸光度法
- C. 溶解法
- D. 比色法
- E. 依咀嚼面积的大小测定

90. 咀嚼肌收缩所发挥的最大力是（） [单选题] *

- A. 咀嚼压力
- B. 咀嚼肌力
- C. 最大牙合 力
- D. 牙合 力
- E. 牙周潜力

91. 咀嚼效率是指（） [单选题] *

- A. 在一定时间内嚼碎食物的数量
- B. 嚼碎一定量食物所需的时间
- C. 在一定时间内将食物嚼碎的能力
- D. 将一定量食物嚼碎的能力
- E. 在一定时间内将一定量食物嚼碎的程度

92. 最大牙合 力是指（） [单选题] *

- A. 咀嚼肌能发挥的最大力
- B. 咀嚼中咀嚼肌实际发出之力
- C. 牙周膜的最大耐受力
- D. 牙合 力计测得的上下牙间咬合力
- E. 粉碎食物所需的力

93. 在无刺激条件下，分泌量最多的唾液腺是（） [单选题] *

- A. 舌下腺
- B. 腮腺
- C. 副腮腺
- D. 小唾液腺
- E. 下颌下腺

94. 唾液的功能不包括（） [单选题] *

- A. 消化作用
- B. 吸收作用
- C. 溶酶作用
- D. 冲洗作用
- E. 排泄作用

95. 口腔黏膜的痛觉分布不均匀，以下有关无痛区的相关描述中正确的是（） [单选题] *

- A. 与第三磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- B. 与第二磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- C. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有触觉感受点而无痛觉感受点
- D. 与第一磨牙相对的颊黏膜区有痛觉感受点而无触觉感受点
- E. 自颊侧黏膜中央至口角的一段带状区痛觉较迟钝

96.痛觉感受器密度从高到底的部位是（） [单选题] *

- A.前牙、前磨牙、磨牙
- B.前磨牙、磨牙、前牙
- C.磨牙、前磨牙、前牙
- D.前磨牙、前牙、磨牙
- E.磨牙、前磨牙、前牙

97.哪一项属于功能运动（） [单选题] *

- A.开闭口运动
- B.前后运动
- C.侧方运动
- D.边缘运动
- E.咀嚼运动

98.哪一项是指下颌向各个方向所作最大范围的运动（） [单选题] *

- A.开闭口运动
- B.前后运动
- C.侧方运动
- D.边缘运动
- E.咀嚼运动

99.热觉感受器为（） [单选题] *

- A.Meckel 环形小体
- B.克劳斯终球
- C.鲁菲尼小体
- D.游离神经末梢
- E.Meissner 触觉小体

100.痛觉感受器为（） [单选题] *

- A.Meckel 环形小体
- B.克劳斯终球
- C.鲁菲尼小体
- D.游离神经末梢
- E.Meissner 触觉小体