

2021 年 6 月临床执业医师月度考试（第四单元）

1、（A1 型选择题）尿道球部外伤时最常见的原因因为

- A.尿道器械检查
- B.刀伤
- C.骑跨伤
- D.骨盆骨折
- E.手术损伤

2、（A1 型选择题）泌尿系结石最有效的预防方法是

- A.碱化尿液
- B.调节尿 pH
- C.控制感染
- D.饮食调节
- E.大量饮水

3、（A1 型选择题）易引起排尿突然中断的结石是

- A.肾盏结石

- B.肾盂结石
- C.膀胱结石
- D.输尿管结石
- E.以上都不是

4、（A1 型选择题）前列腺增生症因过多的残余尿使膀胱失去收缩，膀胱过度充胀使少量尿从尿道口不自主流出，称为

- A.压力性尿失禁
- B.充溢性尿失禁
- C.急迫性尿失禁
- D.真性尿失禁
- E.遗尿

5、（A1 型选择题）肾结核最常见的晚期并发症为

- A.结核性尿道狭窄
- B.结核性膀胱阴道瘘
- C.结核性膀胱直肠瘘
- D.肾钙化

E.膀胱挛缩和对侧肾积水

6、（A1 型选择题）病理改变主要在肾而临床表现主要在膀胱，见于

A.肾结石

B.肾肿瘤

C.肾积水

D.肾结核

E.多囊肾

7、（A1 型选择题）子宫峡部的下界为

A.组织学外口

B.组织学内口

C.解剖学内口

D.解剖学外口

E.宫颈内口

8、（A1 型选择题）关于脑疝，下列叙述不正确的是

A.常见的脑疝类型为小脑幕切迹疝，枕骨大孔疝，大脑镰下疝

B.脑疝是颅内压增高的严重后果

C.颅内占位性病变发展到严重程度均可导致颅内各分腔压力不均而引起脑疝

D.脑疝形成后，可致脑组织、血管及脑神经受压和移位，而脑脊液的循环不会受影响

E.小脑幕切迹疝多由幕上占位引起，枕骨大孔疝多由幕下占位引起

9、（A1 型选择题）前列腺增生症早期的症状是

A.排尿费力

B.尿潴留

C.尿频

D.尿失禁

E.尿急

10、（A1 型选择题）女性胎儿卵巢开始分化发育是在胚胎

A.15~16 周

B.8~10 周

C.17~18 周

D.11~12 周

E.13~14 周

11、（A1 型选择题）以下决定膀胱癌预后最主要的因素是

- A.肿瘤大小
- B.肿瘤分布部位
- C.肿瘤浸润深度+分化程度
- D.肿瘤的数目
- E.分化程度

12、（A1 型选择题）脑震荡临床表现不包括

- A.意识障碍不超过 30 分钟
- B.意识障碍期肌腱反射消失、皮肤苍白、血压下降
- C.醒后常有头晕、头痛、恶心呕吐
- D.逆行性遗忘
- E.腰穿脑脊液中红细胞 $1000 \times 10^6/L$ （ $1000/mm^3$ ）

13、（A1 型选择题）前颅底骨折典型临床表现是

- A.鼻出血
- B.Battle 征

- C.熊猫眼征
- D.脑脊液鼻漏
- E.脑脊液耳漏

14、（A1 型选择题）帽状腱膜下血肿

- A.张力高、疼痛明显
- B.范围多较广泛
- C.一般 1~2 周可自行吸收
- D.不跨过骨缝
- E.常需切开引流

15、（A1 型选择题）下列属于原发性脑损伤的是

- A.开放性颅骨骨折
- B.脑水肿
- C.脑内血肿
- D.脑疝
- E.脑挫裂伤

16、（A1 型选择题）骨盆底形态学特征正确的是

- A.外层为盆膈
- B.肛门外括约肌属盆膈范畴
- C.中层为泌尿生殖膈
- D.球海绵体肌有松弛阴道作用
- E.肛提肌是组成骨盆底外层的肌肉

17、（A1 型选择题）从高处落下若伤及外阴部，最易发生血肿的部位是

- A.小阴唇
- B.大阴唇
- C.会阴部
- D.阴阜
- E.阴蒂

18、（A1 型选择题）枕骨大孔疝临床表现的主要特点是

- A.剧烈头痛
- B.频繁呕吐
- C.早期发生呼吸骤停
- D.血压升高

E.烦躁不安

19、（A1 型选择题）重型胎盘早期剥离的并发症不包括

A.子宫胎盘卒中

B.凝血功能障碍

C.产后出血

D.子宫破裂

E.急性肾衰竭

20、（A1 型选择题）乳头及其周围皮肤着色，乳晕周围形成小隆起称

A.蜕膜斑

B.黑加征

C.蒙氏结节

D.色素沉着

E.乳腺腺泡

21、（A1 型选择题）绝经后妇女出现血性白带，除生殖器恶性肿瘤外，最常见的疾病是

A.宫颈糜烂

- B. 宫颈息肉
- C. 宫颈黏膜炎
- D. 萎缩性阴道炎
- E. 宫腔积脓

22、（A1 型选择题）右侧卵巢动脉来自

- A. 髂外动脉
- B. 髂总动脉
- C. 腹主动脉
- D. 髂内动脉
- E. 肾动脉

23、（A1 型选择题）确诊为输卵管妊娠破裂、出血性休克，应采取的紧急措施是

- A. 扩容
- B. 给予血管活性药物
- C. 边抗休克，边开腹手术
- D. 立即手术

E.输血

24、（A1 型选择题）首次产前检查最恰当的时期应是

A.停经 6 周

B.停经 8 周

C.停经 10 周

D.确诊早孕时

E.停经 12 周

25、（A1 型选择题）治疗重度子痫前期首选的药物是

A.氯丙嗪

B.白蛋白

C.氢氯噻嗪

D.20%甘露醇

E.硫酸镁

26、（A1 型选择题）子宫性不孕，下列不正确的是

A.子宫畸形

B.子宫发育不良

C.子宫内膜炎

D.浆膜下子宫肌瘤

E.子宫内膜结核

27、（A1 型选择题）双卵双胎的性别和血型

A.一定相同

B.一定不同

C.性别相同，血型不同

D.性别不同，血型相同

E.可以相同也可以不同

28、（A1 型选择题）产后子宫复旧时间为

A.产后 30 天

B.产后 8 周

C.产后 10 周

D.产后 4 周

E.产后 6 周

29、（A1 型选择题）产后恢复排卵时间为

- A.产后 1 个月
- B.产后 42 天
- C.不哺乳者，产后 4 周，有哺乳者，产后 6 个月
- D.不哺乳者，产后 10 周，有哺乳者，产后 4~6 个月
- E.产后 6 个月

30、（A1 型选择题）临产的主要标志是

- A.不规则宫缩
- B.见红
- C.规律性宫缩并逐渐加强，伴宫颈口扩张和胎先露下降
- D.规律性宫缩，宫颈口扩张
- E.规律性宫缩，阴道流血

31、（A1 型选择题）过期妊娠是指

- A.平素月经 45 天，妊娠 > 40 周，而终止妊娠者
- B.平素月经规则，妊娠 > 40 周，而终止妊娠者
- C.平素月经规则，妊娠 > 41 周，而终止妊娠者
- D.平素月经规则，妊娠 > 42 周，而终止妊娠者

E.平素月经规则，妊娠 >42 周，而尚未分娩者

32、（A1型选择题）Hegarsign（黑加征）是指

A.宫颈变软、紫蓝着色

B.宫体变软

C.乳头周围出现褐色小结节

D.乳房出现色素沉着

E.子宫峡部极软，宫颈与宫体似不相连

33、（A1型选择题）下列哪项不是孕激素的主要生理作用

A.使子宫内膜由增生期转变为分泌期

B.使宫颈黏液黏稠，拉丝度降低

C.对下丘脑有负反馈作用

D.排卵后使基础体温上升 $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$

E.促进钠、水潴留

34、（A1型选择题）下列慢性颅内压增高所引起头颅X线改变，错误的是

A.颅缝增宽

B.枕骨大孔扩大

C.前后床突及鞍背的骨质吸

D.脑回压迹增多加深

E.蝶鞍扩大

35、（A1 型选择题）下列哪项不是急性颅内压增高的表现

A.剧烈头痛，频繁呕吐

B.Cushing 反应

C.意识障碍加深

D.X 线片示脑回压迹加深

E.去大脑强直发作

36、（A1 型选择题）除下列哪项疾病外，都应与妊娠合并病毒性肝炎相鉴

别

A.妊娠高血压疾病引起的肝损害高血压综合征

B.妊娠期急性脂肪肝

C.妊娠期肝内胆汁淤积症

D.妊娠合并糖尿病

E.妊娠剧吐引起的肝损害

37、（A1 型选择题）外伤后急性脑受压，早期临床表现是

- A. 血压升高，呼吸脉搏变慢
- B. 头痛，呕吐，视乳头水肿
- C. Cushing 反应
- D. 头痛，呕吐，进行性意识障碍
- E. 瞳孔由正常变为不等大

38、（A1 型选择题）小脑幕裂孔疝致一侧瞳孔散大的原因是

- A. 动眼神经受压
- B. 动眼神经核受压
- C. 疝侧中脑受压
- D. 疝侧桥脑受压
- E. 疝侧延髓受压

39、（A1 型选择题）有关巨大胎儿的相关因素有

- A. 吸烟
- B. 妊娠合并糖尿病
- C. 长期酗酒

D.低经济收入

E.父母身材矮小

40、（A1 型选择题）关于颅底骨折，下列错误的是

A.形态多为线形骨折

B.根据部位可分为三型

C.可表现为中枢性面瘫

D.若伤及颈内动脉，形成海绵窦瘘

E.X 线片仅显示 30%~50%的骨折线

41、（A1 型选择题）枕左前位胎头进入骨盆入口的衔接径线是

A.枕颞径

B.双顶径

C.枕下前囟径

D.双颞径

E.枕额径

42、（A1 型选择题）颅前窝骨折最易损伤的脑神经是

A.三叉神经

- B.面神经
- C.嗅神经
- D.展神经
- E.滑车神经

43、（A1 型选择题）关于产后出血的定义正确的是

- A.胎儿娩出后 12 小时内阴道流血 $> 500\text{ml}$
- B.胎盘娩出后阴道出血 $> 500\text{ml}$
- C.胎儿娩出后的 24 小时内失血量 $> 500\text{ml}$
- D.分娩过程中的失血量 $> 500\text{ml}$
- E.产后 24 小时后到产后 42 天阴道流血 $> 500\text{ml}$

44、（A1 型选择题）胎盘早期剥离的主要病理变化是

- A.胎盘边缘血窦破裂
- B.胎盘血管痉挛
- C.底蜕膜出血
- D.包蜕膜出血
- E.真蜕膜出血

45、（A1 型选择题）第一产程发生羊水栓塞时的处理原则是

- A.应用催产素加速分娩
- B.立即剖宫产
- C.立即切除子宫
- D.防止肾功能衰竭
- E.改善母体呼吸和循环功能，纠正凝血功能障碍，再处理分娩

46、（A1 型选择题）子宫内膜腺上皮细胞出现含糖原小泡，相当于子宫内膜周期中的

- A.增生期中期
- B.增生期晚期
- C.分泌期晚期
- D.分泌期中期
- E.分泌期早期

47、（A1 型选择题）完全臀先露的特点为胎儿

- A.一膝或双膝关节先露
- B.双髋关节及双膝关节均伸直

- C.双髋关节及双膝关节均屈曲
- D.双髋关节伸直，双膝关节屈曲
- E.双髋关节屈曲，双膝关节伸直

48、（A1 型选择题）下列哪项与子宫脱垂的发生无关

- A.肛提肌
- B.主韧带
- C.卵巢固有韧带
- D.子宫骶韧带
- E.圆韧带

49、（A1 型选择题）基础体温测定描述正确的是

- A.有排卵的女性基础体温为单向
- B.无排卵的女性基础体温为双向
- C.妊娠后基础体温下降
- D.流产后基础体温上升
- E.无排卵的女性基础体温为单向

50、（A1 型选择题）麻疹患儿 Koplik 斑出现于

A.起病后第 2~3 天

B.起病后第 4~5 天

C.出疹初期

D.出疹期

E.潜伏期末期

51、（A1 型选择题）国内规定麻瘦疫苗的初种时间为

A.生后 4 个月

B.生后 5 个月

C.生后 6 个月

D.生后 7 个月

E.生后 8 个月

52、（A1 型选择题）下列哪项不是幼儿急疹的临床特点

A.持续高热 3~5 天

B.热退后出疹

C.皮疹主要分布在四肢末端

D.皮疹消退后无色素沉着或脱屑

E.皮疹呈红色斑疹或斑丘疹

53、（A1 型选择题）在水痘的并发症中，哪项是不常见的

A.水痘脑炎

B.水痘肺炎

C.皮肤继发感染

D.血小板减少

E.肾炎

54、（A1 型选择题）试管婴儿是

A.人工授精

B.配子输卵管内移植

C.宫腔配子移植

D.胚泡移植

E.体外受精与胚胎移植

55、（A1 型选择题）婴儿结核性脑膜炎早期主要表现为

A.发热、盗汗、消瘦

B.便秘

C.蹙眉、皱额、凝视、嗜睡

D.食欲下降、呕吐

E.惊厥

56、（A1 型选择题）小儿肠管的长度为身长的

A.4~6 倍

B.1~3 倍

C.8~10 倍

D.5~7 倍

E.10 倍以上

57、（A1 型选择题）小儿 5 岁，生长发育正常，根据身高公式计算，小儿身高为

A.105cm

B.110cm

C.120cm

D.115cm

E.100cm

58、（A1 型选择题）最能反映婴儿营养状况的体格发育指标是

- A.头围、胸围
- B.牙齿数
- C.体重
- D.身长
- E.前囟大小

59、（A1 型选择题）不符合小儿生长发育的一般规律的是

- A.由上到下
- B.由粗到细
- C.由远到近
- D.由低级到高级
- E.由简单到复杂

60、（A1 型选择题）新生儿生后 6 小时内出现呼吸急促（ >60 次/分），鼻扇，呼气呻吟，吸气性三凹征，青紫等，且以上症状进行性加重。泡沫试验阳性。最可能诊断为

- A.膈疝

- B. 湿肺
- C. 新生儿呼吸窘迫综合征
- D. 新生儿缺血缺氧性脑病
- E. B 组链球菌肺炎

61、（A1 型选择题）男婴,6 个月, 平时多汗, 有夜惊, 枕秃明显, 易激惹, 烦躁, 睡眠不安。早期诊断最可靠的指标是

- A. 血 25- (OH) -D3 升高
- B. 血 25- (OH) -D3 下降
- C. 血清钙、磷同步下降
- D. 血清钙下降
- E. 血清磷增高

62、（A1 型选择题）新生儿期是指

- A. 从脐带结扎到生后 1 个月
- B. 从脐带结扎到生后 7 天
- C. 从脐带结扎到生后 28 天
- D. 妊娠 28 周至生后 7 天

E.妊娠 28 周至生后 28 天

63、（A1 型选择题）小儿应有乳牙数为

A.12 颗

B.13 颗

C.14 颗

D.18 颗

E.20 颗

64、（A1 型选择题）苯丙酮尿症临床症状出现的时间一般为

A.2 个月

B.1 岁

C.3~6 个月

D.2~3 个月

E.3~4 个月

65、（A2 型选择题）5 岁女孩，平时常“感冒”，易患肺炎。体检时发现胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及IV级粗糙全收缩期杂音，诊断考虑

A.室间隔缺损

- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

66、（A1 型选择题）下列何种先心病可出现周围血管征

- A.肺动脉狭窄
- B.法洛四联症
- C.房间隔缺损
- D.动脉导管未闭
- E.室间隔缺损

67、（A1 型选择题）10 岁女孩，学校常规体检时发规胸骨左缘第 2 肋间可闻及Ⅲ级收缩期杂音，经心脏彩超诊断为房间隔缺损。该患儿杂音产生的原理是

- A.二尖瓣相对狭窄
- B.三尖瓣相对狭窄
- C.肺动脉瓣相对狭窄

D.主动脉瓣相对狭窄

E.缺损口处的血液湍流

68、（A1 型选择题）治疗甲状腺功能减低症患者最有效措施

A.加强训练，改善神经系统症状

B.服用甲状腺片

C.服用碘制剂

D.服用铁剂及叶酸维生素 B12

E.增补钙剂

69、（A1 型选择题）X 线示右心房、右心室肥大的先心病是

A.室间隔缺损

B.肺动脉狭窄

C.动脉导管未闭

D.法洛四联症

E.房间隔缺损

70、（A1 型选择题）早产儿指甲外观特点是

A.指甲硬

- B.反甲
- C.甲面多白纹
- D.指甲超过指尖
- E.指甲未达指尖

71、（A1 型选择题）提示新生儿败血症较特殊的表现是

- A.精神欠佳
- B.体温不稳定
- C.黄疸退而复现
- D.哭声减弱
- E.食欲欠佳

72、（A1 型选择题）为降低高胆红素血症，防止核黄疸的发生最为有效的方法是

- A.苯巴比妥口服
- B.清蛋白静滴
- C.蓝光照射
- D.激素应用

E.静滴葡萄糖

73、（A1 型选择题）苯丙酮尿症最重要的治疗原则是

A.限制蛋白质摄入

B.大量维生素

C.补充 5-羟色胺

D.对症处理

E.限制苯丙氨酸摄入

74、（A1 型选择题）苯丙酮尿症患者临床上最突出的表现是

A.肌张力增高

B.毛发、皮肤色泽变浅

C.智力低下

D.尿和汗液有鼠尿味

E.惊厥

75、（A1 型选择题）女性，34 岁，G3P0。因月经过多,继发贫血就诊。半年来月经周期规则，经期延长，经量多，顺腿流，偶有痛经，白带稍多。查:子宫均匀增大如孕 7 周，双附件未见异常。B 超发现宫腔内有一实性团块直径 3.5cm，此病人最可能的诊断

- A. 子宫黏膜下肌瘤
- B. 子宫浆膜下肌瘤
- C. 子宫肌壁间肌瘤
- D. 子宫肌腺瘤
- E. 卵巢肿物

76、（A2 型选择题）妊娠 39 周，患者早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊入院，查血压 90/60mmHg, 脉搏 119 次/分，神清，宫高 36cm, 臀先露、高浮、胎心 160 次/分，骨盆正常，阴道少量活动性流血。最适当的处理是

- A. 人工破膜
- B. 输血输液同时行剖宫术
- C. 期待疗法
- D. 臀位牵引术
- E. 催产素滴注引产

77、（A2 型选择题）经产妇，孕 37 周，血压 150/110mmHg，水肿（++），血 Hb80g/L，尿蛋白（++），诉头昏、头痛、胸闷，最恰当的处理是

- A. 卧床休息等待临产
- B. 输血治疗

C.积极治疗 24~48 小时，无好转应终止妊娠

D.立即剖宫产

E.补钙利尿等治疗

78、（A2 型选择题）患者 25 岁，婚后 2 年不孕，月经周期不规则。妇科检查无异常发现，基础体温呈双相型，黄体期短。应考虑为

A.有排卵性功血

B.无排卵性功血

C.黄体功能不足

D.黄体萎缩不全

E.多囊卵巢综合征

79、（A2 型选择题）某 25 岁初产妇，孕 39 周，羊水过多，规律宫缩 10 小时，破膜后突然剧烈腹痛，阴道少量流血，查体：血压 95/56mmHg，脉搏 120 次/分，宫底剑突下一横指，有压痛。胎心胎位不清，宫口开大 2cm，S+1。最恰当的处理是

A.静点缩宫素

B.头皮钳牵引

C.立即剖宫产

D.抗凝止血

E.肌注哌替啶

80、（A2 型选择题）孕妇，近 1 周外阴痒，检查阴道黏膜充血，有白色膜状物，擦除后露出红肿黏膜面，最可能的诊断是

A.急性淋病

B.细菌性阴道炎

C.滴虫性阴道炎

D.念珠菌阴道炎

E.老年性阴道炎

81、（A2 型选择题）初孕妇，孕 35 周，轻度子痫前期，住院治疗时，突感下腹痛，2 小时后，脸色苍白，宫底上升，胎心消失，宫缩间隙子宫不放松，宫口开 2cm，头先露。下列最佳处理方案是

A.人工破膜加速产程

B.注射镇静剂，调整宫缩

C.立即剖宫产

D.静滴催产素

E.宫口开全后行穿颅术

82、（A2型选择题）27岁初产妇，35周妊娠，下肢水肿，血压升高3天伴头晕、头痛。检查：血压170/110mmHg，心率88次/分，下肢水肿（++）。宫高30cm，腹围94cm，胎位LOA，胎心率150次/分，24小时尿蛋白定量5.3g。入院应用硫酸镁治疗2天后，血压仍波动在165/110mmHg左右，复查24小时尿蛋白5.2g，应采取哪种治疗

- A.肌注冬眠1号
- B.速尿20mg静点
- C.白蛋白20g静点
- D.适量硝普钠静点
- E.终止妊娠

83、（A2型选择题）63岁女性，绝经15年，腹胀消瘦2个月，妇检：腹水征（+），子宫萎缩，盆腔大量肿块，不规则，并可在腹部扪及。抽出腹水呈淡血性，病理检查见瘤细胞。最可能的诊断是

- A.宫颈癌
- B.内膜癌
- C.卵巢癌
- D.卵巢囊腺癌
- E.胃癌

84、（A2 型选择题）患者，30 岁。人流术后 4 个月，未来月经，子宫大小正常，用雌孕激素序贯疗法治疗无撤退性出血，最大可能是

A.卵巢性闭经

B.垂体性闭经

C.子宫性闭经

D.下丘脑性闭经

E.妊娠

85、（A2 型选择题）足月儿，因胎心过快，急行剖宫产，出生后即哭闹不安有时口角抖动，心肺正常，最可能的诊断是

A.新生儿窒息

B.新生儿肺炎

C.湿肺

D.缺氧缺血性脑病

E.颅内出血

86、（A1 型选择题）关于维生素 D 缺乏性佝偻病的预防措施，不正确的是

A.及时添加辅食

B. 产后 2 周即应补充维生

C. 提倡母乳喂养

D. 添加户外活动

E. 每日补充维生素 D1000IU

87、（A2 型选择题）女，8 岁，干咳 1 周伴咽痛、低热，右下肺呼吸音减弱，无明显干、湿啰音，肺部 X 线两下肺呈云雾状浸润影，该患儿最可能的诊断是

A. 大叶性肺炎

B. 肺结核

C. 金黄色葡萄球菌肺炎

D. 支原体肺炎

E. 腺病毒肺炎

88、（A2 型选择题）1 岁半小儿，食欲差，智力落后，出牙 2 颗，身高 70cm，前囟 1cm×1cm，家人要求补钙治疗。你认为应首先下列哪项检查最有助于诊断

A. 25（OH）D3 测定

B. Ca、P、AKP

C.1, 25 (OH) 2D3

D.左腕掌上位放大像

E.T3、T4、TSH

89、(A2型选择题) 3岁小儿, 突然高热伴咳嗽5天, 经红霉素治疗无效, 体温仍高, 烦躁不安, 呼吸52次/分, 心率160次/分, 胸片示有圆形密度增高阴影, 伴液气胸。本例应立即给予以下哪项治疗措施

A.退热药

B.镇静药

C.强心剂

D.利尿剂

E.胸腔穿刺引流

90、(A2型选择题) 7个月男婴, 腹泻3~4天, 大便8~9次/天, 为稀水样, 伴呕吐1~2次/天。体检皮肤稍干, 弹性差, 心音低钝。此患儿入院时最重要的处理是

A.纠正水、电解质紊乱

B.调整与适当控制饮食

C.控制肠内外感染

D.给予止吐药

E.给予消化药

91、（A2型选择题）患儿，女，6岁。咳嗽40天，多为夜间、清晨和运动后咳嗽，无痰，无发热。曾用阿奇霉素、头孢克洛等治疗效果不佳。PPD试验（-），胸片未见异常。其母患过敏性鼻炎。最可能的诊断是

A.过敏性鼻炎

B.原发性肺结核

C.咳嗽变异性哮喘

D.支气管肺炎

E.支气管炎

92、（A2型选择题）9岁男孩，右小腿轻微外伤后发热（39.5℃）5天，右小腿上端肿胀，剧痛，局部皮温高，肤色正常，白细胞计数 $25 \times 10^9/L$ ，X线片未见明显变化，局部穿刺，针达骨膜下时抽出黄色脓汁，首先应考虑为

A.化脓性骨髓炎

B.化脓性膝关节炎

C.急性蜂窝织炎

D.滑囊炎感染

E. 胫骨上端骨结核转变为膝关节全关节结核

93、（A2 型选择题）患者女，65 岁。胆结石术后 2 天突发呼吸困难 1 小时。查体：BP180/110mmHg，端坐呼吸，烦躁不安，大汗，口唇发绀，双肺可闻及干湿啰音，心率 120 次/分。该患者呼吸困难最可能的原因是并发

A. 急性呼吸窘迫综合征

B. 继发肺部感染

C. 急性左心衰竭

D. 自发性气胸

E. 右心衰竭

94、（A2 型选择题）有一名颅内压增高的患者，病情有加剧表现，处理的关键措施是

A. 20%甘露醇 250ml，一日 2 次，静点

B. 安静卧床，头高 30°

C. 保持便通

D. 头颅 CT 或头颅 MRI

E. 限制水、盐摄入量

95、（A1 型选择题）颅内压增高患者昏迷，治疗呼吸道梗阻最有效的措施

是

- A.通过鼻腔口腔导管吸痰
- B.气管切开
- C.环甲膜穿刺
- D.气管插管，呼吸机辅助呼吸
- E.用开口器侧卧位引流

96、（A2 型选择题）一女性患者，41 岁。诉头痛头晕，颈侧弯后伸后头晕加重并出现猝倒。肱二头肌腱反射亢进，颈椎斜位片显示钩椎关节增生，你认为最大的可能是

- A.梅尼埃征
- B.体位性眩晕
- C.脊髓肿瘤
- D.粘连性蛛膜炎
- E.椎动脉型颈椎病

97、（A2 型选择题）28 岁妇女，末次月经不清，产科检查:宫高 33cm,腹围 100cm,胎头已衔接，其孕周应为

- A.40 周

B.36 周

C.32 周

D.28 周

E.24 周

98、（A2 型选择题）男，20 岁，因交通事故头顶可见直径 10cm 血肿，意识清楚，恶心、呕吐，急救处置时不恰当的措施是

A.血压、脉搏、呼吸、意识监测

B.行头颅 MRI 检查

C.穿刺抽吸头皮下血肿

D.给予脱水剂

E.给予镇静剂

99、（A2 型选择题）男，28 岁。结婚 4 年不育来就诊。查:左侧阴囊下垂，左睾丸较右侧小，质地较右侧软,左精索可触及蚯蚓状团状肿块，触痛阴性
该患者诊断为

A.左睾丸萎缩

B.左睾丸炎

C.左精索静脉曲张

D.左精索静脉曲张

E.左斜疝

100、（A2 型选择题）女，50 岁。间断无痛全程肉眼血尿 3 天,查:肾区无叩痛,尿检红细胞满视野,膀胱镜未见异常,静脉尿路造影示右肾盂有充盈缺损,首先应考虑诊断为

A.肾盂肾炎

B.肾结核

C.肾结石

D.肾盂癌

E.肾囊肿

101、（A2 型选择题）24 岁妇女,孕 33 周,初产妇,产前检查:胎背位于母体腹部右侧,胎心位于脐右上,宫底部触及浮球感,耻骨上方先露部较软,不规则,诊断何种胎方位

A.ROA

B.RSA

C.ROP

D.ROT

E.RSP

102、（A2 型选择题）女，25 岁，10 天前因停经 41 天，妊娠试验阳性，行吸宫流产术，今晨突然晕倒在地，体温 37.5°C，血压 75/52mmHg，脉搏 100 次/分，下腹压痛及反跳痛明显，阴道少量流血，宫颈举痛明显，宫口闭，子宫稍大、稍软，右侧似有一每块边缘不清，有压痛。查白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.7，最准确的诊断是

- A.人工流产不全
- B.流产后右附件炎
- C.颈粘连
- D.右卵管妊娠破裂
- E.急性阑尾炎

103、（A2 型选择题）某初产妇妊娠 40 周，产前无痛性阴道流血三次，自然分娩，胎盘娩出后阴道流血约 500ml，检查胎盘完整，胎膜破口距胎盘边缘 4cm，此产妇出血的原因最大可能是

- A.胎盘早剥
- B.宫缩乏力
- C.前置胎盘
- D.胎盘残留

E.副胎盘

104、（A2 型选择题）初孕妇，孕 39 周，无痛性阴道流血，出血量达 600ml，胎心好，140 次/分，无宫缩，B 超提示前置胎盘,最恰当的处理是

- A.绝对卧床休息
- B.催产素静滴引产
- C.行人工破膜
- D.剖宫产终止妊娠
- E.水囊引产

105、（B1 型选择题）怀疑早期胃癌可采用

- A.X 线平片
- B.X 线钡餐造影
- C.纤维内镜检查
- D.B 超检查
- E.CT

106、（B1 型选择题）怀疑骨肿瘤可采用

- A.X 线平片

B.X 线钡餐造影

C.纤维内镜检查

D.B 超检查

E.CT

107、（B1 型选择题）怀疑肝脏肿瘤可采用

A.X 线平片

B.X 线钡餐造影

C.纤维内镜检查

D.B 超检查

E.CT

108、（B1 型选择题）24 岁，月经周期 5/28 天，现月经周期第 18 天，基础体温双相，此时子宫内膜的改变

A.增生早期

B.分泌中期

C.分泌早期

D.增生中期

E.增生晚期

109、（B1 型选择题）41 岁，月经周期 7/30 天，现月经周期第 9 天，基础体温双相，此时子宫内膜的改变

A.增生早期

B.分泌中期

C.分泌早期

D.增生中期

E.增生晚期

110、（B1 型选择题）苯丙酮尿症各型鉴别试验为

A.血清铜蓝蛋白测定

B.鸟嘌呤分析

C.染色体分析

D.尿三氧化铁试验

E.格思里试验

111、（B1 型选择题）苯丙酮尿症较大儿童筛查试验为

A.血清铜蓝蛋白测定

B.鸟嘌呤分析

C.染色体分析

D.尿三氧化铁试验

E.格思里试验

112、（B1 型选择题）苯丙酮尿症新生儿期筛查试验为

A.血清铜蓝蛋白测定

B.鸟嘌呤分析

C.染色体分析

D.尿三氧化铁试验

E.格思里试验

113、（B1 型选择题）21-三体综合征的确诊方法为

A.血清铜蓝蛋白测定

B.鸟嘌呤分析

C.染色体分析

D.尿三氧化铁试验

E.格思里试验

114、（B1 型选择题）病毒性心肌炎

- A.胸骨左缘第 3 肋间Ⅱ～Ⅲ级收缩期杂音，体瘦，反复呼吸道感染
- B.有链球菌感染证据，心脏有杂音
- C.1 岁以内发病，充血性心力衰竭，X 线左心室肥大、左心缘搏动减弱
- D.心脏无杂音，但常有心律失常，实验室检查可发现病毒感染证据
- E.贫血、脾大、皮肤瘀斑，血培养阳性,超声心动图可看到赘生物

115、（B1 型选择题）感染性心内膜炎

- A.胸骨左缘第 3 肋间Ⅱ～Ⅲ级收缩期杂音，体瘦，反复呼吸道感染
- B.有链球菌感染证据，心脏有杂音
- C.1 岁以内发病，充血性心力衰竭，X 线左心室肥大、左心缘搏动减弱
- D.心脏无杂音，但常有心律失常，实验室检查可发现病毒感染证据
- E.贫血、脾大、皮肤瘀斑，血培养阳性,超声心动图可看到赘生物

116、（B1 型选择题）风湿性心脏炎

- A.胸骨左缘第 3 肋间Ⅱ～Ⅲ级收缩期杂音，体瘦，反复呼吸道感染
- B.有链球菌感染证据，心脏有杂音
- C.1 岁以内发病，充血性心力衰竭，X 线左心室肥大、左心缘搏动减弱

D.心脏无杂音，但常有心律失常，实验室检查可发现病毒感染证据

E.贫血、脾大、皮肤瘀斑，血培养阳性,超声心动图可看到赘生物

117、（B1 型选择题）X 线检查可见小片浸润影、小脓肿、单个或多个液气
囊腔

A.腺病毒性肺炎

B.肺炎支原体肺炎

C.肺炎球菌肺炎

D.金黄色葡萄球菌

E.急性支气管炎

118、（B1 型选择题）胸部 X 线表现呈多形态浸润影

A.腺病毒性肺炎

B.肺炎支原体肺炎

C.肺炎球菌肺炎

D.金黄色葡萄球菌

E.急性支气管炎

119、（B1 型选择题）股动脉枪击音

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

120、（B1 型选择题）靴形心

- A.室间隔缺损
- B.房间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

121、（A3/A4 型选择题）5 岁患儿，因肢体震颤 2 个月余，加重 1 周来诊。询问病史:其母孕期妊娠反应较严重且平素有挑食的习惯，出生时未见明显异常，生后一直母乳喂养至今，未添加任何辅食。查体:虚胖，毛发稀黄，面色苍黄，肝肋下 3cm，脾肋下 1.5cm，表情呆滞，智力发育落后，肢体震颤，踝阵挛阳性。首先应进行哪项检查

- A.心电图

B.脑电图

C.B 型超声检查

D.血常规检查

E.尿常规检查

122、（A3/A4 型选择题）5 岁患儿，因肢体震颤 2 个月余，加重 1 周来诊。询问病史:其母孕期妊娠反应较严重且平素有挑食的习惯，出生时未见明显异常，生后一直母乳喂养至今，未添加任何辅食。查体:虚胖，毛发稀黄，面色苍黄，肝肋下 3cm，脾肋下 1.5cm，表情呆滞，智力发育落后，肢体震颤，踝阵挛阳性。确诊的实验室检查是

A.网织红细胞计数

B.血气分析

C.骨髓象检查

D.血沉检查

E.血常规检查

123、（A3/A4 型选择题）5 岁患儿，因肢体震颤 2 个月余，加重 1 周来诊。询问病史:其母孕期妊娠反应较严重且平素有挑食的习惯，出生时未见明显异常，生后一直母乳喂养至今，未添加任何辅食。查体:虚胖，毛发稀黄，面色苍黄，肝肋下 3cm，脾肋下 1.5cm，表情呆滞，智力发育落后，肢体震颤，踝阵

挛阳性。此患儿最不可能出现的指标是

- A. 血红蛋白 86g/L
- B. 红细胞 $2.2 \times 10^{12}/L$
- C. 血小板 $82 \times 10^9/L$
- D. 网织红细胞计数 10%
- E. 白细胞 $3.5 \times 10^9/L$

124、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。生后有哭闹后青紫，6 个月后明显，平时喜蹲踞。哭闹时有突发呼吸急促，青紫加重，严重对伴昏厥。此次因同样发作而入院，体检：口唇，指、趾甲青紫，杵状指、趾，胸骨左缘 2~3 肋间 III~IV 级收缩期喷射性杂音，肺动脉瓣第二心音减弱。此病例最可能诊断为

- A. 单纯肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损伴重度肺动脉高压
- C. 大动脉转位
- D. 法洛四联症
- E. 房间隔缺损伴轻度肺动脉狭窄

125、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。生后有哭闹后青紫，6 个月后明显，平时喜蹲踞。哭闹时有突发呼吸急促，青紫加重，严重对伴昏厥。此次因同样

发作而入院，体检：口唇，指、趾甲青紫，杵状指、趾，胸骨左缘 2~3 肋间 III~IV 级收缩期喷射性杂音，肺动脉瓣第二心音减弱。上述患儿最典型的心电图改变是哪种

- A. 右心房扩大
- B. 左心室肥厚
- C. 右心室肥厚
- D. 不完全右束支传导阻滞
- E. 预激综合征

126、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。生后有哭闹后青紫，6 个月后明显，平时喜蹲踞。哭闹时有突发呼吸急促，青紫加重，严重对伴昏厥。此次因同样发作而入院，体检：口唇，指、趾甲青紫，杵状指、趾，胸骨左缘 2~3 肋间 III~IV 级收缩期喷射性杂音，肺动脉瓣第二心音减弱。上述患儿杂音形成是由于

- A. 血液经室间隔缺损自右室流入左室
- B. 血液经室间隔缺损自左室流入右室
- C. 右心室流出道狭窄
- D. 经主动脉的血流增多
- E. 右心室肥厚收缩力量增强

127、（A3/A4 型选择题）男，7 个月，因腹泻 4 天，呕吐 2 天而入院。每天排出水样便 7~10 次，查体：精神萎靡，哭时泪少，尿少，前囟及眼窝凹陷，皮肤弹性差，心肺（-），血钠为 135mmol/L。其脱水程度及性质为

- A. 轻度等渗性脱水
- B. 轻度低渗性脱水
- C. 中度等渗性脱水
- D. 中度低渗性脱水
- E. 重度等渗性脱水

128、（A3/A4 型选择题）男，7 个月，因腹泻 4 天，呕吐 2 天而入院。每天排出水样便 7~10 次，查体：精神萎靡，哭时泪少，尿少，前囟及眼窝凹陷，皮肤弹性差，心肺（-），血钠为 135mmol/L。患儿脱水纠正后，已排尿，考虑补钾。此时补液瓶中有液体 250ml，最多可加 10%氯化钾多少毫升

- A. 2ml
- B. 4ml
- C. 6ml
- D. 7ml
- E. 10m

129、（A3/A4 型选择题）男，7 个月，因腹泻 4 天，呕吐 2 天而入院。每天排出水样便 7~10 次，查体：精神萎靡，哭时泪少，尿少，前囟及眼窝凹陷，皮肤弹性差，心肺（-），血钠为 135mmol/L。在静脉补钾过程中，患儿突然出现抽搐，考虑最可能为

- A. 低血糖症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低钠血症
- E. 低镁血症

130、（A3/A4 型选择题）足月儿，第 4 胎第 3 产，出生时一般情况好，无青紫窒息，纯母乳喂养，生后 11 小时即出现黄疸，其母孕期体健前，3 胎中，第 1 胎为人工流产，第 2、3 胎在生后均因黄疸死亡。该患儿黄疸的原因最可能为

- A. 生理性黄疸
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿溶血症
- D. 新生儿肝炎
- E. 以上都不是

131、（A3/A4 型选择题）足月儿，第 4 胎第 3 产，出生时一般情况好，无青紫窒息，纯母乳喂养，生后 11 小时即出现黄疸，其母孕期体健前，3 胎中，第 1 胎为人工流产，第 2、3 胎在生后均因黄疸死亡。检查发现患儿血红蛋白 100g/L，血清胆红素 386 μ mol/L。此时下列哪项检查最重要

- A. 培养
- B. 肝功能
- C. 母婴血型鉴定
- D. 肝炎标志物检查
- E. TORCH 检查

132、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。1 岁时患麻疹后食欲差常有腹泻，身高 83cm，体重 6kg，面色苍，白，皮肤干燥，腹部皮下脂肪 0.3cm，心音低钝，脉搏缓慢。其主要诊断应是

- A. 营养性贫血
- B. 婴幼儿腹泻
- C. 蛋白质-热能营养不良
- D. 先天性甲状腺功能减低症
- E. 心功能不全

133、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。1 岁时患麻疹后食欲差常有腹泻，身高 83cm,体重 6kg,面色苍，白，皮肤干燥，腹部皮下脂肪 0.3cm，心音低钝，脉搏缓慢。假设该患儿出现哭时少泪，眼球结膜有毕脱斑，则并发有

- A.维生素 E 缺乏
- B.维生素 D 缺乏
- C.维生素 C 缺乏
- D.维生素 B 缺乏
- E.维生素 A 缺乏

134、（A3/A4 型选择题）女孩，2 岁。1 岁时患麻疹后食欲差常有腹泻，身高 83cm,体重 6kg,面色苍，白，皮肤干燥，腹部皮下脂肪 0.3cm，心音低钝，脉搏缓慢。假设此患儿清晨突然面色苍白、体温不升、呼吸暂停、神志不清，最可能的原因是

- A.低钙血症引起的喉痉挛
- B.低钾血症引起的呼吸肌麻痹
- C.急性心力衰竭
- D.自发性低血糖
- E.脱水引起休克

135、（A3/A4 型选择题）女孩，1 岁，发热 9 天。查体： $T39^{\circ}\text{C}$ ，眼结膜充血，口唇鲜红、干裂，舌呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹，右颈淋巴结蚕豆大，双肺呼吸音粗，心率 130 次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端少许膜状脱皮。该患儿最可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 幼年类风湿关节炎
- C. 传染性单核细胞增多症
- D. 猩红热
- E. 金黄色葡萄球菌血症

136、（A3/A4 型选择题）女孩，1 岁，发热 9 天。查体： $T39^{\circ}\text{C}$ ，眼结膜充血，口唇鲜红、干裂，舌呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹，右颈淋巴结蚕豆大，双肺呼吸音粗，心率 130 次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端少许膜状脱皮。若确诊该病，以下检查不符合的是

- A. 外周血白细胞增高，以粒细胞为主
- B. 血沉不变或升高
- C. 血清 IgG、IgM、Ig
- D. IgA 升高
- E. 胸片示肺纹理增多，右下肺有斑片状阴影

.血循环免疫复合物升高

137、（A3/A4 型选择题）女孩，1 岁，发热 9 天。查体：T39°C，眼结膜充血，口唇鲜红、干裂，舌呈草莓样，皮肤有浅红色斑丘疹，右颈淋巴结蚕豆大，双肺呼吸音粗，心率 130 次/分，腹软，肝、脾无肿大，指、趾端少许膜状脱皮。该病急性期的最佳治疗药物是

- A.阿司匹林
- B.糖皮质激素
- C.丙种球蛋白
- D.丙种球蛋白+阿司匹林
- E.糖皮质激素+阿司匹林

138、（A3/A4 型选择题）患儿，9 个月。右睾丸未下降阴囊内，查右阴囊空虚未触及睾丸，左侧发育正常。该患儿应采取的正确治疗是

- A.右睾丸固定
- B.右睾丸切除
- C.药物绒毛膜促性腺激素治疗
- D.睾酮治疗
- E.等到 1 岁时仍不下降用绒毛膜促性腺激素治疗

139、（A3/A4 型选择题）患儿，9 个月。右睾丸未下降阴囊内，查右阴囊空虚未触及睾丸，左侧发育正常。患儿 2 岁仍未下降应采取的治疗是

- A.右睾丸切除
- B.右睾丸固定
- C.睾酮治疗
- D.绒毛膜促性腺激素治疗
- E.观察等待到 5 岁

140、（A3/A4 型选择题）患儿，9 个月。右睾丸未下降阴囊内，查右阴囊空虚未触及睾丸，左侧发育正常。该患儿手术中发现右睾丸发育极差如黄豆粒大小，应采取的治疗是

- A.右睾丸切除，如有斜疝行修补术
- B.右睾丸切除
- C.右睾丸固定术+人绒毛膜促性腺激素治疗
- D.右睾丸固定术+睾酮治疗
- E.右睾丸切除+睾酮治疗

141、（A3/A4 型选择题）7 个月婴儿，呕吐、腹泻 3 天。大便 10 余次/天，呈蛋花汤样，有腥臭味，尿量极少，皮肤弹性差，前囟、眼窝明显凹陷，

四肢厥冷大便镜检白细胞偶见。血清钠 135mmol/L。病原学诊断最可能是

- A.金黄色葡萄球菌肠炎
- B.产毒性大肠杆菌肠炎
- C.空肠弯曲菌肠炎
- D.难辨梭状芽孢杆菌肠炎
- E.白色念珠菌肠炎

142、（A3/A4 型选择题）7 个月婴儿，呕吐、腹泻 3 天。大便 10 余次/天，呈蛋花汤样，有腥臭味，尿量极少，皮肤弹性差，前囟、眼窝明显凹陷，四肢厥冷大便镜检白细胞偶见。血清钠 135mmol/L。脱水的严重程度和性质

- A.中度等渗性脱水
- B.中度低渗性脱水
- C.重度低渗性脱水
- D.重度等渗性脱水
- E.重度高渗性脱水

143、（A3/A4 型选择题）7 个月婴儿，呕吐、腹泻 3 天。大便 10 余次/天，呈蛋花汤样，有腥臭味，尿量极少，皮肤弹性差，前囟、眼窝明显凹陷，四肢厥冷大便镜检白细胞偶见。血清钠 135mmol/L。进行补液治疗，首批静脉

输液应给予

A. 2 : 1 等张含钠液 100~120ml/kg

B. 2 : 1 等张含钠液 20ml/kg

C. 1/2 张含钠液 100~200ml/kg

D. 2/3 张含钠液 50~100ml/kg

E. 1/2 张含钠液 50~100ml/kg

144、（A3/A4 型选择题）女性，72 岁。1 小时前不慎摔伤右髋部，查体：右下肢短缩，外旋 50°畸形，右髋肿胀不明显，但有叩痛。最可能的诊断是右侧

A. 髋关节后脱位

B. 髋关节前脱位

C. 股骨颈骨折

D. 粗隆间骨折

E. 髋周围软组织损伤

145、（A3/A4 型选择题）女性，72 岁。1 小时前不慎摔伤右髋部，查体：右下肢短缩，外旋 50°畸形，右髋肿胀不明显，但有叩痛。为证实诊断首先需要的检查是

A. 关节造影

B.X 线

C.MRI

D.核素骨扫描

E.CT

146、（A3/A4 型选择题）女性，72 岁。1 小时前不慎摔伤右髌部，查体：右下肢短缩，外旋 50°畸形，右髌肿胀不明显，但有叩痛。该患者最容易出现的并发症是

A.脂肪栓塞

B.坐骨神经损伤

C.髌关节周围创伤性骨化

D.髌内翻畸形

E.股骨头缺血性坏死

147、（A3/A4 型选择题）52 岁女性，已生育，渐进性痛经 5 年，难以忍受，经治疗症状反复，妇检：子宫后位，常大；活动欠佳，后壁峡部扪及 2~3 个痛性结节，右附件扪及 3cm×4cm 之囊性包块，不活动。该患者的诊断考虑为

A.盆腔结核

B.慢性盆腔炎

- C.卵巢恶性肿瘤
- D.盆腔炎性包块
- E.子宫内膜异位症（巧克力囊肿）

148、（A3/A4 型选择题）52 岁女性,已生育,渐进性痛经 5 年,难以忍受,经治疗症状反复,妇检:子宫后位,常大;活动欠佳,后壁峡部扪及 2~3 个痛性结节,右附件扪及 3cm×4cm 之囊性包块,不活动。该患者的治疗首选

- A.达那唑治疗
- B.雄激素治疗
- C.根治性手术
- D.保留卵巢功能手术
- E.内膜病灶切除术

149、（A3/A4 型选择题）足月自然分娩后 3 天,出现下腹痛,体温正常,恶露多,有臭味,宫底脐上一指,宫体软。首先考虑的诊断是

- A.子宫内膜炎
- B.子宫肌炎
- C.急性输卵管炎
- D.盆腔结缔组织炎

E.腹膜炎

150、（A3/A4 型选择题）足月自然分娩后 3 天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味,宫底脐上一指，宫体软。其处理措施哪项是错误的

A.支持疗法

B.取半卧位

C.宫腔分泌物培养+药敏

D.阴道冲洗

E.在药敏结果回报前应用广谱抗生素

答案

1、正确答案：C

答案解析：解析：本题考查尿道损伤的病因。会阴部骑跨伤，可引起尿道球部损伤。骨盆骨折引起膜部尿道撕裂或撕断，经尿道器械操作不当可引起球膜部交界处尿道损伤。

2、正确答案：E

答案解析：

3、正确答案：C

答案解析：

4、正确答案：B

答案解析：

5、正确答案：E

答案解析：

6、正确答案：D

答案解析：

7、正确答案：B

答案解析：

8、正确答案：D

答案解析：

9、正确答案：B

答案解析：

10、正确答案：B

答案解析：

11、 正确答案： C

答案解析：

12、 正确答案： E

答案解析：

13、 正确答案： C

答案解析：

14、 正确答案： B

答案解析：

15、 正确答案： E

答案解析：

16、 正确答案： C

答案解析：

17、 正确答案： B

答案解析：

18、 正确答案： C

答案解析：

19、正确答案：D

答案解析：

20、正确答案：C

答案解析：

21、正确答案：D

答案解析：

22、正确答案：C

答案解析：

23、正确答案：C

答案解析：

24、正确答案：D

答案解析：

25、正确答案：E

答案解析：

26、正确答案：D

答案解析：

27、正确答案：E

答案解析：

28、正确答案：E

答案解析：

29、正确答案：D

答案解析：

30、正确答案：C

答案解析：

31、正确答案：E

答案解析：

32、正确答案：E

答案解析：

33、正确答案：E

答案解析：

34、正确答案：B

答案解析：

35、正确答案：D

答案解析：

36、正确答案：D

答案解析：

37、正确答案：D

答案解析：

38、正确答案：A

答案解析：

39、正确答案：B

答案解析：

40、正确答案：C

答案解析：

41、正确答案：E

答案解析：

42、正确答案：C

答案解析：

43、正确答案：C

答案解析：

44、正确答案：C

答案解析：

45、正确答案：E

答案解析：

46、正确答案：E

答案解析：

47、正确答案：C

答案解析：

48、正确答案：C

答案解析：

49、正确答案：E

答案解析：

50、正确答案：A

答案解析：

51、正确答案：E

答案解析：

52、正确答案：C

答案解析：

53、正确答案：E

答案解析：

54、正确答案：E

答案解析：

55、正确答案：C

答案解析：

56、正确答案：D

答案解析：【解析】新生儿肠道为身长的 8 倍,婴幼儿肠道为身长的 6 倍,成人肠道为身长的 4.5 倍。

57、正确答案：B

答案解析：

58、正确答案：C

答案解析：

59、正确答案：C

答案解析：解析：生长发育遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的一般规律。

60、正确答案：C

答案解析：

61、正确答案：B

答案解析：

62、正确答案：C

答案解析：解析：我国采用的围生期定义是妊娠 28 周至出生后 7 天；新生儿期是指出生脐带结扎到满 28 天。

63、正确答案：E

答案解析：

64、正确答案：C

答案解析：【解析】：典型的 PKU 患儿在新生儿时期发育基本正常，生后 3~6 个月可出现呕吐、喂养困难、生长缓慢等症状，逐渐加重，1 岁左右症状

明显。

65、正确答案：A

答案解析：

66、正确答案：D

答案解析：

67、正确答案：C

答案解析：

68、正确答案：B

答案解析：

69、正确答案：E

答案解析：

70、正确答案：E

答案解析：解析：早产儿皮肤发亮、水肿、毳毛多，头发乱如绒线头，耳壳软、缺乏软骨、可折叠、耳舟不清楚，指甲未达指尖，乳腺无结节或结节 $\leq 4\text{mm}$，足底纹理少，男婴睾丸未降、阴囊少皱褶；女婴大阴唇不发育，不能遮盖小阴唇。所以本题选 E。

71、正确答案：C

答案解析：

72、正确答案：C

答案解析： 解析：蓝光照射是一种降低血清未结合胆红素的简单易行的方法，是目前治疗和预防新生儿高胆红素血症最常用和有效的方法。几乎对于所有的新生儿，无论其是否为成熟儿、是否存在溶血以及何种肤色等因素，光疗都能降低胆红素浓度。到目前为止，尚无光疗远期严重副作用的报道。

73、正确答案：E

答案解析： 解析：苯丙酮尿症患者最重要的治疗原则是，给患者提供适量的苯丙氨酸维持其正常成长的前提下，尽量减少食物中苯丙氨酸的摄入。就是低苯丙氨酸饮食。

74、正确答案：D

答案解析：

75、正确答案：A

答案解析：

76、正确答案：B

答案解析：

77、正确答案：C

答案解析：

78、正确答案：C

答案解析：

79、正确答案：C

答案解析：

80、正确答案：D

答案解析： 解析：念珠菌阴道炎的主要表现为外阴瘙痒，阴道附有白色膜状物，擦除后露出红肿黏膜面。

81、正确答案：C

答案解析：

82、正确答案：E

答案解析：

83、正确答案：C

答案解析：

84、正确答案：C

答案解析：

85、正确答案：D

答案解析：

86、正确答案：E

答案解析：解析：早产儿，低出生体重，双胞胎，补充 800IU，足月儿 400IU 。

87、正确答案：D

答案解析：

88、正确答案：E

答案解析：

89、正确答案：E

答案解析：

90、正确答案：A

答案解析：

91、正确答案：C

答案解析：

92、正确答案：A

答案解析：

93、正确答案：C

答案解析：

94、正确答案：D

答案解析： 解析：病情有加剧表现，首要的是明确加重原因。

95、正确答案：B

答案解析：

96、正确答案：E

答案解析：

97、正确答案：A

答案解析：

98、正确答案：E

答案解析：

99、正确答案：C

答案解析：

100、正确答案：D

答案解析：

101、正确答案：B

答案解析：

102、正确答案：D

答案解析：

103、正确答案：C

答案解析：

104、正确答案：D

答案解析：

105、正确答案：C

答案解析：

106、正确答案：A

答案解析：

107、正确答案：D

答案解析：

108、正确答案：C

答案解析：

109、正确答案：D

答案解析：

110、正确答案：B

答案解析：

111、正确答案：D

答案解析：

112、正确答案：E

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：D

答案解析：

115、正确答案：E

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：D

答案解析：

118、正确答案：B

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：D

答案解析：

121、正确答案：D

答案解析：

122、正确答案：C

答案解析：

123、正确答案：D

答案解析：

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：C

答案解析：

126、正确答案：C

答案解析：

127、正确答案：C

答案解析：

128、正确答案：D

答案解析：

129、正确答案：B

答案解析：

130、正确答案：C

答案解析：

131、正确答案：C

答案解析：

132、正确答案：C

答案解析：

133、正确答案：E

答案解析：

134、正确答案：D

答案解析：

135、正确答案：A

答案解析：

136、正确答案：D

答案解析：

137、正确答案：D

答案解析：

138、正确答案：E

答案解析：

139、正确答案：B

答案解析：

140、正确答案：A

答案解析：

141、正确答案：B

答案解析：

142、正确答案：D

答案解析：

143、正确答案：B

答案解析：

144、正确答案：C

答案解析：

145、正确答案：B

答案解析：

146、正确答案：E

答案解析：

147、正确答案：E

答案解析：

148、正确答案：C

答案解析：

149、正确答案：D

答案解析：

150、正确答案：D

答案解析：



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

