

2022年乡村全科执业助理医师 第一单元 核心押题卷

1. 下列哪项不是核心家庭的特征

- A. 家庭内部资源的可用性大
- B. 规模小
- C. 成员之间的关系较单纯
- D. 结构简单
- E. 相对容易达成一致意见

参考答案: A

参考解析: 1)核心家庭:由父母及其未婚子女组成的家庭,也包括无子女夫妇家庭和养父母及其养子女组成的家庭。2)扩展家庭:由两对或两对以上的夫妇及其未婚子女组成的家庭。是由核心家庭及夫妇单、双方的父母或亲属共同构成的。又可分为主干家庭与联合家庭。①主干家庭:由一对已婚子女及其父母、未婚子女或未婚兄弟姐妹构成的家庭;②联合家庭:又称复式家庭,由至少两对或两对以上同代夫妇及其未婚子女组成的家庭,包括父母与几对已婚子女及孙子女构成的家庭。

2. 体温逐渐升高达 39℃或以上,持续数天后逐渐下降至正常水平,数天后又逐渐上升,如此反复交替发作多次。此种热型称为

- A. 稽留热
- B. 间歇热
- C. 弛张热
- D. 回归热
- E. 波状热

参考答案: E

参考解析: 波状热:体温逐渐升高达 39℃或以上,持续数天后逐渐下降至正常水平,数天后又逐渐上升,如此反复交替发作多次。常见于布鲁菌病。

3. 皮疹急性期,有糜烂渗出,不能使用哪种剂型的外用药

- A. 油剂
- B. 粉剂
- C. 洗剂
- D. 溶液
- E. 软膏

参考答案: E

参考解析: 急性期渗出多,选用溶液湿敷,湿敷期间可用油剂保护皮疹;仅有红斑、丘疹,无糜烂渗出,选用粉剂、洗剂;急性期忌用软膏或有刺激性药物。

4. 下列哪项描述符合重度耳聋的标准

- A. 听一般谈话有困难
- B. 要大声说话才能听清
- C. 需在耳旁大声说话才能听到
- D. 耳旁大声说话都听不清
- E. 听低声谈话有困难

参考答案: C

参考解析: 重度耳聋,需在耳旁大声说话才能听到,语频听阈在 71~90dB。

5. 下面关于腹痛的描述错误的是

- A. 突发、剧烈上腹刀割样痛多为消化性溃疡穿孔所致
- B. 阵发性绞痛可见于胆石病或泌尿系结石

- C. 阵发性剑突下钻顶样痛是胆道虫症的典型表现
- D. 中上腹持续痛应考虑急性胃炎、急性胰腺炎
- E. 持续性全腹痛伴腹肌紧张提示阑尾炎

参考答案：E

参考解析：持续性全腹痛伴腹肌紧张提示急性弥漫性腹膜炎，转移性右下腹痛为急性阑尾炎的典型症状。

6. 下列哪种疾病不属于急性上呼吸道感染引起的并发症

- A. 手足口病
- B. 急性肾炎
- C. 中耳炎
- D. 颈淋巴结炎
- E. 肺炎

参考答案：A

参考解析：急性上呼吸道感染的并发症在婴幼儿多见。上呼吸道感染可波及邻近器官，或向下蔓延；可引起中耳炎、鼻窦炎、咽后壁脓肿、颈淋巴结炎、喉炎、气管炎、支气管肺炎等。年长儿若患链球菌性上感可引起急性肾炎、风湿热等。手足口病多以肠道病毒感染为主。

7. 急性气管-支气管炎的病因有以下哪些

- A. 感染因素
- B. 理化因素
- C. 过敏反应
- D. 生物因素
- E. 以上全是

参考答案：E

参考解析：A、B、C、D都是可以引起急性支气管炎。

8. 高血压伴有低血钾应首先考虑

- A. 主动脉缩窄
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 继发于慢性肾炎的高血压
- E. 肾动脉狭窄

参考答案：B

参考解析：原发性醛固酮增多症是由于肾上腺皮质病变致醛固酮分泌增多，肾素-血管紧张素活性受抑。临床表现为高血压、低血钾、碱血症、碱性尿为特征的一组继发性高血压。对同时有高血压、低血钾患者应疑为原发性醛固酮增多症。如有高血压、低血钾、高尿钾、碱血症、碱性尿、醛固酮分泌增高和血浆肾素、血管紧张素活性受抑，则可确诊。

9. 急性心肌梗死早期最重要的治疗措施是

- A. 抗心绞痛
- B. 消除心律失常
- C. 补充血量
- D. 心肌再灌注
- E. 增加心肌营养

参考答案：D

参考解析：对于急性心肌梗死，治疗原则是尽快恢复心肌的血液灌注以挽救濒死的心肌，防止梗死扩大或缩小心肌缺血范围，保护和维持心脏功能，及时处理严重心律失常、泵衰竭和

各种并发症，防止猝死，使患者不但能渡过急性期，且康复后还能保持尽可能多的有功能的心肌。

10. 下列哪项不属于 GERD 患者的抗反流防御机制异常

- A. 夜间胃酸分泌过多
- B. 食管下括约肌压力降低
- C. 异常的食管下括约肌一过性松弛
- D. 胃排空异常
- E. 食管酸廓清能力下降

参考答案：A

参考解析：胃食管反流病是由多种因素造成的消化道动力障碍性疾病，存在抗反流防御机制减弱和反流物攻击并损伤食管黏膜的两方面问题。其中抗反流防御机制包括抗反流屏障、食管对反流物的清除能力和食管黏膜抵抗反流物损伤作用的能力。

11. 下列因素可能诱发急性胃黏膜病变和呕血，但除外

- A. 颅脑手术
- B. 严重外伤
- C. 剧烈呕吐
- D. 大面积烧伤
- E. 非甾体类药物

参考答案：C

参考解析：大面积烧伤、颅脑手术、脑血管疾病和严重外伤会导致急性胃黏膜病变，属于急性应激引起的胃黏膜病变。剧烈呕吐常导致贲门黏膜撕裂，出现呕血。

12. 易发生幽门梗阻的溃疡是

- A. 胃窦溃疡
- B. 幽门管溃疡
- C. 胃角溃疡
- D. 球后溃疡
- E. 胃多发溃疡

参考答案：B

参考解析：幽门管溃疡易诱发梗阻、出血和穿孔，缺乏典型的溃疡症状。

13. 肾盂肾炎最常见的感染途径是

- A. 上行感染
- B. 血行感染
- C. 淋巴道感染
- D. 外伤直接感染
- E. 肾周围器官感染蔓延

参考答案：A

参考解析：肾盂肾炎时病原菌多由尿道进入膀胱，上行感染经输尿管达肾，也可经血行感染播散到肾。

14. 肾结石健康指导包括下列哪项

- A. 多饮水
- B. 嘱患者做跳绳
- C. 调节饮食
- D. 经常饮用中药金钱草冲泡的水
- E. 以上均是

参考答案：E

参考解析：①多喝水，靠尿液的冲刷作用有利排石。②经常饮用中药金钱草冲泡的水(代茶饮)。③嘱患者做跳绳、跑步、上下楼梯等运动，靠重力作用有利排石。④肾绞痛发作时患者往往辗转不安，疼痛难忍，精神极度紧张。如确诊为肾绞痛，经检查结石直径小于0.6cm，可参照上述治疗肾绞痛方法进行处理。同时讲清只有在排石时，结石刺激输尿管才会引起绞痛，从排石角度看是好事，消除患者思想顾虑。⑤调节饮食。

15. 对异位妊娠患者，下列哪一项检查最有助于诊断

- A. 腹部触诊有明显的肌紧张
- B. 附件区可触及有触痛的包块
- C. 尿HCG阳性，后穹窿穿刺抽出不凝血
- D. 末梢血白细胞升高
- E. 血红蛋白降低

参考答案：C

参考解析：尿HCG阳性，后穹窿穿刺抽出不凝血有助于诊断异位妊娠。

16. 前列腺增生症最早出现的症状往往是

- A. 尿频
- B. 排尿困难
- C. 血尿
- D. 尿痛
- E. 尿急

参考答案：A

参考解析：前列腺增生症最常见的早期症状是尿频。夜间尤甚。系增生的前列腺充血刺激引起。随着病情发展，出现前列腺增生最重要的症状排尿困难，典型表现有尿迟、断续、尿流细无力，射程短，排尿时间延长，终末滴沥，尿不尽感等，残余尿过多逐渐发生尿潴留及充盈性尿失禁，合并感染或结石时可发生尿频、尿急、尿痛和血尿。

17. 原发性痛经和继发性痛经的主要鉴别点是

- A. 发病时间
- B. 月经是否规律
- C. 初潮年龄
- D. 有无盆腔器质性疾病
- E. 是否需要使用镇痛药

参考答案：D

参考解析：痛经的概念是指经前后或月经期出现下腹疼痛、坠胀，伴腰酸或其他不适，程度较重以致影响生活和工作质量者。痛经分为原发性和继发性两类，前者是指生殖器官无器质性病变所致的痛经，后者系指由于盆腔器质性疾病如子宫内膜异位症、盆腔炎或宫颈狭窄等所引起的痛经(D对)，故本题选D。

18. 灰黄色或黄白色泡沫状稀薄白带常见于

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 滴虫阴道炎
- C. 细菌性阴道病
- D. 阴道腺病
- E. 慢性宫颈炎

参考答案：B

参考解析：滴虫阴道炎典型临床表现是阴道分泌物增多及外阴瘙痒。分泌物典型特点为稀薄

脓性、泡沫状、有臭味。若合并其他感染，则呈脓性、黄绿色；若合并尿道感染，可有尿频、尿痛、尿急甚至血尿。妇科检查见阴道黏膜充血，严重者常有散在出血点，后穹隆白带增多，呈灰黄色泡沫状稀薄液体或黄绿色脓性分泌物，严重者白带中混有血丝。典型病例容易诊断，阴道分泌物悬滴法检查找到滴虫即可确诊。

19. 过敏性紫癜与特发性血小板减少性紫癜鉴别的关键点是

- A. 发病年龄与性别不同
- B. 紫癜的部位、性质与特点不同
- C. 并发症不同
- D. 出、凝血的功能状态不同
- E. 血小板计数结果不同

参考答案：E

参考解析：特发性血小板减少性紫癜血小板计数明显减少，而过敏性紫癜血小板计数正常。

20. 下列关于甲状腺功能亢进症的诊断错误的是

- A. 高代谢症状和体征
- B. 甲状腺肿，伴或不伴血管杂音
- C. 血清总甲状腺素和血清游离甲状腺素增高，TSH降低
- D. T3型甲亢仅血清总三碘甲状腺原氨酸增高
- E. 胫前粘液性水肿

参考答案：E

参考解析：胫前粘液性水肿是 Graves 病的诊断标准之一。A、B、C、D 选项均是甲亢的诊断标准。

21. 甲状腺功能减退粘液性水肿说法正确的是

- A. 粘液水肿性昏迷需立即抢救治疗
- B. 粘液水肿不能用药物治疗
- C. 粘液水肿性昏迷需先查明病因
- D. 粘液性水肿患者抗休克治疗是防止昏迷的关键
- E. 粘液性水肿不严重

参考答案：A

参考解析：粘液水肿性昏迷需立即抢救治疗，甲减粘液性水肿患者坚持甲状腺替代治疗是防止并发昏迷的关键。

22. 2 型糖尿病的基础治疗措施是

- A. 饮食治疗
- B. 胰岛素治疗
- C. 双胍类降糖药
- D. 磺脲类降糖药
- E. 噻唑烷二酮类降糖药

参考答案：A

参考解析：糖尿病治疗需控制饮食，减轻和避免肥胖，适当的体力活动，合理应用口服降血糖药及胰岛素。所有糖尿病患者，无论采用降血糖药与否，均须控制饮食，此系基础治疗之一。

23. 下列哪一项不属于高脂血症

- A. 胆固醇增高
- B. 甘油三酯增高
- C. 高密度脂蛋白降低

D. 低密度脂蛋白增高

E. 高密度脂蛋白增高

参考答案: E

参考解析: 本题考点: 高脂血症的分类, 高脂血症分为高胆固醇血症、高甘油三酯血症、低高密度胆固醇血症和高低密度胆固醇血症以及混合型高脂血症。

24. 精神分裂症的情感障碍主要表现为

A. 情绪低落

B. 情绪不稳

C. 情绪高涨

D. 情感不协调

E. 欣快感

参考答案: D

参考解析: 精神分裂症的情感障碍主要表现为情感不协调。

25. 短暂性脑缺血发作的临床表现

A. 血压突然升高, 短暂意识不清, 抽搐

B. 眩晕、呕吐、耳鸣持续一至数日

C. 发作性神经系统功能障碍, 24 小时内完全恢复

D. 昏迷、清醒、再昏迷

E. 一侧轻偏瘫, 历时数日渐恢复

参考答案: C

参考解析: 短暂性脑缺血发作是指颈动脉或椎~基底动脉系统一过性供血不足, 导致供血区的局灶性神经功能障碍, 出现相应的症状和体征。其特点是突然发作, 历时短暂, 症状持续不超过 24 小时, 症状完全消失, 一般不遗留神经功能缺损, 不会有意识不清或昏迷。

26. 维生素 D 缺乏病可靠的早期诊断指标是

A. 血钙降低

B. 血磷降低

C. 血镁降低

D. 血 $1, 25\sim(\text{OH})_2\text{D}_3$ 降低

E. 血碱性磷酸酶增高

参考答案: D

参考解析: 血清 $25(\text{OH})\text{D}_3$ (正常值 $10\sim 60\ \mu\text{g/L}$) 和 $1, 25\sim(\text{OH})_2\text{D}_3$ (正常值 $0.03\sim 0.06\ \mu\text{g/L}$) 水平在佝偻病初期就已明显降低, 为可靠的早期诊断指标。

27. 表示近期活动性肝炎的是

A. HBsAg

B. 抗-HBs

C. HBeAg

D. 抗-HBc-IgM

E. 抗-HBc-IgG

参考答案: D

参考解析: 抗 Hbc-IgM 是 HBV 近期急性感染或慢性感染者病毒近期活动的标志。

28. 足月儿生后 2 天出现黄疸, 母亲血型为 B 型, 胎儿 O 型, 3 天血清胆红素 $188.1\ \mu\text{mol/L}$ (11mg/dl)。本例诊断最大可能是

A. ABO 溶血病

B. Rh 溶血病

- C. 生理性黄疸
- D. 败血症
- E. 胆道闭锁

参考答案：C

参考解析：此题中患儿出现了黄疸，血清胆红素 $188.1 \mu\text{mol/L}$ (11mg/dl)。母亲血型为 B 型，新生儿溶血病以 ABO 溶血多见，主要发生在母亲 O 型，胎儿 A、B 型。母亲 B 型、胎儿 O 型则不容易发生溶血。所以此题中患儿考虑最大可能为生理性黄疸。

29. 艾滋病病毒主要侵害人体细胞中的

- A. T 淋巴细胞
- B. 淋巴细胞
- C. 抑制性 T 细胞
- D. 辅助性 T 细胞
- E. 巨噬细胞

参考答案：D

参考解析：研究表明，艾滋病病毒对 TH 淋巴细胞(辅助性 T 细胞)有特别的亲和力，或者说，TH 淋巴细胞就是艾滋病病毒的靶细胞。当艾滋病病毒附着在 TH 淋巴细胞上面后，便把内含物注入淋巴细胞中进行繁殖，借助逆转录酶的作用，将病毒的 RNA 转化入 DNA 中，使该细胞成为带有病毒遗传信息的感染细胞。

30. 目前世界上发病率最高的性传播疾病是

- A. 淋病
- B. 生殖器疱疹
- C. 梅毒
- D. 尖锐湿疣
- E. 获得性免疫缺陷综合征

参考答案：A

参考解析：淋病是目前世界上发病率最高的性传播疾病，近年来我国性传播疾病中也以淋病最多。

31. 蛔虫感染引起胆道蛔虫病主要是由于

- A. 寄生于小肠
- B. 钻孔习性
- C. 以半消化物为食
- D. 幼虫在肺部发育
- E. 幼虫在人体内移行

参考答案：B

参考解析：胆道蛔虫病是蛔虫病的常见并发症，是由于蛔虫有钻孔习惯，当虫体完全钻入胆道后，疼痛反而减轻。

32. 急性卡他性结膜炎常见的致病菌不包括

- A. 肺炎球菌
- B. Koch-Weeks 杆菌
- C. 流感嗜血杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 变形杆菌

参考答案：E

参考解析：常见致病菌为 Koch-Weeks 杆菌、肺炎双球菌、葡萄球菌、淋球菌和流感嗜血杆

菌。

33. 下列中耳炎耳镜检查会出现“灯塔征”的体征是

- A. 分泌性中耳炎
- B. 急性化脓性中耳炎
- C. 慢性化脓性中耳炎
- D. 中耳胆脂瘤
- E. 特殊类型中耳炎

参考答案：B

参考解析：急性化脓性中耳炎早期骨膜出血，鼓膜穿孔后“灯塔征”血常规：白细胞升高。

34. 荨麻疹的病因与下列选项有关，除了哪项

- A. 食物
- B. 药物
- C. 感染
- D. 动植物因素
- E. 遗传

参考答案：E

参考解析：荨麻疹是一种血管皮肤反应，典型表现为短暂的发痒的水疱暴发，水疱为边界清晰、中心苍白、光滑、轻度高出皮面的红斑，形状及大小表现多样。急性荨麻疹发展迅速，通常有明确的原因，例如对某种药物、食物、蚊虫叮咬、吸尘器或接触性过敏原的高敏反应、情感压力或环境因素，与遗传无必然联系。

35. 哪个不是牙周炎的四大症状

- A. 牙周袋形成
- B. 牙龈炎症
- C. 牙槽骨吸收
- D. 牙移位
- E. 牙齿松动

参考答案：D

参考解析：牙移位是牙周炎晚期的并发症。

36. 早期中心型肺癌的常见症状是

- A. 咳嗽、血痰
- B. 胸闷、呼吸困难
- C. 高热、胸痛
- D. 声嘶
- E. 上肢及颜面部肿胀

参考答案：A

参考解析：①早期肺癌特别是周围型肺癌往往没有任何症状，大部分在胸部X线检查时发现；②癌肿在较大的支气管内生长后，常出现刺激性咳嗽，极易误认为伤风感冒；③另一个常见症状是血痰，通常为痰中带血点、血丝或断续地少量咯血，大量咯血很少见，由于肿瘤阻塞较大支气管可出现胸闷、气促、发热、胸痛等症状。故本题选A。

37. 怀疑胃癌者的首选诊断方法是

- A. X线钡餐
- B. 胃镜检查
- C. B超
- D. CT

E. 核磁共振

参考答案：B

参考解析：胃镜下便于活体组织病理学检查，能明确胃癌的诊断。

38. 诊断乳癌可靠的特殊检查是

A. 放射性核素检查

B. 钼靶照相

C. 红外线扫描

D. 乳腺超声

E. 细针穿刺

参考答案：E

参考解析：乳癌的诊断需要组织病理学依据。

39. 病人胸部 X 线片示左 5、6 肋骨骨折，经吸氧，呼吸困难反而加重、发绀、血压 80/60mmHg，气管向右侧移位，叩诊鼓音，伤侧呼吸音消失。处理原则首选是

A. 胸腔穿刺排气减压

B. 输血、补液

C. 送手术室闭式引流

D. 胶布固定

E. 肋骨内固定

参考答案：A

参考解析：该病例诊断考虑：左侧气胸(张力性气胸)。需排气减压，以使肺复张。所以选 A。

40. 关于硝普钠治疗高血压急症描述错误的是

A. 连续使用不宜超过 3 天

B. 常用剂量 $3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$

C. 最大剂量不超过 $10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$

D. 不良反应为心动过速、恶性、呕吐、肌颤

E. 以上均不正确

参考答案：E

参考解析：高血压急症控制血压首选使用静脉降压药物。硝普钠初始剂量 $0.25 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ，常用剂量 $3 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ ，极量 $10 \mu\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{min})$ 。需避光使用，药物滴注超过 6 小时应该重新配制液体；连续使用不宜超过 3 天；不良反应为心动过速、恶性、呕吐、肌颤。

41. 针对腹部损伤现场急救错误的是

A. 及时开放静脉输液通道

B. 及时使用镇痛药物缓解疼痛

C. 所有诊断和怀疑腹部损伤的病人，初期一律禁饮食

D. 对于腹壁破裂导致腹腔内脏器脱出者，不能现场将脱出内脏放回腹腔

E. 严密观察，监测病情，给予相应对症处理

参考答案：B

参考解析：在诊断未完全明确、治疗方案未确定之前，不宜使用镇痛药，以免掩盖病情进展。

42. 老年患者外伤后致桡骨下端 (Colles) 骨折，骨折对位对线良好，并有嵌插。该患者应选择哪项治疗

A. 牵引治疗

B. 对症治疗

C. 手术治疗

D. 消肿治疗

E. 夹板固定或石膏固定

参考答案：E

参考解析：Colles 骨折的治疗原则是手法复位外固定为主，部分需要手术治疗。此题中并没有给出关节面不平衡的描述，所以考虑应为夹板固定或石膏固定治疗。

43. 一氧化碳中毒最具特征的表现是

A. 头痛、头晕

B. 四肢乏力

C. 口唇黏膜呈樱桃红色

D. 恶心呕吐

E. 意识障碍

参考答案：C

参考解析：一氧化碳中毒时，CO 与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白(CO₂Hb)，使皮肤、黏膜呈樱桃红色，为一氧化碳中毒最具特征性的表现。因此选 C。

44. 下列哪一项不是镇静催眠药物

A. 安定

B. 眠尔通

C. 阿托品

D. 苯妥英钠

E. 水合氯醛

参考答案：C

参考解析：阿托品属于抗胆碱类药物，不属于镇静催眠类药物。

45. 发生高空坠落后，不应立即进行的处理是

A. 检查伤者身上是否有硬物

B. 检查呼吸、心跳是否停止

C. 检查是否意识丧失

D. 检查是否有出血

E. 检查是否有四肢及脊柱骨折

参考答案：A

参考解析：发生高空坠落后，首先要立即快速检查伤情，是否有头部损伤意识丧失，是否有呼吸、心跳停止，是否有四肢骨折、脊柱骨折及出血等等。然后本着先救命后救伤的原则，根据具体伤情给予相应的现场急救。

46. 流行病学的主要研究目的是

A. 从基因群体水平认识疾病

B. 揭示现象、找出原因、提供措施、评价效果

C. 防治疾病、促进健康

D. 揭示人群中疾病或健康状况的分布现象

E. 研究疾病的流行规律

参考答案：C

参考解析：流行病学的主要研究目的是防治疾病、促进健康。故本题选 C。

47. 针对产后饮食起居指导，下列说法错误的是

A. 产后宜易消化富营养的饮食

B. 可进食辛辣或肥甘厚味

C. 适当饮用补血、祛瘀、下乳的药膳

D. 多吃流质食物

E. 勿滥用补品

参考答案：B

参考解析：产后饮食起居指导：产后宜易消化、富营养的饮食，适当饮用补血、祛瘀、下乳的药膳；多吃流质食物，促进乳汁分泌。产妇忌食刺激性食物，忌辛辣或肥甘厚味，免伤脾胃；勿滥用补品。

48. 下列各项，不属于中医预防与养生保健服务基本原则的是

- A. 定期体检，见微知著
- B. 冬病夏治，夏病冬治
- C. 重视先兆，截断扭转
- D. 安其未病，防其所传
- E. 三因制宜，各司法度

参考答案：B

参考解析：中医预防与养生保健服务基本原则：天人相应，顺应自然；形神合一，形神共养；动静互涵，协调平衡；重视先兆，防微杜渐。

49. 按各类死因构成比的大小排列位次的指标是

- A. 婴儿死亡率
- B. 5岁以下儿童死亡率
- C. 死因别死亡率
- D. 死因构成百分比
- E. 死因顺位

参考答案：E

参考解析：死因顺位是将各类死因构成比的大小按由高到低排列的位次。故本题选E。

50. 在制定艾滋病的健康促进规划时，需要符合的原则是

- A. 目标原则、前瞻性原则、独立性原则、立体性原则、实事求是原则、参与性原则
- B. 目标原则、前瞻性原则、整体性原则、弹性原则、实事求是原则、参与性原则
- C. 责任原则、前瞻性原则、整体性原则、弹性原则、实事求是原则、强制性原则
- D. 目标原则、预测性原则、独立性原则、立体性原则、实事求是原则、监督性原则
- E. 目标原则、前瞻性原则、独立性原则、立体性原则、保密性原则、强制性原则

参考答案：B

参考解析：健康教育计划的原则包括：①目标原则；②前瞻性原则整体性原则；④弹性原则；⑤实事求是原则；⑥参与性原则。故本题选B。

51. 乡镇卫生院和村卫生室宣传栏的面积不少于

- A. 2.0m^2
- B. 2.1m^2
- C. 2.2m^2
- D. 1.1m^2
- E. 1.2m^2

参考答案：A

参考解析：镇卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2个，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1个，每个宣传栏的面积不少于 2m^2 。

52. 某乡中心小学一年级发生9例急性流行性腮腺炎，针对传染源采取的最有效控制措施是

- A. 全校进行清洁和消毒
- B. 流行性腮腺炎病例隔离治疗
- C. 对密切接触者进行健康教育

- D. 对一年级的学生进行医学观察
- E. 指导学生做好个人防护和个人卫生

参考答案：B

参考解析：对病人、病原携带者，予以隔离治疗，是最有效控制措施。故选 B。

53. 县疾病预防控制中心欲对某乡镇卫生院相关医务人员开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导。关于对儿童预防接种的管理。下列说法错误的是

- A. 国家对儿童实行预防接种证制度。在儿童出生后 1 个月内，其监护人应当到儿童居住地承担预防接种工作的接种单位为其办理预防接种证
- B. 接种单位对儿童实施接种时，应当查验预防接种证，并作好记录
- C. 儿童离开原居住地期间，由现居住地承担预防接种工作的接种单位负责对其实施接种
- D. 预防接种证的格式由县级以上人民政府卫生主管部门制定
- E. 儿童入托、入学时，托幼机构、学校应当查验预防接种证，发现未依照国家免疫规划受种的儿童，应当向所在地的县级疾病预防控制中心或者儿童居住地承担预防接种工作的接种单位报告，并配合疾病预防控制中心或者接种单位督促其监护人在儿童入托、入学后及时到接种单位补种

参考答案：D

参考解析：预防接种证的格式由省、自治区、直辖市人民政府卫生主管部门制定。

54. 婴儿期指的是

- A. 从出生到 1 周岁之前
- B. 从出生后 28 天到满 1 周岁之前
- C. 从出生 1 个月到 1 周岁之前
- D. 从 1 周岁到 2 周岁之前
- E. 从 1 周岁到 3 周岁之前

参考答案：A

参考解析：婴儿期：自出生至 1 岁的时期。婴儿期是生长发育极其旺盛的阶段，对营养的需求量相对较高，并因其生长发育的特殊性，食物的添加具有一定的要求和规律。

55. 缺铁性贫血治疗最重要的是

- A. 补充铁剂
- B. 病因治疗
- C. 脾切除
- D. 少量输血
- E. 肌内注射维生素 B12

参考答案：B

参考解析：病因治疗：分析可能的病因，采取相应的干预措施。

56. 第一次产后访视的时间应为

- A. 产后 3~7 天
- B. 产后 7~10 天
- C. 产后 10~14 天
- D. 出院后 3~7 天
- E. 出院后 7~10 天

参考答案：A

参考解析：乡镇卫生院(村卫生室)在得到分娩医院转来产妇分娩的信息后，应于 3~7 天内到产妇家中进行第一次产后访视。故本题选 A。

57. 围生期在我国是指

- A. 从胚胎形成至产后 1 周
- B. 从妊娠满 20 周至产后 4 周
- C. 从妊娠满 24 周至产后 2 周
- D. 从妊娠满 28 周至产后 1 周
- E. 从妊娠满 32 周至产后 2 周

参考答案：D

参考解析：围生期是指产前、产时和产后的一段时期，即妊娠满 28 周（胎儿体重>1000g 或身长>35cm）至产后 1 周。故本题选 D。

58. 关于 2 型糖尿病的健康体检错误的是

- A. 对确诊的患者每年组织或协助组织 1 次较全面的健康体检
- B. 体检可与随访结合
- C. 体检包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、腹部等常规体格检查
- D. 对口腔、视力、听力和运动功能进行初步判断
- E. 不需要参照《城乡居民健康档案管理服务规范》

参考答案：C

参考解析：2 型糖尿病的健康体检，对确诊的患者每年组织或协助组织 1 次较全面的健康体检。体检可与随访结合。体检包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围、皮肤、浅表淋巴结、心脏、腹部等常规体格检查。对口腔、视力、听力和运动功能进行初步判断。需要参照《城乡居民健康档案管理服务规范》。

59. 老年人心理特征表现为性格外向，易急躁。其体质是

- A. 血瘀质
- B. 气郁质
- C. 阳虚质
- D. 阴虚质
- E. 痰湿质

参考答案：D

参考解析：老年人阴虚质心理特征：性格外向，易急躁。

60. 猝然昏倒，半身不遂，口眼歪斜，此属

- A. 中风
- B. 厥证
- C. 中暑
- D. 痫证
- E. 瘫痪

参考答案：A

参考解析：中风发病特点具有突然昏仆、不省人事、半身不遂、偏身麻木、口眼歪斜、言语蹇涩等特定的临床表现。轻证仅见眩晕、偏身麻木、口眼歪斜、半身不遂等；多急性起病，好发于 40 岁以上；发病之前多有头晕、头痛、肢体一侧麻木等先兆症状，常有眩晕、头痛、心悸等病史，病发多有情志失调、饮食不当或劳累等诱因。

61. 患者，男，63 岁，吸烟 40 年。反复咳嗽、咳白色泡沫痰 20 余年，气促 10 年，近 2 天因受凉后出现发热伴咳黄脓痰，气喘不能平卧。查体：双肺语颤减弱，可闻及散在干、湿性啰音，心浊音界缩小，心率 110/分。该患者最可能的诊断是

- A. 慢性支气管炎急性发作
- B. 支气管哮喘

- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺癌

参考答案：A

参考解析：根据患者慢性咳嗽、咳痰连续两年以上，并除外其他慢性气道疾病，可诊断该患者有慢性支气管炎。慢性支气管炎缓慢起病，病程长，反复急性发作而病情加重。主要临床表现是咳嗽、咳痰、或伴有喘息，一般咳白色黏液和浆液泡沫痰，急性发作伴有细菌感染时可咳黄色脓性痰，且咳嗽加重，痰量增加。故患者诊断为慢性支气管炎急性发作。

62. 患者，男，19岁。喘息、呼吸困难发作5小时，询问病人得知以前曾多次发作。查体：气促、发绀，双肺满布哮鸣音，心率130次/分，律齐，无杂音。院外用氨茶碱、特布他林治疗无效。除吸氧外，对该病人应首先给予下列哪种治疗

- A. 给予抗生素
- B. 5%碳酸氢钠静滴
- C. 二丙酸倍氯松雾化吸入
- D. 琥珀酸氢化可的松静脉滴入
- E. 给予沙丁胺醇雾化吸入

参考答案：D

参考解析：从患者症状及查体可知患者是重度哮喘发作，已应用 β_2 受体激动剂和氨茶碱治疗无效，治疗应尽早应用糖皮质激素静滴。

63. 4个月女孩，咳嗽、喘憋4天。查体：体温 37°C ，呼吸70次/分，有明显的鼻扇及三凹征，口唇周围发绀，两肺布满喘鸣音，底部有少许细湿啰音，胸部X线可见肺纹理增强，小片阴影及肺气肿。本病例诊断最大的可能是

- A. 金葡菌肺炎
- B. 革兰阴性杆菌肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 腺病毒肺炎
- E. 呼吸道合胞病毒肺炎

参考答案：E

参考解析：呼吸道合胞病毒肺炎多见于婴幼儿，其中半数以上为1岁以内婴儿，中、重症有较明显的呼吸困难、喘憋、口唇青紫、鼻扇及三凹征，少数重症病例也可并发心力衰竭。胸部听诊多有细小或粗、中啰音，叩诊一般无浊音，少数有过清音。

64. 患者，女，19岁，打工妹。干咳3个月伴不规则发热，体温波动在 $37.8\sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ，无咯血及关节、肌肉痛，先后多次静脉注射“头孢霉素”仍未见效，现停经50天。查体：消瘦，双颈部可触及成串小淋巴结，活动，无压痛，右上肺可闻及少量湿啰音。胸片示：右上肺大片密度不均阴影，有小空洞形成。该患者最可能的诊断是

- A. 细菌性肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 过敏性肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 肺脓肿

参考答案：D

参考解析：青年女性，慢性起病，干咳伴不规则发热，闭经。查体：右上肺可闻及少量湿啰音。影像学检查可见伴小空洞形成的右上肺大片密度不均阴影。符合干酪性肺炎的表现及影像学特点。

65. 患者，男，70岁。高血压病30年，夜间阵发性呼吸困难10年，间断双下肢水肿、少尿5年。近1个月上述症状加重，伴厌食和腹胀。查体：BP180/100mmHg，端坐位，心界向两侧扩大。心率110次/分，心律绝对不齐。双下肺可闻及中小水泡音。肝肋下4cm，质软，有压痛，移动性浊音阳性。肝颈静脉回流征阳性。双下肢有可凹性水肿。该患者最恰当的心功能评价为

- A. 全心衰竭
- B. 右心衰竭，失代偿
- C. 心功能Ⅱ级（NYHA 分级）
- D. 心功能Ⅲ级（NYHA 分级）
- E. 心功能Ⅳ级（NYHA 分级）

参考答案：E

参考解析：美国纽约心脏病学会（NYHA）分级是按诱发心力衰竭症状的活动程度将心功能的受损状况分为四级。Ⅰ级：患者患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。Ⅱ级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。Ⅲ级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起上述症状。Ⅳ级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。根据题述，患者在休息状态下出现心衰症状，考虑为NYHA 分级心功能Ⅳ级。

66. 患者，男，35岁。健康查体时ECG发现偶发房性期前收缩。既往体健。查体：心界不大，心率80次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最佳的处理方法是

- A. 静脉注射利多卡因
- B. 口服慢心律
- C. 口服普罗帕酮
- D. 寻找病因，定期随诊
- E. 口服胺碘酮

参考答案：D

参考解析：对于偶发的房早可以暂不用药，寻找原因，定期随诊即可。

67. 男，35岁，今晨起床时晕厥1次，意识很快恢复，无抽搐、大小便失禁。1周前发现血压增高，当时血压150/90mmHg，坚持每日口服厄贝沙坦150mg、氨氯地平5mg及氢氯噻嗪12.5mg治疗。该患者出现上述症状最可能的原因是

- A. 良性阵发性位置性眩晕
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 血管迷走性晕厥
- D. 体位性低血压
- E. 梅尼埃病

参考答案：D

参考解析：体位性低血压表现为在体位骤变（主要由卧位或蹲位突然站起）时发生晕厥。故选D。

68. 患者，女，48岁。间发心前区闷痛1个月，常夜间发作。发作时心电图Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段上抬考虑为冠心病心绞痛，缓解期治疗最好选用哪种药物

- A. 长效硝酸甘油
- B. 心得安
- C. 潘生丁
- D. 消心痛

E. 地尔硫草

参考答案: E

参考解析: 发作时心电图 II、III、aVF 导联 ST 段上抬, 这是心绞痛中的一个特殊类型, 变异型心绞痛, 缓解期治疗首选钙离子拮抗剂。

69. 男性, 40 岁。胸痛、反酸、胃灼热、嗝气 2 个月, 胃镜检查食管黏膜未见明显异常。最有助于明确诊断的检查是

- A. 上消化道气钡双重造影
- B. ¹³C 尿素呼气试验
- C. 24h 胃食管 pH 监测
- D. 腹部 B 超
- E. 24h 心电监测

参考答案: C

参考解析: 24h 胃食管 PH 监测已广泛应用于临床并成为诊断胃食管反流性疾病的“金标准”。pH 监测可用来评价症状与 (酸) 反流的相关性, 其对于内镜检查无食管炎, 但有典型胃食管反流症状者及可疑症状是否系反流引起及抗反流疗效差时尤其有价值(C 对), 故本题选 C。

70. 男, 65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查提示: 胃体黏膜变薄, 血管透见, 皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是

- A. 维生素 B4
- B. 维生素 C
- C. 维生素 B12
- D. 维生素 B2
- E. 维生素 D

参考答案: C

参考解析: 慢性胃炎起病较隐伏, 症状较轻或无明显症状。可表现为上腹疼痛或不适、烧灼感, 也可有上腹胀满、早饱、嗝气、恶心和食欲减退等消化不良症状。组织病理学改变: 腺体破坏, 腺体数量减少, 黏膜变薄, 波及胃窦、胃体的多灶性萎缩发展为胃癌的风险性增加。血常规、血清壁细胞抗体、内因子抗体及维生素 B12 水平测定: 有助于诊断慢性自身免疫性胃炎。

71. 患者, 男, 42 岁。因十二指肠溃疡穿孔 8 小时急诊行胃大部切除术, 术后 6 天出现体温升高, 呈弛张热, 已持续 3 天, 伴有下腹坠痛、里急后重, 排黏液样稀便。最可能的诊断是

- A. 肠间隙脓肿
- B. 膈下脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 急性肠炎
- E. 肛周脓肿

参考答案: C

参考解析: 胃大部切除术后, 体温高, 出现典型的直肠和膀胱刺激症状, 诊为盆腔脓肿。

72. 肝硬化患者, 腹胀, 肝胆脾超声显示肝硬化、腹水、腹腔游离液体深度 5.1cm。下列有关肝硬化患者腹水形成的原因, 不正确的是

- A. 血浆胶体渗透压下降
- B. 门静脉压力增加
- C. 淋巴回流受阻
- D. 醛固酮减少
- E. 有效循环血量减少

参考答案：D

参考解析：腹水形成的原因有：门静脉压力增加，血浆胶体渗透压下降，有效循环血量不足，心房钠利尿肽不足，抗利尿激素分泌增加，淋巴回流受阻，继发性醛固酮增多。

73. 患者，男，63岁。右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐1小时，既往胆结石病史3年。查体：体温37℃，右上腹存在轻度压痛，无腹肌紧张，Murphy征阴性，为确诊进一步检查应首选

- A. ERCP
- B. 经皮肝穿刺胆管造影（PTC）
- C. 白细胞计数和分类
- D. 腹部X线平片
- E. B超和腹部CT

参考答案：E

参考解析：CT由于不受十二指肠气体干扰，CT对胆总管下段病变的显示优于B超。对胆道系统及肝胰等脏器占位性病变可作出较准确诊断。B超诊断胆囊结石的准确率可达95%以上，但对肝外胆管结石的诊断率只有60%~80%。其主要原因是胃肠道气体对胆总管下段的干扰所致。诊断肝内胆管结石的准确率为60%以上，但需与肝内钙化灶相鉴别。

74. 年轻男性，于饮酒后突然腹痛、腹胀、恶心呕吐，查体：急性病容，腹平坦，上腹部轻度肌紧张及反跳痛，为明确诊断首选的检查是

- A. 超声
- B. 胃镜
- C. 血、尿淀粉酶测定
- D. 血糖测定
- E. 血钙测定

参考答案：C

参考解析：根据饮酒诱因及腹痛、腹胀、恶心呕吐症状，应高度怀疑急性胰腺炎，故需测定血、尿淀粉酶。

75. 患者，女，33岁。尿频、尿急、尿痛1天，肉眼血尿2小时就诊，尿常规：WBC. 200个/HP，RBC. 150个/HP，尿红细胞畸形率20%。该患者最可能的诊断是

- A. 肾小球肾炎
- B. 急性间质性肾炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

参考答案：C

参考解析：急性膀胱炎有明显的膀胱刺激症：尿频、尿急、夜尿增多、排尿烧灼感或尿痛。常有腰骶部或耻骨上区疼痛不适。并常见排尿中断和血尿，发热少见。实验室检查：血象正常，或有白细胞轻度升高。尿液分析常有脓尿或菌尿，有时可发现肉眼血尿或镜下血尿。尿培养可发现致病菌。如没有其它泌尿系疾病，血清肌酐和血尿素氮均正常。

76. 患者，女，47岁。慢性肾炎病史多年，近2年经常出现双下肢水肿，一直服潘生丁及氢氯噻嗪。近一周感觉腰痛，乏力，双下肢无力。首先必须考虑的是

- A. 肾功能严重减退
- B. 低钾血症
- C. 肾盂肾炎
- D. 潘生丁中毒
- E. 氢氯噻嗪中毒

参考答案：B

参考解析：氢氯噻嗪为排钾利尿药，长期服用可引起低钾。一般不宜过多、长久使用。

77. 某患者 1 天来诊。查下腹部扪及囊性包块，直肠指诊前列腺 II° 大，质地韧，表面光滑，中央沟消失。血 PSA. 2. 2ng/ml、BUN 4. 5mmol/L、Cr 267 μ mol/L。可能的诊断是

- A. 前列腺癌
- B. 良性前列腺增生症
- C. 前列腺肉瘤
- D. 前列腺炎
- E. 以上都不是

参考答案：B

参考解析：良性前列腺增生症常常有慢性排尿困难等病史，直肠指诊前列腺肿大，质地韧，表面光滑，中央沟消失，血 PSA 不高。

78. 女，32，停经 42 天，阴道少量流血伴左下腹胀痛 2 天。妇科检查：子宫常大小，质软，左附件区略厚、轻压痛。最可能的诊断是

- A. 急性输卵管炎
- B. 子宫内膜异位症
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 输卵管妊娠
- E. 先兆流产

参考答案：D

参考解析：停经后阴道出血，且有腹部轻压痛，考虑异位妊娠。故选 D。

79. 女，55 岁。体重 76kg，身高 160cm。因多饮、多尿确诊为 2 型糖尿病，经饮食治疗和运动锻炼，2 个月后全腹血糖为 8. 8mmol/L，餐后 2 小时血糖 13. 0mmol/L，进一步治疗应选择

- A. 加双胍类降血糖药物
- B. 加胰岛素治疗
- C. 维持原饮食治疗和运动
- D. 加磺脲类降血糖药物
- E. 加口服降血糖药和胰岛素

参考答案：A

参考解析：双胍类药物：二甲双胍作为一线用药和药物联合中的基本用药，肥胖型糖尿病患者的首选药物。

80. 男，45 岁。确诊冠心病 5 年，目前低密度脂蛋白胆固醇（LDL~C）3. 4mmol/L，考虑服用他汀类药物。该患者 LDL~C 控制的理想水平是

- A. 小于 1. 8mmol/L
- B. 小于 2. 6mmol/L
- C. 小于 3. 4mmol/L
- D. 1. 8mmol/L~2. 6mmol/L
- E. 2. 6mmol/L~3. 4mmol/L

参考答案：B

参考解析：中国成人血脂异常的分层标准：LDL~C 理想水平，<2. 6（100）；LDL~C 合适水平，<3. 4（130）。故选 B。

81. 男，22 岁。3 小时前活动时突然感剧烈头痛和呕吐，出现全面性强直-阵挛性癫痫发作一次，脑膜刺激征（+）。最可能的诊断是

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑干出血
- C. 小脑出血
- D. 癫痫发作
- E. 脑膜脑炎

参考答案：A

参考解析：蛛网膜下腔出血诊断要点：①突发剧烈头痛及呕吐。②脑膜刺激征阳性，伴或不伴有意识障碍。③无局灶性定位体征。④血性脑脊液。⑤脑CT证实脑池和蛛网膜下腔有血样高密度征象。应对引起SAH的各种常见病因而进行鉴别。

82. 患者，男，14岁。上课时突然手中钢笔掉在地上，双眼向前瞪视，呼之不应，持续数秒，过后不能回忆当时情况，以后反复发作。该患者诊断为

- A. 癔症
- B. 失神发作
- C. 肌阵挛发作
- D. 失张力发作
- E. 局限性癫痫

参考答案：B

参考解析：癔症、失张力发作、肌阵挛发作不伴意识丧失，该患者发作时意识丧失，故排除局限性癫痫，属于失神发作。

83. 患者，男，23岁。3个月前起病，说话语无伦次，常自言自语，说自己是神仙，是伟人，对异性有非分之想，攻击亲人。查：意识清晰，兴奋躁动，思维破碎，内容离奇，难以理解，认为门外有人要杀他，有一台电脑在影响他的大脑，使大脑在不停地转。躯体及神经系统检查未见显著体征，该患者诊断是

- A. 躁狂症
- B. 抑郁症
- C. 精神分裂症
- D. 心因性精神障碍
- E. 神经症

参考答案：C

参考解析：A躁狂状态的主要临床症状是心境高涨，思维奔逸和精神运动性兴奋。除外。B抑郁以情感低落、思维迟缓、以及言语动作减少、迟缓为典型症状。故除外。D心因性精神障碍是一组由心理社会因素所造成的精神障碍。不符合。E神经官能症又称神经症、精神症，是一组非精神病功能性障碍。其共同特征是：是一组心因性障碍，人格因素、心理社会因素是致病主要因素，但非应激障碍，是一组机能障碍，障碍性质属功能性非器质性；具有精神和躯体两方面症状；具有一定的人格特质基础但非人格障碍；各亚型有其特征性的临床相；神经症是可逆的，外因压力大时加重，反之症状减轻或消失；社会功能相对良好，自制力充分。故除外。

84. 某抑郁症患者，27岁。复发情绪抑郁、悲观厌世，认为自己是历史罪人，只有死路一条，反复自杀未遂。首选的治疗方法为

- A. 心理治疗
- B. 电抽搐治疗
- C. 丙咪嗪
- D. 氟西汀
- E. 舒必利

参考答案：B

参考解析：有严重消极自杀企图的患者及抗抑郁药治疗无效的患者可采用电抽搐治疗。

85. 患者，女，49岁。颈肩痛5年余，出现四肢麻木，无力半年，行走时步态不稳。查体见双手尺侧以下皮肤感觉减退，双下肢肌张力增高，肌力III~IV级，X线片见颈椎骨质明显退行性改变。其诊断可能为

- A. 颈椎增生
- B. 神经根型颈椎病
- C. 脊髓型颈椎病
- D. 交感神经型颈椎病
- E. 椎管内肿瘤

参考答案：C

参考解析：脊髓型，无力半年，行走时步态不稳为其典型特点。病变：颈部病变导致脊髓受压、炎症、水肿等；高发年龄段：40~60岁。主要症状：下肢麻木、沉重，行走困难，双脚有踩棉感；上肢麻木、疼痛，双手无力、不灵活，写字、系扣、持筷等精细动作难以完成，持物易落；躯干部出现感觉异常，患者常感觉在胸部、腹部、或双下肢有如皮带样的捆绑感。

86. 一成年男性，右肩部摔伤活动受限，来诊时见其以手托右侧前臂，右肩基本方肩畸形，将其右手搭在左侧肩部，则右肘不能靠近胸壁。应首先考虑的诊断是

- A. 肩关节脱位
- B. 肩锁关节脱位
- C. 锁骨骨折
- D. 肩关节周围炎
- E. 肩部骨折

参考答案：A

参考解析：解析：肩关节脱位一般表现为患处疼痛肿胀肩关节活动受限，方肩畸形，搭肩试验（Dugas征）阳性，即将患侧肘部紧贴胸壁时，手掌搭不到健侧肩部；或手掌搭在健侧肩部时，肘部无法贴近胸壁，为肩关节脱位特有的临床表现。患者表现符合肩关节脱位的特点。

87. 8个月男孩，呕吐，腹泻3天，无尿12小时，T37.8℃，嗜睡与烦躁交替，双眼深陷，口唇干燥，皮肤弹性差，四肢冷，见花纹，脉细弱160次/分，心音低，呼吸深长60次/分，腹部肠鸣音亢进，血象150g/L，WBC. $13.0 \times 10^9/L$ ，L0.60，初步诊断小儿腹泻伴有

- A. 重度脱水，代谢性酸中毒
- B. 中度低渗性脱水，代谢性酸中毒
- C. 重度脱水，低钾血症，代谢性酸中毒
- D. 败血症休克，低钾血症，代谢性酸中毒
- E. 重度高渗性脱水，代谢性酸中毒

参考答案：A

参考解析：呕吐，腹泻3天，无尿12小时，嗜睡与烦躁交替，双眼深陷，口唇干燥，皮肤弹性差，四肢冷，见花纹，这些表现为重度的脱水表现；代谢性酸中毒主要是由于失碱造成的，主要表现为精神萎靡、呼吸深快、口唇樱桃红、腹痛、呕吐、昏睡、昏迷、心律失常和心衰等。

88. 慢性乙肝患者，化验乙肝五项指标，HBsAg (+)，抗HBc (+)，HBeAg (+)，ALT 120U/L，其意义

- A. 病毒有复制，肝脏有损伤
- B. 病毒无复制，无传染性
- C. 有传染性

- D. 肝脏有损伤，无传染性
E. 病毒有复制，有传染性，肝脏有损害

参考答案：E

参考解析：(1)HBsAg：阳性反映现症HBV感染，阴性不能排除HBV感染。(2)HBeAg：HBeAg的存在表示病毒复制活跃且有较强的传染性。(3)抗HBe：抗HBe阳转后病毒多处于静止状态。长期抗HBe阳性并不代表病毒复制停止或无传染性。(4)HBcAg：阳性表示血清中存在Dane颗粒，HBV处于复制状态，有传染性。(5)HBV DNA：是病毒复制和传染性的直接标志。ALT 120U/L，升高，提示肝损害。

89. 男，45岁，商人。有不洁性交史5天，1天前尿道疼痛出脓。查体：尿道口可见大量黄色脓性分泌物。下列各种检查既便捷又准确的是

- A. 淋球菌涂片
B. 淋球菌培养
C. HIV分离
D. 血清抗-HIV
E. RPR

参考答案：A

参考解析：男性淋病主要表现为尿道口红肿、灼热、瘙痒，出现脓性分泌物及尿频、尿急、尿痛的尿路刺激症状，可并发前列腺炎、精囊炎、输精管炎、附睾炎等。根据不洁性接触病史、临床表现及淋球菌直接涂片可诊断。

90. 患者，男，72岁。吸烟指数1200，近半年有咳嗽，痰中带血丝，近2月出现声嘶，查右锁骨上窝触及一肿大淋巴结，质硬，无压痛。则可能为

- A. 非霍奇金淋巴瘤
B. 肺门淋巴结结核
C. 慢性肺脓肿
D. 咽喉炎
E. 肺癌

参考答案：E

参考解析：吸烟指数=每天吸烟支数×吸烟年数。吸烟指数1200提示患者有长期吸烟史，另外患者为老年男性，属肺癌的高发人群。咳嗽，痰中带血丝，声嘶，右锁骨上窝触及一肿大淋巴结，质硬，无压痛，符合肺癌临床表现。

91. 女性，45岁。遭车祸时左季肋部撞伤脾破裂。血压80/60mmHg，神志尚清楚，脉搏120次/分，表情淡漠，口渴。面色苍白。估计出血量达

- A. 400~500mL
B. 600~700mL
C. 800~1600mL
D. 1700~2400mL
E. 大于2400mL

参考答案：C

参考解析：据患者临床表现诊断为中度休克，失血量应为20%~40%，失血量在800~1600mL左右(C对)，故本题选C。

92. 患者，男，70岁。糖尿病10年，以往无心悸、胸痛史，今日早餐后1小时，突然胸闷明显，面色苍白，烦躁，出汗恐惧感，2小时未缓解。体检：心率100次/分，血压86/70mmHg。最可能诊断为

- A. 不典型心绞痛

- B. 低血糖
- C. 急性心肌梗死
- D. 糖尿病酸中毒
- E. 变异型心绞痛

参考答案：C

参考解析：急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛，休息及硝酸酯类药物不能完全缓解，伴有血清心肌酶活性增高及进行性心电图变化，可并发心律失常、休克或心力衰竭，常可危及生命。

93. 女，65岁，1小时前行走时不慎摔倒，髌部着地，当即左髌剧痛，不能站立行走。查体：左下肢缩短，外旋畸形。患者最可能的诊断是

- A. 左髌关节前脱位
- B. 左髌关节后脱位
- C. 左髌关节中心脱位
- D. 左股骨颈骨折
- E. 尾骨骨折

参考答案：D

参考解析：股骨颈骨折的诊断：1. 有外伤史（病人外伤后感髌部疼痛，下肢活动受限，不能站立和行走）；2. 检查时可发现患肢出现外旋畸形，一般在 45° ~ 60° 之间。若外旋畸形达到 90° ，应注意是否合并转子间骨折。根据题干信息，本题选D。

94. 建筑工人不慎坠楼，腰部剧痛，双下肢感觉运动障碍，二便功能障碍，经X线检查，诊断为胸腰段压缩型骨折，高度怀疑脊髓损伤。下列各项检查最有价值的是

- A. MRI
- B. CT
- C. ECT
- D. 脊髓造影
- E. X线断层摄影

参考答案：A

参考解析：MRI（磁共振）检查对判定脊髓损伤状况极有价值。

95. 女性，35岁。误服有机磷农药后出现多汗、流涎、呼吸困难、肺水肿。其口鼻分泌物为

- A. 水样
- B. 脓样
- C. 黏液脓性
- D. 血样
- E. 泡沫样

参考答案：E

参考解析：患者出现的是毒蕈碱样症状，其口鼻分泌物为白色泡沫样分泌物(E对)，故本题选E。

96. 某大学生参加朋友聚会，席间不少人吸烟，整个房间烟雾缭绕。劝阻不成后，只好找个借口先行离开，该大学生的这一行为属于

- A. 致病行为
- B. 不良疾病行为
- C. 基本健康行为
- D. 避开环境危害行为
- E. 违反社会道德的行为

参考答案：D

参考解析：预警及避开环境危害行为：指可能发生的危害健康的事件预先采取预防措施从而预防事故发生，以及能在事故发生后正确处置的行为。如驾车使用安全带，溺水、车祸、火灾等意外事故发生后的自救和他救行为。环境危害是广义的，包括了人们生活和工作的自然环境与心理社会环境中对健康有害的各种因素。

97. 婴儿，5月龄。昨日接种了百白破混合疫苗，今日有轻度发热，稍哭闹不安，查体：体温37.5℃，右上臂外侧注射部位有轻微红肿，咽部充血，心肺无异常发现。下列哪项处理最恰当

- A. 暂不用药
- B. 口服退热药
- C. 口服抗生素
- D. 口服抗病毒药
- E. 同时口服抗生素和抗病毒药

参考答案：A

参考解析：预防接种一般反应是指在预防接种后发生的，由疫苗本身所固有的特性引起的，对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应，主要有发热和局部红肿，同时可能伴有全身不适、倦怠、食欲不振、乏力等综合症状。

98. 患儿，8岁。诊断为营养不良，对该患儿治疗中要注意的原则最重要的是

- A. 使用促消化吸收药物
- B. 补充营养物质
- C. 控制继发感染
- D. 去除病因，调整饮食
- E. 加强锻炼

参考答案：D

参考解析：病因治疗：分析可能的病因，采取相应的干预措施。

99. 新生儿，出生15天。胎龄38周自然分娩。纯母乳喂养，乳量充足，为预防佝偻病，每日应补充的制剂及剂量是

- A. 钙剂 200mg
- B. 维生素 D400IU
- C. 维生素 D800IU
- D. 钙剂 200mg+维生素 D400IU
- E. 钙剂 200mg+维生素 D800IU

参考答案：B

参考解析：生后数天开始补充维生素D，足月儿每日口服400IU，早产儿每日口服800IU。

100. 女，80岁。在健康体检中生活自理能力评估表得分为70分，该老人生活自理能力评估程度为

- A. 可自理
- B. 轻度依赖
- C. 中度依赖
- D. 重度依赖
- E. 不能自理

参考答案：B

参考解析：根据总评分判断老年人生活自理能力的程度。判断依据是：0~3分者为可自理；4~8分者为轻度依赖；9~18分者为中度依赖；19分者为不能自理。

101. 男, 66 岁。2 天前与人争吵时觉头晕, 当时测血压 140/80mmHg, 今天骑车 10 公里到县医院就诊, 到达时测血压 160/85mmHg。关于此时该患者的血压诊断, 正确的说法是

- A. 诊断为高血压 1 级, 低危
- B. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级, 中危
- C. 诊断为高血压 2 级, 中危
- D. 暂不能诊断高血压, 须多次测量安静休息时血压后才可能明确诊断
- E. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级, 但须进一步检查后才能明确危险分组

参考答案: D

参考解析: 注意测量血压正确的方法: 要安静休息 5 分钟以上开始测量。

102. 女, 70 岁, 诊断为糖尿病。患者饮食治疗中注意事项不正确的是

- A. 按时进食
- B. 控制总热量是关键
- C. 严格限制各种甜食
- D. 每周监测体重
- E. 清晨空腹锻炼

参考答案: E

参考解析: 糖尿病患者治疗要采取综合治疗, 包括饮食治疗、运动治疗、血糖监测、健康教育和药物治疗。其中饮食治疗的基本原则是控制总能量, 达到或维持合理体重; 平衡膳食, 合理安排各种营养素比例; 避免高脂肪、适量蛋白质、适宜碳水化合物; 增加膳食纤维摄入; 清淡饮食, 减少钠盐摄入; 坚持少量多餐, 定时定量; 保持饮食摄入和身体活动的平衡。

103. 患者, 女, 62 岁。确诊 2 型糖尿病 4 年, 在村卫生室进行健康管理。3 个月前查空腹血糖为 6.7mmol/L, 告知患者按期随访今晨自测空腹血糖为 10.7mmol/L, 到乡卫生院就诊, 测空腹血糖为 9.8mmol/L。患者能遵医嘱服药、控制饮食和运动。根据患者病情, 医生应做的处置是

- A. 药量不变, 按期随访
- B. 转诊至上级医疗机构, 2 周内随访
- C. 转诊至上级医疗机构, 2 个月内随访
- D. 调整药物, 2 周内随访
- E. 调整药物, 2 个月后随访

参考答案: D

参考解析: 对第一次出现空腹血糖控制不满意 (空腹血糖值 ≥ 7.0 mmol/L) 或药物不良反应的患者, 结合其服药依从情况进行指导, 必要时增加现有药物剂量、更换或增加不同类的降糖药物, 2 周内随访。

104. 男, 25 岁。误服有机磷农药 40ml, 立即被其家人送往医院。该患者抢救成功的关键是

- A. 彻底洗胃
- B. 早期应用碘解磷定
- C. 早期应用阿托品
- D. 碘解磷定与阿托品合用
- E. 应用抗生素

参考答案: A

参考解析: 组织有关医疗机构紧急救治病人, 根据病人具体情况进行急救 (催吐、洗胃、清肠)、对症治疗和特殊治疗。

105. 男, 44 岁, 精神障碍患者。病人在饮食中尝到一种奇怪、特殊的味道, 实际不存在, 考虑为

- A. 幻嗅
- B. 幻味
- C. 幻触
- D. 错觉
- E. 假性幻觉

参考答案：B

参考解析：本题中患者饮食中出现奇怪味道，属于味觉，所以患者属于幻味。

106. 女，60岁，糖尿病患者。关于对其健康管理随访评估的叙述，下列错误的是

- A. 询问上次随访到此次随访期间的症状
- B. 测量体重，计算体质指数（BMI）
- C. 询问患者疾病情况和生活方式，包括脑血管疾病、吸烟、饮酒、运动等
- D. 了解患者服药情况
- E. 检查颈动脉搏动

参考答案：E

参考解析：糖尿病患者的健康管理随访评估应该是：测量体重，计算体重指数（BMI），检查足背动脉搏动。

107. 某孕妇，妊娠32周。在乡镇卫生院产前检查，BP120/80mmHg，胎心150次/分，宫高28cm，头位。产前检查结束后，医生告知该孕妇至少还要进行1次产检，其合适的时间是

- A. 妊娠34周后
- B. 妊娠35周后
- C. 妊娠36周后
- D. 妊娠37周后
- E. 妊娠38周后

参考答案：C

参考解析：晚期保健至少2次，可分别在孕28~36周、37~40周各检查1次。

108. 女，28岁，妊娠9周。阵发性下腹痛2天，阴道少量流血1天就诊。为确定是否能够继续妊娠，此时应进行的辅助检查是

- A. 尿妊娠试验
- B. B型超声检查
- C. 检测血清雌三醇值
- D. 检测血清雌二醇值
- E. 检测血清甲胎蛋白值

参考答案：B

参考解析：B超可以了解胚胎的发育情况。

109. 患儿，女，2岁。出现发热2天后出疹，伴咽炎，草莓舌，出疹时伴高热，出疹顺序是颈、腋、下腹股沟。考虑疾病及首选药物是

- A. 猩红热，青霉素
- B. 水痘，阿昔洛韦
- C. 幼儿急疹，阿昔洛韦
- D. 猩红热，阿昔洛韦
- E. 水痘，青霉素

参考答案：A

参考解析：猩红热出疹顺序是颈、腋、下腹股沟，24小时遍及全身，可出现咽炎、草莓舌，其病原菌为A组乙型溶血性链球菌，首选药物为青霉素。故本题选A。

110. 2018年4月,某乡小学发生5例麻疹病例,均为学生。针对该校未发病学生最有效的预防措施是

- A. 隔离治疗
- B. 健康教育
- C. 开窗通风
- D. 彻底消毒
- E. 应急接种

参考答案: E

参考解析: 应急接种是指在传染病疫情开始或有流行趋势时,为控制传染病疫情蔓延,对目标人群开展的预防接种活动。

综合分析题

患儿,男性,7岁。咳嗽1周,喘3天,无发热,门诊就诊。

111. 哪项检查对诊断有帮助

- A. 血常规
- B. 病毒分离
- C. X线正位片
- D. 冷凝集试验
- E. OT试验

参考答案: C

参考解析: 胸部X线片可作为诊断标准。

112. 患儿治疗,哪项不必要

- A. 止咳祛痰
- B. 平喘
- C. 抗生素
- D. 输血
- E. 适当镇静

参考答案: D

参考解析: 控制炎症,改善通气功能,对症治疗,该患者无需输血。

113. 为证实患肺炎,下列哪项检查最有价值

- A. 观察一般状态,生命体征
- B. 有无三凹征
- C. 肝是否增大
- D. 心音是否低钝,有无奔马律
- E. 肺部有无水泡音

参考答案: E

参考解析: 小儿,咳嗽喘息,如果在肺部闻及水泡音可以考虑诊断为肺炎。其他几项均不是肺炎的症状。肺部水泡音就是湿啰音的意思。

综合分析题

患者,男,49岁。既往体健,因头晕半天,黑便3次,急诊。血压80/50mmHg,心率124次/分,面色苍白,冷汗。

114. 首先考虑

- A. 急性肠炎

- B. 急性胃穿孔
- C. 心绞痛
- D. 心肌梗死
- E. 食管下段癌出血

参考答案：B

参考解析：患者黑便、休克，首先考虑上消化道大出血并失血性休克。

115. 急救措施首选

- A. 抗炎补液治疗
- B. 开腹探查
- C. 含服硝酸甘油
- D. 溶栓治疗
- E. 输血、补液，纠正休克

参考答案：E

参考解析：上消化道大出血并失血性休克，应采取积极措施进行抢救。抗休克、迅速补充血容量治疗应放在一切治疗措施的首位。

116. 最能尽快明确诊断的检查是

- A. 超声心动图
- B. CT
- C. 血生化、心肌酶
- D. 胸片
- E. 胃镜

参考答案：E

参考解析：止血时应尽快输血。胃镜检查是目前诊断上消化道出血病因的首选检查方法。

综合分析题

患者，女，28岁，已婚。一年半前人流1次，平素月经正常。因停经35天后少量阴道流血1周，下腹隐痛4天来诊。妇科检查，子宫颈口闭、举痛(+)，子宫如正常大小，左侧扪及3cm×3cm×2cm大小的包块，有触痛。尿hCG(+)。

117. 最可能的诊断是

- A. 月经失调
- B. 先兆流产
- C. 异位妊娠
- D. 附件炎
- E. 不全流产

参考答案：C

参考解析：有停经史，不规则阴道流血、HCG阳性，附件区包块，下腹疼痛，高度怀疑异位妊娠。

118. 最合理的处理方式是

- A. 随访尿hCG
- B. 随访子宫大小
- C. 后穹隆穿刺
- D. 腹腔镜检查
- E. 诊断性刮宫

参考答案：D

参考解析：对于非破裂型异位妊娠首选腹腔镜检查。

综合分析题

30岁已婚女性，公司职员，发现明显消瘦2个月，近1个月进食增多，并感觉疲乏，常有心慌，怕热多汗，易激动而住院。

119. 体格检查最可能的发现是

- A. 紧张，消瘦，甲状腺结节性肿大，心率快，律不齐
- B. 精神萎靡，皮肤干燥，甲状腺弥漫性肿大，手颤
- C. 稍胖，皮肤色素脱失，心脏增大，心律齐
- D. 紧张，消瘦，眼突，甲状腺肿大，心率快
- E. 消瘦，皮肤结膜苍白，心率快，下肢肿

参考答案：D

参考解析：甲状腺功能亢进可表现为高代谢症状、甲状腺肿，GD患者可伴浸润性突眼。

120. 检查后为甲状腺功能亢进症（Graves病），长期抗甲状腺药物治疗最可能的预后

- A. 多数治愈，少数复发
- B. 治愈及复发机会相等
- C. 最终成为甲低
- D. 病情反复发作
- E. 完全治愈

参考答案：A

参考解析：抗甲状腺药物的作用是抑制甲状腺合成甲状腺激素，多数治愈，但也有一部分病例复发。

综合分析题

男，58岁。突然头痛呕吐，伴意识丧失30分钟。查体：神志清楚，颈部抵抗，克氏征阳性，右侧眼睑下垂，右侧瞳孔4mm，光反应消失。

121. 最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 蛛网膜下腔出血
- C. 高血压脑出血
- D. 脑动静脉畸形出血
- E. 颅内肿瘤

参考答案：B

参考解析：诊断要点包括：①突发剧烈头痛及呕吐。②脑膜刺激征阳性，伴或不伴有意识障碍。③无局灶性定位体征。④血性脑脊液。⑤脑CT证实脑池和蛛网膜下腔有血样高密度征象。应对引起SAH的各种常见病因进行鉴别。

122. 最好的诊断措施是

- A. 腰椎穿刺
- B. 脑电图、
- C. 视力检查
- D. 头颅CT
- E. 视神经成像

参考答案：D

参考解析：脑CT证实脑池和蛛网膜下腔有血样高密度征象。应对引起SAH的各种常见病因

进行鉴别。

综合分析题

女，50岁，左肩疼痛1月余，向左上肢放射，伴左肩关节活动受限，症状逐渐加重，夜间翻身移动肩部时会痛醒，查体：左肩肌肉萎缩，肩关节外展、外旋活动受限，肩前有局限性压痛，无明显畸形。

123. 最可能的诊断是

- A. 左肩关节软组织损伤
- B. 左肱骨近端骨折
- C. 左肱骨近端转移瘤
- D. 左肩粘连性肩关节囊炎
- E. 神经根型颈椎病

参考答案：D

参考解析：粘连性肩关节囊炎又称肩周炎、冻结肩等。本病是因多种原因致肩盂肱关节囊炎性粘连、僵硬，以肩关节周围疼痛、各方向活动受限为特点，尤其以外展、外旋和内旋后伸活动功能障碍最为明显。故选D。

124. 治疗方法不恰当的

- A. 给予热敷
- B. 给予局部封闭镇痛
- C. 给予局部按摩
- D. 服用非甾体抗炎药
- E. 限制肩关节活动

参考答案：E

参考解析：粘连性肩关节囊炎治疗原则：1. 早期给予理疗、针灸、适度推拿按摩可改善症状。2. 痛点局限时可给予痛点局部封闭，能明显缓解症状。3. 疼痛持续、夜间难以入睡时，可短期服用非甾体抗炎药。4. 无论病程长、短，症状轻、重，均应每日进行肩关节的主动活动，活动以不引起剧烈疼痛为限。故选E。

综合分析题

男婴5天，顺产出生，出生后1天黄疸明显，胎便已排，吃奶减少，查体：反应迟钝，全身皮肤黄染，心肺，腹，查体无异常，握持反射减弱，经皮胆红素测定为30。

125. 该患儿的黄疸应判断为

- A. 生理性黄疸
- B. 经皮胆红素测定读数值未起标
- C. 经皮胆红素测定读数轻度超标
- D. 黄疸持续时间过长
- E. 黄疸出现过早

参考答案：E

参考解析：病理性黄疸临床表现：1. 黄疸出现过早：生后24小时内出现黄疸。2. 血清胆红素程度过重：足月儿 $>221 \mu\text{mol/L}$ (12.9mg/dl)；早产儿 $>257 \mu\text{mol/L}$ (15mg/dl) 或每日上升超过 $85 \mu\text{mol/L}$ (5mg/dl)，或每小时 $>0.85 \mu\text{mol/L}$ (0.5mg/dl)。3. 黄疸持续时间过长：足月儿 >2 周，早产儿 >4 周。4. 黄疸退而复现或进行性加重。5. 血清结合胆红素过高：血清结合胆红素 $>34 \mu\text{mol/L}$ (2mg/dl)。该男婴出生后1天黄疸明显，为黄疸出现过早，选E。

126. 最恰当的处理措施是

- A. 回家观察
- B. 停喂母乳
- C. 蓝光照射
- D. 输注治疗
- E. 紧急转诊

参考答案：E

参考解析：如黄疸出现在出生后 24 小时之内，黄疸高峰时间延长，黄疸持续超过 2 周，皮肤黄染程度严重，或除皮肤发黄外存在大便色浅和尿色持续加深等情况，就需要转诊。故选 E。

综合分析题

男，19 岁，2 小时前突发双眼上翻，牙关紧闭，口吐白沫，双上肢屈曲，双拳紧握。双下肢伸直，持续约 40 分钟，伴神志不清，小便失禁。

127. 初步诊断为癫痫，其发作类型是

- A. 失神发作
- B. 肌阵挛性发作
- C. 癫痫持续状态
- D. 强直性发作
- E. 失张力性发作

参考答案：C

参考解析：癫痫持续状态是指反复癫痫发作，发作之间意识未完全恢复，或一次发作持续 30 分钟以上未能自行停止。任何发作类型均可出现癫痫持续状态。选 C。

128. 治疗措施不恰当的是

- A. 将患者放置在安全地方仰卧
- B. 吸氧、防止唇舌咬伤
- C. 必要时用约束带约束四肢以防自伤
- D. 立即应用抗癫痫药，尽快终止发作
- E. 加强生命体征监测

参考答案：C

参考解析：癫痫发作期的治疗：（1）一般治疗：全身强直-阵挛性发作时，首先应将病人置于安全处，解开衣扣，拿去可摘义齿，保持呼吸道通畅。同时在上、下牙齿之间垫软物，以防唇舌咬伤。（2）迅速控制抽搐：可选用地西泮、异戊巴比妥钠、10%水合氯醛等。（3）减轻脑水肿：可用 20%甘露醇、呋塞米 20~40mg 或 10%甘油果糖利尿脱水，以减轻脑水肿。

（4）其他：维护呼吸道通畅，注意循环功能，纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱，控制高热及感染等。故选 C

综合分析题

女，58 岁，持续性左侧胸痛 2 小时急诊就诊。救治过程中突发抽搐、意识丧失。查体：颈动脉搏动消失。心电监护示室颤。

129. 最可能的病因是

- A. 急性心肌梗死
- B. 扩张型心肌病
- C. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄

D. 心肌炎

E. 心绞痛

参考答案：A

参考解析：急性心肌梗死的诊断依据：1. 典型临床表现，如持续较长时间（常大于 30 分钟）的胸痛或不适。2. 特征性的心电图改变，如 ST 段呈弓背向上型抬高、出现宽而深的 Q 波和 T 波倒置。3. 实验室检查，如心肌酶及肌钙蛋白升高。根据题干信息“持续性左侧胸痛 2 小时”选 A。

130. 最恰当的抢救措施是

A. 气管插管辅助通气

B. 立即行心脏电除颤

C. 静脉注射阿托品

D. 静脉注射利多卡因

E. 静脉注射肾上腺素

参考答案：B

参考解析：如果急性心肌梗死患者出现意识丧失、呼吸停止、颈动脉搏动消失等心脏骤停的表现，应立即给予心肺复苏，直到患者呼吸、心跳恢复或 120 到达为止，但该患者心电监护示室颤，故应先除颤，选 B。

综合分析题

高血压患者余某，体重 75kg，收缩压 170mmHg，舒张压 98mmHg，心电图不正常，ST-T 改变，有大量饮酒嗜好。

131. 针对可能出现的高血压的并发症，医生建议其戒酒、控制体重是

A. 治疗措施

B. 特殊保护

C. 第一级预防措施

D. 第二级预防措施

E. 第三级预防措施

参考答案：C

参考解析：第一级预防又称病因预防或者发病前期预防，是指在疾病尚未发生时针对疾病“易感期”的致病因素（或危险因素）采取措施，是积极预防疾病的根本措施。

132. 针对高血压，医生用降压药控制病情进展是

A. 预防并发症措施

B. 特殊保护

C. 第一级预防措施

D. 第二级预防措施

E. 第三级预防措施

参考答案：E

参考解析：第三级预防又称发病后期预防，指在疾病的“临床期”针对患者采取积极的对症治疗和康复治疗措施，及时有效地防止病情恶化，预防并发症和残疾。

133. 医生通过心电图检查发现该病人患有轻度冠心病属于

A. 筛检措施

B. 保健措施

C. 第一级预防措施

D. 第二级预防措施

E. 第三级预防措施

参考答案：D

参考解析：第二级预防又称“三早”预防或者临床前期预防，是在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗的“三早”预防工作，为防止或者减缓疾病发展而采取的措施。

综合分析题

某年6月，某村民在家自办宴席，就餐者60人，随后陆续有16人出现腹痛、腹泻，为黏液脓血便，伴里急后重，患者被诊断为细菌性痢疾。经调查，该村环境卫生较差，苍蝇较多，由镇水厂统一供水，未就餐者无发病，就餐者中食用凉菜者无发病。

134. 此案例中，主要传播途径是

- A. 经体液传播
- B. 经食物传播
- C. 经接触传播
- D. 经虫媒传播
- E. 经土壤传播

参考答案：B

参考解析：消化道传播途径：包括经水传播、或经食物、食具传播。

135. 如对该村民家庭进行卫生处理，正确的方式是

- A. 先消毒后灭蝇
- B. 先采集样品再消毒
- C. 重点做好空气消毒
- D. 消毒顺序为先内后外
- E. 先消毒污染房间再消毒清洁房间

参考答案：B

参考解析：首先采集样品后消毒，是更好的了解本次致病菌，更有针对性的防止，并且不影响消毒处理。

综合分析题

某乡卫生院收到妇产医院转来的某产妇分娩出院信息，按照孕产妇健康管理服务要求，对该产妇进行产褥期健康管理。

136. 产妇出院第5天，乡村医生到该产妇家中进行产后访视。进行健康状况评估的项目不包括（ ）。

- A. 乳房检查
- B. 子宫底下降情况
- C. 观察恶露
- D. 妇科检查
- E. 伤口恢复情况

参考答案：D

参考解析：根据题干可知，该产妇已回到家中，乡村医生到该产妇家中进行产后访视，故进行健康评估的项目不包括妇科检查，选D。

137. 经健康状况评估，未发现异常。医生应对该产妇提供的保健指导是（ ）。

- A. 体重管理指导
- B. 风疹疫苗接种指导
- C. 个人卫生指导

- D. 人工喂养指导
- E. 儿童早期发展指导

参考答案：C

参考解析：医生对该产妇提供的保健指导应为个人卫生指导，以防感染，选C。

138. 该产妇于产后42天到乡卫生院接受产后健康检查，产妇已恢复正常，医生提示可恢复性生活，但需采用安全可靠的避孕措施。该措施是（ ）。

- A. 哺乳期避孕
- B. 使用避孕套
- C. 放置宫内节育器
- D. 口服避孕药
- E. 安全期避孕

参考答案：B

参考解析：安全可靠的避孕措施应为使用避孕套，选B。

综合分析题

经眉弓上缘、枕骨结节左右对称环绕头一周的长度为头围。根据小儿生长发育规律，请回答以下问题。

139. 3月龄婴儿的头围约是

- A. 36cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 50cm
- E. 56cm

参考答案：B

参考解析：出生时头围平均为33~34cm，1岁时为46cm，2岁时为48cm，15岁时为54~58cm，基本同成人。

140. 5岁儿童的头围约是

- A. 36cm
- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 50cm
- E. 56cm

参考答案：D

参考解析：出生时头围平均为33~34cm，1岁时为46cm，2岁时为48cm，15岁时为54~58cm，基本同成人。

综合分析题

新生儿，出生5天。足月自然分娩，现出院2天。村医入户前来访视时询问及观察了母乳喂养的情况，并给予母乳喂养、护理、疾病预防等咨询指导。

141. 针对母乳喂养，医生咨询指导不恰当的是

- A. 定时吸吮可增加乳汁分泌
- B. 乳房按摩可促进乳汁分泌
- C. 喂空一侧乳房，再喂另一侧
- D. 产后6个月内，泌乳量随婴儿月龄增长而逐渐增加

E. 乳量不足时，可表现为婴儿尿量每天少于 6 次

参考答案：A

参考解析：母乳喂养指导：鼓励纯母乳喂养，按需哺乳，指导正确哺乳方法。

142. 医生指导家长应该立即送新生儿去医院诊治的情况是

A. “马牙”

B. “螳螂嘴”

C. 体温 38.5℃

D. 心率 120 次/分

E. 巩膜、面部皮肤轻度黄染

参考答案：C

参考解析：对生理性黄疸、生理性体重下降、“马牙”、“螳螂嘴”、乳房肿胀、假月经等现象无需特殊处理。若新生儿体温 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 或 $\leq 35.5^{\circ}\text{C}$ 。需要去医院诊治。

综合分析题

男，53 岁，公司经理。吸烟 15 年，每天 2 包，体重 75kg，身高 164cm。

143. 建议该就诊者采取的预防措施是

A. 冬令进补

B. 强制减肥

C. 冷水沐浴锻炼

D. 肺炎链球菌疫苗接种

E. 戒烟，适当运动和合理饮食

参考答案：E

参考解析：个体预防措施是针对个人实施的预防措施，如个体化健康教育，提倡自主健康和自我保健，按照合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡的健康基本原则，改变不良的行为和生活方式，建立可行的有益于健康的行为与生活方式，如开展婚育咨询、妊娠和儿童营养咨询等。

144. 从临床预防心血管疾病的角度讲应该检查

A. 血脂

B. 血常规

C. 心脏彩超

D. 心电图

E. 冠状动脉造影

参考答案：A

参考解析：从临床预防心血管疾病的角度讲应该检查血脂。

145. 患者的 BMI(体重指数)是

A. 21.4

B. 23.5

C. 25.8

D. 27.9

E. 31.5

参考答案：D

参考解析：“体重指数 (BMI)”是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个重要指标，计算公式是体重指数=体重 (kg) ÷ 身高的平方 (m²)。

146. 可能存在的健康问题是

- A. 有高血压的可能
- B. 有肥胖的可能
- C. 有糖尿病的可能
- D. 有抑郁症的可能
- E. 自理能力下降

参考答案：B

参考解析：BMI=72÷1.72=24.91，中国成年人的正常值范围为18.5≤BMI<24.0，小于18.5为偏瘦，24.0~27.9为偏胖，28.0~31.9为肥胖，大于32为重度肥胖。所以判断有肥胖的可能。

147. 健康指导的重点是

- A. 少量多餐
- B. 戒烟、戒酒
- C. 宜清淡饮食
- D. 控制饮食，增加活动
- E. 药物治疗

参考答案：D

参考解析：为防止肥胖，应注意控制饮食，增加活动。

综合分析题

患者，男，51岁。胸骨后剧烈疼痛4小时，伴大汗淋漓，血压80/60mmHg，心率134次/分。面色苍白，四肢冰冷。心电图示：急性广泛前壁心肌梗死。

148. 该患者血压低的原因是

- A. 血容量不足
- B. 合并右心室梗死
- C. 舒张期充盈不足
- D. 心源性休克
- E. 疼痛性休克

参考答案：D

参考解析：胸骨后剧烈疼痛，大汗淋漓，血压下降，心率增快。面色苍白，四肢冰冷。心电图示急性广泛前壁心肌梗死。考虑为广泛前壁心肌梗死引起心排血量急剧下降，导致心源性休克。

149. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是

- A. 心电图和血压监测
- B. 心肌酶谱监测
- C. 漂浮导管血流动力学监测
- D. 超声心动图
- E. 胸部X线片

参考答案：C

参考解析：漂浮导管可测定左室舒张末压增高为休克提供证据。

150. 对该患者最理想有效的治疗措施是

- A. 毛花苷C强心
- B. 多巴胺升压
- C. 尿激酶溶栓
- D. 主动脉内球囊反搏术

E. 直接 PCI 术

参考答案：E

参考解析：此病例为急性广泛前壁心肌梗死引起心排血量急剧下降，导致心源性休克，有效的治疗措施是直接 PCI 术。再灌注心肌是最理想有效的治疗措施。对 AMI 并发心源性休克患者，直接 PCI 与药物治疗，可明显降低 6 个月病死率，故首选直接 PCI 术。

