

2022年中医医师资格执业押题

第四单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医外科学疾病的发病机理不包括

- A. 邪正盛衰
- B. 气血凝滞
- C. 情志内伤
- D. 经络阻塞
- E. 脏腑失和

2. 下列不属于痰肿的是

- A. 肿势软如棉
- B. 硬如馒
- C. 不红不热
- D. 如烂棉不起
- E. 皮色不变

3. 以下不含升丹的提脓去腐药为

- A. 黑虎丹
- B. 九一丹
- C. 九黄丹
- D. 五五丹
- E. 七三丹

4. 整个足部红肿灼热疼痛，肿势散漫，宜诊断为

- A. 足背丹毒
- B. 足背疽
- C. 足发背
- D. 足部疔疮
- E. 足部流痰

5. 下列关于乳核的说法，错误的是

- A. 相当于西医的乳腺纤维腺瘤
- B. 好发于40-60岁的女性
- C. 一般无疼痛
- D. 常单个发生
- E. 边界清楚，表面光滑

6. 失荣气郁痰结证选用

- A. 四海舒郁丸
- B. 海藻玉壶汤合二陈汤
- C. 柴胡疏肝散

D. 逍遥散

E. 化痰开郁方

7. 下列不属于油风的辨证分型的是

- A. 血热风燥证
- B. 气滞血瘀证
- C. 气血两虚证
- D. 肝肾不足证
- E. 肠胃湿热证

关注胖大海医考，获取更多资讯

8. 瘾疹的治疗中，风团色淡白，皮肤干燥者可选用的熏洗中药是

- A. 马齿苋、白鲜皮
- B. 白术、茯苓
- C. 苦参、黄柏
- D. 使君子、雷丸
- E. 乌梅、土茯苓

9. 肛痈高位脓肿者宜采用的治疗手段是

- A. 脓肿一次切开法
- B. 一次切开挂线法
- C. 分次手术法
- D. 扩肛法
- E. 纵切横缝法

10. 不属浅度烧伤的临床表现的是

- A. 剧痛
- B. 感觉迟钝
- C. 有大水疱
- D. 基底均匀潮红
- E. 创面潮湿

11. 完带汤、生化汤均出自

- A. 《经效产宝》
- B. 《傅青主女科》
- C. 《妇入大全良方》
- D. 《妇入秘科》
- E. 《胎产全书》

12. 下列不属于正常的月经现象的是

- A. 15岁月经初潮
- B. 28-30天行经一次
- C. 经期3-7天
- D. 经量约15ml
- E. 经质不稀不稠, 无血块, 无臭气

13. 受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者, 称为

- A. 并月
- B. 居经
- C. 暗经
- D. 避年
- E. 垢胎

14. 下列各项, 易导致妇产科疾病发生的是

- A. 风、湿、热
- B. 寒、热、湿
- C. 风、寒、湿
- D. 寒、暑、热
- E. 寒、湿、燥

15. 经期见大便溏泄, 经行量多, 色淡质薄, 脘腹胀满, 神疲肢软; 舌淡红, 苔白, 脉濡缓. 其治法为

- A. 温阳健脾, 渗湿止泻
- B. 健脾渗湿, 理气调经
- C. 温阳补肾, 健脾止泻
- D. 健脾化湿, 温阳固肠
- E. 补益脾肾, 渗湿止泻

16. 两次月经中间阴道少量出血, 色深红, 平素带下量多色黄, 质黏稠, 大便黏腻, 则治疗宜

- A. 两地汤
- B. 小蓟饮子
- C. 草薢渗湿汤
- D. 清肝止淋汤
- E. 逐瘀止血汤

17. 转胞是指

- A. 妊娠期间, 小便不通
- B. 妊娠期间, 胎位不正
- C. 妊娠期间, 小腿抽筋
- D. 妊娠期间, 大便不通
- E. 妊娠期间, 下肢肿胀

18. 妊娠恶阻肝胃不和证, 治宜

- A. 清肝和胃, 降逆止呕
- B. 温经通络, 止痛安胎
- C. 温补肾阳, 通络止痛
- D. 温阳活血, 养血安胎

E. 化痰除湿, 降逆止呕

19. 妊娠期用药不需要慎用或禁用的是

- A. 耗气散气
- B. 峻下逐水
- C. 祛瘀破血
- D. 健脾和胃
- E. 辛热有毒之品

20. 产后“三审”不包括

- A. 小腹痛与不痛
- B. 大便通与不通
- C. 乳汁行与不行
- D. 恶露有无异常
- E. 饮食之多少

21. 产后腹痛因瘀血引起者, 称为

- A. 产后溺淋
- B. 产后风
- C. 子痛
- D. 子满
- E. 儿枕痛

22. 产后身痛的分型不包括

- A. 血虚证
- B. 外感证
- C. 血瘀证
- D. 气滞证
- E. 肾虚证

23. 阴挺患者, 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内属于

- A. I度轻型
- B. I度重型
- C. II度轻型
- D. II度重型
- E. III度

24. 下列不属于阴疮热毒证的表现的是

- A. 皮肤局限性鲜红肿胀
- B. 皮肤破溃糜烂
- C. 灼热结块, 脓苔稠黏
- D. 舌红苔黄腻, 脉弦滑数
- E. 皮肤色晦暗不泽

25. 小儿感冒夹惊体现的小儿生理特点是

- A. 脾常不足
- B. 乳食积滞
- C. 肝火易亢
- D. 脾胃湿困
- E. 肾气不足

26. 5周岁小儿按公式计算, 体重应为

- A. 15kg

- B.16kg
- C.17kg
- D.18kg
- E.20kg

27.小儿囟门迟闭不见于

- A.脑膜炎
- B.脑积水
- C.先天性甲减
- D.佝偻病
- E.解颅

28.苔色染黑常见于

- A.温热病热入营血
- B.疔积
- C.猩红热
- D.吃橄榄、乌梅、铁剂等
- E.心脾积热

29.下列关于螳螂子的表述,错误的是

- A.出现在两侧颊部,各有一个脂肪垫隆起
- B.有助吮乳
- C.不能挑割
- D.多发生于新生儿
- E.属于一种特殊的病理现象

30.添加辅食的原则不包括

- A.由少到多
- B.由稀到稠
- C.由细到粗
- D.由一种到多种
- E.在婴儿消化功能正常后可以一次性添加多种

31.硬肿症的治疗原则为

- A.温补脾肾,益精填髓
- B.温阳散寒,活血化瘀
- C.补肾培元
- D.利湿退黄
- E.益气温阳,通络止痛

32.小儿反复外感感染,伴口臭,口舌生疮,属于

- A.肝胆实火证
- B.大肠湿热证
- C.肺胃实热证
- D.营卫失调证
- E.风热郁肺证

33.厌食的临床表现与积滞的相比,不包括

- A.长期食欲不振
- B.厌恶进食

- C.一般无脘腹胀满
- D.一般无大便酸臭
- E.吞酸暖腐

34.营养性缺铁性贫血常见于

- A.6个月-3岁
- B.6个月-6岁
- C.6岁以上
- D.6个月-18个月
- E.6个月-2岁

35.夜啼惊恐伤神证宜选用

- A.黄连温胆汤
- B.天王补心丹
- C.酸枣仁汤
- D.远志丸
- E.安神定志丸

36.五迟不包括

- A.语迟
- B.坐迟
- C.立迟
- D.齿迟
- E.行迟

37.缩泉丸适用于尿频

- A.湿热下注证
- B.阴虚内热证
- C.脾肾气虚证
- D.肾气不足证
- E.肝经湿热证

38.疳腮变证的病变经络在

- A.太阳、少阳经
- B.太阳、阳明经
- C.少阳、厥阴经
- D.太阴、厥阴经
- E.少阳、太阴经

39.下列不属于奶麻的皮疹特征的是

- A.发疹有一定顺序
- B.疹退后无色素沉着
- C.疹退后无脱屑
- D.多为玫瑰色斑疹或斑丘疹
- E.较麻疹细小

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

40. 患者，男，43岁。颈前结喉处红肿疼痛，迅速蔓延，全身症状明显。溃后脓出稀薄，疮口有空壳，收口缓慢，胃纳不香，口干少津。舌光红，脉细。该患者应选用治疗的方剂是

- A. 黄连解毒汤
- B. 普济消毒饮
- C. 竹叶石膏汤
- D. 益胃汤
- E. 沙参麦冬汤

41. 患者，男，32岁。左侧小腿处，红赤肿胀、灼热疼痛，短时间内见紫斑，结毒化脓。伴发热，胃纳不香，舌红，苔黄腻，脉滑数。该患者治疗应首选的方剂是

- A. 普济消毒饮
- B. 柴胡清肝汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 五神汤合草薜渗湿汤
- E. 八珍汤合仙方活命饮

42. 患者，男，28岁。右指头肿胀疼痛7天，呈蛇头状肿，皮色红，疼痛剧烈，手指下垂时加重。伴恶寒发热头痛。透光试验见指头腹侧有一豆状黑色点。诊断为蛇头疔，外治宜

- A. 金黄膏外敷
- B. 鲜猪胆汁外敷
- C. 切开引流
- D. 10%黄柏液湿敷
- E. 白玉膏外敷

43. 患者，女性，30岁。左乳红肿热痛3天，皮肤烦红灼热，一周后肿块变软，有应指感。伴有壮热，舌红，苔黄腻，脉洪数。其治法为

- A. 疏肝解郁行气
- B. 活血化瘀
- C. 清热排毒，凉血消痈
- D. 清热解毒，托里透脓
- E. 疏肝清胃，通乳消肿

4. 患者，女，27岁。查体发现左侧乳房有肿块，乳房胀痛，月经前疼痛加剧，经后疼痛减轻，肿块呈厚薄不等的片块状，圆盘状，大小不一质地中等，边界清，活动度良好。该病的诊断以及肿块类型为

- A. 乳核片块型
- B. 乳癖结节型
- C. 乳癖片块型
- D. 粉刺性乳痛结节型
- E. 乳岩片块型

45. 患者，女，25岁，2天来全身起红色风团，灼热，剧痒，遇热时皮疹加重，苔薄黄，脉浮数。治疗方剂宜选用

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤
- C. 消风散
- D. 麻桂各半汤
- E. 当归饮子

46. 患者，女，62岁。便时肛内肿物脱出，轻重程度不一，色淡红，伴有肛门坠胀，大便带血，神疲乏力，食欲不振，舌淡，苔薄白，脉弱。该患者治疗宜选用的方剂是

- A. 葛根芩连汤
- B. 六磨汤
- C. 润肠汤
- D. 补中益气汤
- E. 凉血地黄汤

47. 患者，男，34岁。6小时前突然出现腰腹部绞痛，疼痛向外阴部放射，尿频，尿急，尿赤。舌有瘀斑，脉弦数。该患者治宜选用

- A. 济生肾气丸
- B. 八正散
- C. 三金排石汤
- D. 金铃子散合石韦散
- E. 二陈汤

48. 患者，男，60岁。患有前列腺增生，小便频数，夜间尤甚，尿线变细，余沥不尽，尿程缩短，精神萎靡，面色无华，畏寒肢冷。舌质淡润，苔薄白，脉沉细。该患者的证型是

- A. 肾阳不足证
- B. 肾阴不足证
- C. 气滞血瘀证
- D. 脾肾气虚证

E. 湿热下注证

49. 患者,女,36岁.昨日突发左下肢粗肿,局部发热、发红,疼痛,活动受限.舌质红,苔黄腻,脉弦滑.该患者可辨证为

- A. 热毒伤阴证
- B. 湿热瘀阻证
- C. 血脉瘀阻证
- D. 湿热下注证
- E. 血瘀湿阻证

50. 患者,女,28岁.平素月经规律,但经后头晕,头部绵绵作痛,月经量少,色淡,质稀;心悸少寐,神疲乏力;舌淡,苔薄,脉虚细.其治疗宜选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 十全大补汤
- C. 八珍汤
- D. 温经汤
- E. 乌药汤

51. 患者,女,60岁,月经停止1年后又再次出现子宫出血,色红,量较多,平时带下色黄有臭味,外阴及阴道瘙痒,口苦咽干,疲惫无力,纳谷不馨,大便不爽,小便短赤;舌质偏红,苔黄腻,脉弦细数.患者治疗宜选用

- A. 知柏地黄丸
- B. 天王补心丹
- C. 完带汤
- D. 易黄汤
- E. 益阴煎

52. 患者,女,34岁,屡孕屡堕;再次孕后阴道出血,色深红质稠,腰酸腹痛,面赤唇红,口干咽燥,便结尿黄;舌红苔黄,脉弦滑数.该患者治法宜采用

- A. 益气养血,固冲安胎
- B. 祛瘀消癥,固冲安胎
- C. 清热养血,滋肾安胎
- D. 育阴潜阳
- E. 调补气血

53. 患者,女,35岁,正值分娩时,忽然眩晕倒仆,昏不知人,两目上视,牙关紧闭,四肢抽搐,角弓反张,须臾醒,醒复发,甚或昏迷不醒.以下治疗原则不应遵循的是

- A. 解痉、降压
- B. 合理扩容
- C. 任何情况下都不能中止妊娠
- D. 必要时利尿
- E. 可以采用西医疗法

54. 患者,女,28岁,分娩后突然感头晕眼花,不能坐

起,恶心呕吐,继而神昏,不省人事.应诊断为

- A. 产后痉证
- B. 产后血晕
- C. 产后昏迷
- D. 产后郁证
- E. 以上都不是

55. 患者,女,27岁,产后2天,出现情绪低落、精神抑郁的表现,其主要病机为

- A. 肾精不足
- B. 肝阳上亢
- C. 心肾不交
- D. 肝郁气滞
- E. 血瘀或血虚

56. 患者,女,29岁,新产妇,体型较瘦,产后乳汁甚少,质地稀薄,乳房柔软无胀感;伴面色少华,倦怠乏力;舌淡苔薄白,脉细弱.该患者治疗宜选用

- A. 下乳涌泉散
- B. 通乳丹
- C. 苍附导痰丸
- D. 漏芦散
- E. 四海舒郁丸

57. 患者,女,36岁,下腹部结块,触痛;月经量少,经行腹痛较剧,经色紫暗有块,曾反复流产3次;腰酸膝软,头晕耳鸣;舌暗,脉弦细.该患者治疗宜选用

- A. 香棱丸
- B. 大黄牡丹汤
- C. 补肾祛瘀方
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 大黄蛰虫丸

58. 患者,女,42岁,因卫生习惯差,阴部瘙痒3天,坐卧不宁,外阴皮肤粗糙增厚,有抓痕,黏膜充血破溃,带下量多,色黄如脓,味腥臭;伴心烦易怒,胸胁满痛,口苦口腻,食欲不振,小便黄赤;舌体胖大,色红,苔黄腻,脉弦滑.该患者的治法为

- A. 散寒除湿,排脓止痒
- B. 利湿化痰,杀虫止痒
- C. 滋阴补肾,清肝止痒
- D. 清热除湿,泻火止痒
- E. 清热利湿,杀虫止痒

59. 患者,女,27岁,经期吐血、衄血,量少,色暗红,月经每先期、量少;平素可有头晕耳鸣,手足心热,两额潮红,潮热咳嗽,咽干口渴;舌绛,苔花剥,脉细数.该患者宜选用

- A. 清肝引经汤

B. 顺经汤

C. 知柏地黄丸

D. 六味地黄丸

E. 左归丸

60. 患儿,男,5岁,喜食肉,不食水果、蔬菜。现咽痛、吞咽困难5天,伴发热,扁桃体充血呈鲜红,肿大,表面有脓点。舌红,脉数。该病的治疗原则为

A. 开肺化痰,退热利咽

B. 疏风清热,利咽消肿

C. 清热宣肺,利咽消肿

D. 清热解毒,利咽消肿

E. 养阴润肺,软坚利咽

61. 患儿,男,6岁,气喘,喉间哮鸣5天,伴咳嗽,痰黏,色黄难咯,胸闷,喷嚏,鼻塞,流清涕,恶寒,发热,面色红赤,夜卧不安,无汗,口渴,小便黄赤,大便干,咽红,舌质红,苔薄黄,脉滑数。该患儿治疗宜选用

A. 苏子降气汤

B. 大青龙汤

C. 桑白皮汤

D. 小青龙汤合三子养亲汤

E. 麻杏石甘汤

62. 患儿,男,10岁,挤眉弄眼,摇头扭腰,肢体抖动,咽干清嗓,形体偏瘦,性情急躁,两颧潮红,五心烦热,睡眠不安,大便偏干,舌质红少津,苔少,脉细数。该病不与下列哪项疾病进行鉴别

A. 风湿性舞蹈病

B. 肌阵挛

C. 维生素D缺乏性佝偻病

D. 注意力缺陷多动症

E. 习惯性抽搐

63. 患儿,男,4岁,有急惊风病史,现精神萎靡,嗜睡无神,露睛,抽搐无力,时作时止,伴面色萎黄,不欲饮食,大便稀溏,时有肠鸣,四肢不温,舌淡苔白,脉沉弱。该患儿治疗宜选用

A. 真武汤

B. 痛泻要方

C. 缓肝理脾汤

D. 固真汤

E. 河车大造丸

64. 患儿,女,7岁,水肿,从眼睑开始,继而四肢,甚则全身浮肿,来势迅速,颜面为甚,皮肤光亮,按之凹陷即起,尿少,伴发热恶风,咽痛身痛,苔薄白,脉浮。若咳喘明显,治疗宜麻黄连翘赤小豆汤合五苓散加

A. 羌活、防风

B. 桑白皮、葶苈子

C. 陈皮、白术

D. 白芥子、荆芥

E. 紫苏子、柴胡

65. 患儿,女,8岁,寐中多遗,可达数次,小便清长,面白少华,神疲乏力,智力较同龄儿稍差,肢冷畏寒,舌质淡,苔白滑,脉沉无力。该患儿为

A. 阴虚内热证

B. 湿热下注证

C. 肾气不足证

D. 脾肾两虚证

E. 心血不足证

66. 肠道虫证患儿,脐腹部疼痛,时作时止,嗜食异物,大便不调,便下蛔虫,面色黄滞,面部有白斑,白睛蓝斑,唇内粟状白点,夜寐龄齿。形体消瘦,肚腹胀大,青筋显露。舌苔花剥,舌尖红赤,脉弦滑。治疗首选

A. 乌梅丸

B. 四君子汤

C. 驱虫粉

D. 异功散

E. 使君子散

67. 患儿,男,4岁,有风疹接触史,高热1天后,局部皮肤出现淡红色斑丘疹,1天后出现全身性斑丘疹,疹色鲜红,疹点稠密,可见皮疹融合成片,皮肤猩红,烦躁口渴,小便短黄,大便秘结,舌质红赤,苔黄糙,脉洪数。患儿治疗宜选用

A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 透疹凉解汤

D. 黄连解毒汤

E. 宣毒发表汤

68. 患儿,女,9个月。发热,微恶风寒,喷嚏流涕,咽喉肿痛,两目红赤,泪水汪汪,畏光羞明,神烦哭闹,纳减口干,小便短少,大便不调。发热第2-3天,口腔两颊黏膜红赤,贴近臼齿处可见麻疹黏膜斑,周围红晕。舌质偏红,苔薄白,指纹浮紫。其诊断为

A. 麻疹

B. 水痘

C. 幼儿急疹

D. 风疹

E. 猩红热

69. 患儿,6岁,因喂养不当,形体略瘦,面色少华,毛发稀疏,不思饮食,精神欠佳,性急易怒,大便干稀不调,舌质略淡,苔薄微腻,脉细有力。该患儿治疗宜选

中医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元	西内50、西诊40、传染30、伦理10、中医经典20
第三单元	中内90、针灸60
第四单元	中外50、中妇50、中儿50

中医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基20、中诊20、中药20、方剂20、 西内25、西诊20、传染15、伦理5、法规5
第二单元	中内45、针灸30、中外25、中妇25、中儿25

用

- A. 八珍汤
- B. 石斛夜光丸
- C. 资生健脾丸

- D. 归脾丸
- E. 小建中

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(70~72题共用题干)

患者,女,35岁,结喉正中稍右有一半球形肿块如鸡蛋大,不红、不热,边界清楚,表面光滑,质地中等无压痛,皮色如常,随吞咽上下移动.无明显全身症状,苔薄腻,脉弦滑.根据题干回答下列问题

70. 该患者的诊断为

- A. 气瘿肝郁气滞证
- B. 肉瘿气滞痰凝证
- C. 石瘿痰瘀内结证
- D. 肉瘿肝郁气滞证
- E. 筋瘿痰瘀互结证

71. 该病的治法为

- A. 理气解郁,化痰软坚
- B. 解郁化痰,活血散结
- C. 益气养阴,软坚散结
- D. 温阳散寒,化痰散结
- E. 理气化痰排脓

72. 该患者治疗宜选用

- A. 四海舒郁丸
- B. 柴胡疏肝散
- C. 逍遥散合海藻玉壶汤
- D. 海藻玉壶汤合桃仁红花汤
- E. 顺气归脾丸

(73~75题共用题干)

患者,男,35岁,消渴病病史1年,3天前背部出现局部红肿高突,范围在10cm左右,灼热疼痛,根脚收束,有脓头,迅速化脓脱腐,脓出黄稠.伴发热,口渴,尿赤.舌苔黄,脉数有力.根据题干回答下列问题

73. 该患者的诊断为

- A. 丹毒风热毒蕴证
- B. 痈火毒凝结证
- C. 发痰热蕴结证
- D. 有头疽火毒凝结证
- E. 有头疽湿热壅滞证

74. 该患者采用的治法为

- A. 疏风清热解毒
- B. 清热泻火,和营托毒
- C. 清热化痰,和营托毒
- D. 调补气血
- E. 散风清热,化痰消肿

75. 该患者临床宜选用

- A. 仙方活命饮
- B. 黄连解毒汤合仙方活命饮
- C. 普济消毒饮
- D. 牛蒡解肌汤
- E. 犀角地黄汤

(76~78题共用题干)

患者,男,73岁.服药后突然出现全身性皮疹,色鲜红,有血疱,灼热痒痛;伴高热,,神志不清,口唇焦燥,口渴不欲饮,大便干结,小便短赤;舌红绛,苔少,脉洪数.根据题干回答下列问题

76. 该病的病因病机为

- A. 禀赋不耐,邪毒侵犯
- B. 七情内伤,肝肾不足
- C. 饮食劳倦,外感风邪
- D. 表虚不固,风热外袭
- E. 情志抑郁,肝失条达

77. 该患者治疗首选的方剂

- A. 清营汤
- B. 化斑消毒汤
- C. 生脉饮合人参养荣汤
- D. 增液汤合益胃汤
- E. 黄芪建中汤合生脉饮

78. 该患者治法宜选

- A. 养血祛风,润燥止痒
- B. 清热凉血,解毒护阴
- C. 滋阴降火,利湿去浊
- D. 活血解毒,通络止痛

E. 凉血解毒,泄热散瘀

(79~81题共用题干)

患者,男,26岁.3个月前胳膊出现皮疹,有薄膜现象.刮除薄膜,出现多个筛状出血点.病程进入静止期后,皮疹多呈斑片状,颜色淡红,鳞屑减少,干燥皲裂,自觉瘙痒;伴口咽干燥;舌质淡红,舌苔少,脉沉细.根据题干回答下列问题

79. 根据上述症状,诊断该患者所患的疾病是

- A. 黄水疮
- B. 牛皮癣
- C. 蛇串疮
- D. 脂溢性皮炎
- E. 白疔

80. 该患者辨证为

- A. 血虚风燥证
- B. 血热内蕴证
- C. 血虚风动证
- D. 风邪上犯证
- E. 气滞血瘀证

81. 治疗该患者首选的方剂是

- A. 化斑解毒汤
- B. 草薢分清饮
- C. 参苓白术散合茵陈蒿汤
- D. 当归饮子
- E. 四物汤合六味地黄汤

(82~84题共用题干)

患者,男,24岁.便血,色鲜红,排便时肛内有肿物脱出,便后可自行回纳,肛门灼热,舌质红,苔黄腻,脉弦数.

82. 该患者所患疾病处于

- A. I期
- B. Ⅱ期
- C. Ⅲ期
- D. Ⅳ期
- E. V期

83. 根据患者症状,可辨证为

- A. 风伤肠络证
- B. 湿热下注证
- C. 气滞血瘀证
- D. 脾虚气陷证
- E. 肝胆湿热证

84. 治疗该患者首选的方剂是

- A. 凉血地黄汤
- B. 脏连丸

C. 止痛如神汤

D. 补中益气汤

E. 龙胆泻肝汤

(85~87题共用题干)

患者,男,30岁,半年前出现左下肢发凉,怕冷,麻木,坠胀疼痛,间歇性跛行加重,并出现静息痛.现患肢肌肉明显萎缩,趾甲增厚且生长缓慢,皮肤苍白,左侧足背动脉、胫后动脉搏动消失.患处皮肤干燥,毫毛脱落,趾甲增厚变形,肌肉萎缩,趾呈干性坏疽;口干欲饮,便秘溲赤;舌红,苔黄,脉弦细数.

如有问题添加: jyjqq666

85. 该患者的诊断为

- A. 廉疮寒湿阻络
- B. 脱疽气阴两虚
- C. 脱疽热毒伤阴
- D. 冻疮热盛津伤
- E. 股肿气阴两虚

86. 该患者处于疾病的

- A. 一期
- B. 三期
- C. 局部缺血期
- D. 坏疽期
- E. 营养障碍期

87. 该患者宜选用

- A. 阳和汤
- B. 黄芪鳖甲汤
- C. 四妙勇安汤
- D. 顾步汤
- E. 桃红四物汤

(88~90题共用题干)

患者,女,45岁,经来无期,行经天数不固定,量少淋漓不尽,血色鲜红;面颊潮红,烦热少寐,咽干口燥,舌红,少苔,脉细数.

88. 患者的诊断为

- A. 崩漏肾阴虚证
- B. 经间期出血肾阴虚证
- C. 崩漏血热虚热证
- D. 月经先后无定期血热虚热证
- E. 经期延长肾阴虚证

89. 该患者的治疗宜选用

- A. 清热固经汤
- B. 上下相资汤
- C. 左归丸
- D. 清热调血汤

- E. 右归丸
90. 该患者治法为
- A. 清热凉血, 固冲止血
- B. 滋肾益阴, 固冲止血
- C. 温经散寒, 活血调经
- D. 滋肾养肝, 和胃通络
- E. 养阴清热, 固冲止血

(91~93题共用题干)

患者, 女, 18岁, 近半年来月经停闭. 伴形体肥胖, 胸闷泛恶, 神疲倦怠, 纳少, 痰多, 带下量多、色白; 苔腻, 脉滑.

91. 患者的诊断为
- A. 闭经气滞血瘀
- B. 闭经寒凝血瘀
- C. 月经后期痰湿阻滞
- D. 月经后期气滞血瘀
- E. 闭经痰湿阻滞
92. 患者宜选用
- A. 苍附导痰丸
- B. 温经汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 一贯煎
- E. 左归丸

93. 该病的治疗原则为
- A. 健脾燥湿化痰, 活血调经
- B. 活血化瘀, 调经止痛
- C. 虚者补而通之, 实者泻而通之
- D. 温经散寒, 活血调经
- E. 化瘀通络

(94~96题共用题干)

患者, 女, 31岁. 近期带下量多, 色白, 质稀薄, 如涕如唾, 绵绵不断, 无臭; 面色胱白, 四肢倦怠, 腕肋不舒, 纳少便溏, 四肢浮肿; 舌淡胖, 苔白腻, 脉细缓.

94. 该患者可辨证为
- A. 脾虚证
- B. 肾阳虚证
- C. 寒湿阻滞证
- D. 阴虚夹湿证
- E. 气阴亏虚证
95. 其治法为
- A. 养血祛风
- B. 滋肾益阴, 散寒利湿
- C. 清热利湿, 润燥止痒
- D. 健脾益气, 升阳除湿
- E. 益气滋阴润燥

96. 其治疗方药宜选
- A. 易黄汤
- B. 内补丸
- C. 完带汤
- D. 左归丸
- E. 知柏地黄丸

(97~99题共用题干)

患者, 女, 29岁, 妊娠5月余, 妊娠腹形明显小于妊娠月份, B超示胎儿存活但发育缓慢, 患者伴腰膝酸软, 纳少便溏, 形寒畏冷, 手足不温; 舌质淡, 苔白, 脉沉迟

97. 本病的治疗原则不包括
- A. 当求因治本, 去其所病
- B. 重在补脾肾
- C. 使精血充足, 则胎有所养
- D. 重在益气血
- E. 治宜标本兼顾
98. 该患者治疗宜选用
- A. 胎元饮
- B. 寿胎丸合四君子汤
- C. 长胎白术散
- D. 肾气丸
- E. 泰山磐石散

99. 该患者的治法为
- A. 补气养血安胎
- B. 温肾扶阳, 养血育胎
- C. 补益脾肾, 养胎长胎
- D. 温肾补阳, 化气行水
- E. 益气养血, 固冲安胎

(100~102题共用题干)

患者, 女, 26岁, 产后恶露不尽, 量时多时少, 色暗有块, 小腹疼痛拒按; 舌紫暗, 边有瘀点, 脉沉涩.

100. 该患者的诊断为
- A. 产后恶露不绝气虚证
- B. 产后恶露不绝血热证
- C. 产后恶露不绝血瘀证
- D. 盆腔炎湿热瘀滞证
- E. 闭经湿热蕴结证
101. 患者治疗宜选用
- A. 补中益气汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 生化汤
- D. 保阴煎
- E. 泻心汤

102. 该患者治法宜选用

- A. 活血化瘀止血
- B. 补气固冲摄血
- C. 养阴清热止血
- D. 温经通络活血
- E. 疏肝解郁活血

(103~105题共用题干)

患者,女,36岁,婚久不孕,月经常提前,经量少,经色较鲜红;形体消瘦,头晕耳鸣,腰膝酸软,五心烦热,失眠多梦,眼花心悸,肌肤失润,阴中干涩;舌质稍红略干,苔少,脉细数。

103. 该患者治疗宜选用

- A. 毓麟珠
- B. 开郁种玉汤
- C. 苍附导痰丸
- D. 温胞饮
- E. 养精种玉汤

104. 该患者的治法宜采用

- A. 滋肾养血,调补冲任
- B. 疏肝解郁,理血调经
- C. 温肾暖宫,调补冲任
- D. 燥湿化痰,理气调经
- E. 逐瘀荡胞,调经助孕

105. 该患者为进一步找到病因,初步需做的检查不包括

- A. 输卵管通畅实验
- B. 内分泌激素检查
- C. 免疫因素检查
- D. BBT
- E. 腹腔镜手术探查

(106~108题共用题干)

病儿,出生后6小时后出现黄疸,迅速加重,伴嗜睡,神昏,抽搐,舌质红,苔黄腻。

106. 该患儿的诊断为

- A. 阳黄 痰蒙神窍证
- B. 阳黄 重症
- C. 胎黄 胎黄虚脱证
- D. 胎黄 胎黄动风证
- E. 胎黄 湿热郁蒸证

107. 该患儿治疗宜选用

- A. 茵陈蒿汤
- B. 茵陈五苓散
- C. 羚角钩藤汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 普济消毒饮

108. 该患儿治法宜选用

- A. 清热利湿退黄
- B. 温中化湿退黄
- C. 平肝息风,利湿退黄
- D. 大补元气,温阳固脱
- E. 行气化痰消积

(109~111题共用题干)

患儿,女,2岁,1月前感受风寒后发热、咳嗽严重,伴气喘、痰鸣,2天后热退,现仍有咳嗽、咳痰的表现,咳痰无力,痰稀白易咯,多汗,感冒,纳呆便溏,面白少华,神疲乏力,舌质淡红,舌体胖嫩,苔薄白,脉细无力,指纹淡。

109. 该患儿的诊断为

- A. 咳嗽 肺脾气虚证
- B. 肺炎喘嗽 肺脾气虚证
- C. 肺炎喘嗽 风寒闭肺证
- D. 感冒 气虚感冒证
- E. 风寒咳嗽证

110. 患儿治疗宜选用

- A. 杏苏散
- B. 六君子汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 人参五味子汤
- E. 参附龙牡救逆汤

11. 本病的病机关键为

- A. 肺气郁闭
- B. 肺气上逆
- C. 邪犯为表
- D. 正气亏虚
- E. 肺脾气虚

(112~114题共用题干)

患儿,女,1岁半,大便稀溏,夹有食物残渣,气味酸臭,如败卵,脘腹胀满,便前腹痛,泻后痛减,腹痛拒按,暖气酸馊,不思乳食,夜卧不安,舌苔厚腻,指纹滞。

112. 该患儿治疗宜选用

- A. 大承气汤
- B. 枳实导滞丸
- C. 保和丸
- D. 越鞠丸
- E. 乌梅汤

如有问题添加;jyj qq666

113. 该患儿的治法宜选用

- A. 健脾益气,助运止泻
- B. 运脾和胃,消食化滞
- C. 清肠解热,化湿止泻

- D. 疏肝健脾,和胃止泻
- E. 清热泻火,解毒止泻

114. 该证不宜应用的推拿疗法为

- A. 清大肠
- B. 揉龟尾
- C. 补脾土
- D. 点揉中脘
- E. 逆运内八卦

(115~117题共用题干)

患儿,男,2岁,暴受惊恐后惊惕不安,身体战栗,喜投母怀,夜间惊啼,甚至惊厥、抽风,神志不清,大便色青,脉律不整,指纹紫滞。

115. 该患儿的诊断为

- A. 痫病 惊痫证
- B. 急惊风 惊恐伤风
- C. 急惊风 邪陷心肝
- D. 慢惊风 阴虚风动
- E. 痫病 风痫证

116. 该患儿治法宜选用

- A. 育阴潜阳,滋肾养肝
- B. 息风止痉
- C. 镇惊安神
- D. 镇惊安神,平肝息风
- E. 豁痰开窍

117. 该患儿治疗宜选用

- A. 定痫丸

- B. 镇惊丸
- C. 琥珀抱龙丸
- D. 大定风珠
- E. 三甲复脉汤

(118~120题共用题干)

患儿,女,7岁,发热轻微,鼻塞流涕,喷嚏,咳嗽,起病后2天出皮疹,疹色红润,疱浆清亮,根盘红晕,皮疹瘙痒,分布稀疏,此起彼伏,以躯干为多,舌苔薄白,脉浮数。

118. 该患儿的诊断为

- A. 丹痧 邪侵肺卫证
- B. 麻疹 邪犯肺卫证
- C. 手足口病 邪犯肺卫证
- D. 水痘 邪犯肺卫证
- E. 麻疹 邪炽气营证

119. 该患儿治疗宜选用

- A. 清胃解毒汤
- B. 五味消毒饮
- C. 银翘散
- D. 甘露消毒丹
- E. 清瘟败毒饮

120. 该患儿的治法宜选用

- A. 辛凉宣透,清热解毒
- B. 清肝泻火,活血止痛
- C. 疏风清热,散结消斑
- D. 清气凉营,解毒化湿
- E. 疏风清热,利湿解毒

B型题

答题要求

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(121~122题共用备选答案)

- A. 火陷
- B. 湿陷
- C. 干陷
- D. 实陷
- E. 虚陷

121. 发于有头疽1~2候毒盛期的是

122. 发于有头疽4候收口期的是

(123~124题共用备选答案)

- A. 人参养营汤
- B. 二仙汤合开郁散
- C. 托里消毒散

D. 逍遥萎贝散

E. 二仙汤合四物汤

123. 乳岩冲任失调证宜选用

124. 乳癖冲任失调证宜选用

(125~126题共用备选答案)

- A. 走黄
- B. 内陷
- C. 失荣
- D. 肺痈
- E. 颈痈

125. 有头疽患者若伴有消渴病,最易出现的变证是

126. 颜面部疔疮易发生

(127~128题共用备选答案)

- A. 鼠乳
- B. 足癣
- C. 白癣
- D. 黄癣
- E. 扁疣

127. 肥疮是指

128. 发于颜面、手背、前臂的疣,称为

(129~130题共用备选答案)

- A. 一期梅毒
- B. 二期梅毒
- C. 三期梅毒
- D. 先天梅毒
- E. 隐性梅毒

129. 以硬下疳为主要表现的是

130. 以杨梅结毒为主要表现的是

(131~132题共用备选答案)

- A. 复方大柴胡汤
- B. 大黄牡丹汤合红藤煎剂
- C. 仙方活命饮
- D. 大黄牡丹汤合透脓散
- E. 四妙勇安汤

131. 肠痈瘀滞证选用

132. 肠痈热毒证选用

(133~134题共用备选答案)

- A. 阴道
- B. 子宫颈口
- C. 子宫
- D. 阴道口
- E. 女性外生殖器

133. 四边是指

134. 子户是指

(135~136题共用备选答案)

- A. 感染邪毒
- B. 血热
- C. 气虚
- D. 血瘀
- E. 血寒

135. 恶露色黯若败酱的辨证为

136. 恶露色红、质稠的辨证为

(137~138题共用备选答案)

- A. 阴血不足,肝阳上亢
- B. 冲气上逆,胃失和降

C. 冲任不固,带脉失约

D. 冲任损伤,胎元不固

E. 阴液不足,不能渗润阴道

137. 带下过多的病机为

138. 带下过少的病机为

(139~140题共用备选答案)

- A. 人流不全
- B. 子宫穿孔
- C. 人流综合征
- D. 人流术后感染
- E. 宫颈黏连

139. 头晕、恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗甚至晕厥,心率减慢小于60次/分,心律不齐,血压下降见于

140. 无底感,宫腔深度超过应有深度;吸引过程中突感阻力消失或有突破感、无底感见于

(141~142题共用备选答案)

- A. 马牙
- B. 鹅口疮
- C. 白喉
- D. 顿咳
- E. 夜啼

141. 咳声嘶哑如犬吠者,常见于

142. 连声咳嗽,夜咳为主,咳而呕吐,伴鸡鸣样回声者,常见于

(143~144题共用备选答案)

- A. 五分之二
- B. 六分之一
- C. 二分之一
- D. 三分之二或接近成人用量
- E. 三分之一

143. 学龄儿童的用药剂量为成人的

144. 乳幼儿的用药剂量为成人的

(145~146题共用备选答案)

- A. 肝胆
- B. 脾胃
- C. 心肝
- D. 心脾
- E. 心脾胃肾

145. 鹅口疮的病位在

146. 口疮的病位在

(147~148题共用备选答案)

- A. 小蓟饮子
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 大柴胡汤

D. 柴胡葛根汤

E. 普济消毒饮

147. 痒腮邪犯少阳证宜选用

148. 疔腮毒窜睾腹证宜选用

胖大海医考整理汇总

(149~150题共用备选答案)

A. 清热凉血利咽

B. 清热解毒, 清利咽喉

C. 清热祛湿解毒

D. 清热解毒, 软坚散结

E. 麻不厌透, 麻喜清凉

149. 丹痧的治疗原则为

150. 水痘的治疗原则为

